

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Midodrine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616030.html>

## Midodrine

binibigkas bilang (mye' doe dreen)

### MAHALAGANG BABALA:

Ang Midodrine ay maaaring magdulot ng supine hypertension (mataas na presyon ng dugo na nangyayari kapag nakahiga nang nakadapa). Ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin ng mga taong ang mababang presyon ng dugo ay lubhang naglilimita sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain at hindi matagumpay na magamot sa iba pang mga therapy. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng mataas na presyon ng dugo. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng dihydroergotamine (DHE, Migranal). Sabihin din sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot ang iyong iniinom, kabilang ang ephedrine, phenylephrine, phenylpropanolamine, at pseudoephedrine. Maraming mga produktong hindi inireseta ang naglalaman ng mga gamot na ito (hal. mga tabletas sa diyeta at mga gamot para sa ubo at sipon), kaya suriing mabuti ang mga label. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, itigil ang pag-inom ng midodrine at tawagan kaagad ang iyong doktor: kamalayan ng iyong tibok ng puso, pagpintig sa iyong mga tainga, sakit ng ulo, o malabong paningin. Pagkatapos magsimula ng paggamot, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na ipagpatuloy ang pag-inom ng midodrine kung mayroon kang makabuluhang pagbuti sa iyong mga sintomas. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong nararamdaman habang umiinom ng gamot na ito.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Dapat mong ipasuri ang iyong presyon ng dugo sa nakatayo at nakahiga na patag na posisyon bago simulan ang paggamot at regular habang umiinom ka ng midodrine.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng midodrine.

### Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Midodrine ay ginagamit upang gamutin ang orthostatic hypotension (biglaang pagbagsak ng presyon ng dugo na nangyayari kapag ang isang tao ay nakatayo sa posisyon). Ang Midodrine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na alpha-adrenergic agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapasikip ng mga daluyan ng dugo, na nagpapataas ng presyon ng dugo.

### paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Midodrine bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito ng tatlong beses sa isang araw sa mga oras ng araw (tulad ng umaga, tanghali, at hapon [bago ang 6PM]) na may mga dosis na may pagitan ng hindi bababa sa 3 oras

magkahiwalay. Uminom ng huling pang-araw-araw na dosis ng midodrine bago kumain sa gabi at hindi bababa sa 4 na oras bago matulog. Uminom ng midodrine sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang midodrine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Uminom ng midodrine sa mga oras ng araw kapag kailangan mong tumayo. Iwasan ang pagkuha ng isang dosis kapag ikaw ay nakahiga para sa anumang haba ng oras. Kausapin din ang iyong doktor kung paano iposisyon ang iyong sarili kapag nakahiga ka. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na itaas ang ulo ng iyong kama kapag nagpapahinga o natutulog.

### **may mga gamit para sa gamot na ito**

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

### **hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?**

#### **Bago kumuha ng midodrine,**

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa midodrine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa midodrine tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: mga alpha blocker gaya ng doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), at terazosin; beta blockers tulad ng acebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin, sa Tenoretic), betaxolol, bisoprolol (Zebeta, sa Ziac), carvedilol (Coreg), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard, sa Corzide), pindolol, propranolol (Inderal, InnoPran XL), sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), at timolol; digoxin (Lanoxin); fludrocortisone; at mga gamot para sa sakit sa isip.
- sabihin sa iyong doktor kung nahahirapan kang umihi, pheochromocytoma (tumor sa isang maliit na glandula malapit sa mga bato), hyperthyroidism (kondisyon na nangyayari kapag ang thyroid gland ay gumagawa ng masyadong maraming thyroid hormone) o sakit sa puso o bato. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng midodrine.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes, mga problema sa paningin, o sakit sa atay.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng midodrine, tawagan ang iyong doktor.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng midodrine.

### **sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?**

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

#### **Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?**

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito, hangga't ito ay hindi bababa sa 4 na oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedylul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

### **mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?**

**Ang Midodrine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:**

- pamamanhid at pangingilig
- pangangati ng anit
- goose bumps
- panginginig
- madalas na pag-ihi
- kagyat na pangangailangang umihi
- hirap umihi
- pantal
- sakit sa tyan

**Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, itigil ang pag-inom ng midodrine at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:**

- mabagal na tibok ng puso
- pagkahilo
- nanghihina

Ang Midodrine ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

### **Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?**

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa liwanag, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naabot. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

### Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- kamalayan ng iyong tibok ng puso
- pumipintig sa iyong mga tainga
- sakit ng ulo
- malabong paningin
- goose bumps
- malamig na sensasyon
- hirap umihi

### Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa midodrine.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

### mga pangalan ng rand

- Orvaten®¶
- Proamatine®¶

¶-Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 02/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

---

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022