



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Midostaurina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html>

Midostaurina

pronunciado como (mye"doe staw'rin)

por que este medicamento é prescrito?

A midostaurina é usada com outros medicamentos quimioterápicos para tratar certos tipos de leucemia mielóide aguda (LMA; um tipo de câncer dos glóbulos brancos). A midostaurina também é usada para certos tipos de mastocitose (uma doença do sangue em que há muitos mastócitos [um certo tipo de glóbulo branco]). Midostaurina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores de quinase. Funciona bloqueando a ação da proteína anormal que sinaliza a multiplicação das células cancerígenas. Isso ajuda a impedir a propagação de mastócitos e células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Midostaurina vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado com alimentos duas vezes ao dia. Tome midostaurina aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome midostaurina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula as cápsulas inteiras; não os abra nem os esmague.

Se vomitar depois de tomar midostaurina, não tome outra dose. Continue seu esquema de dosagem regular.

O seu médico pode diminuir a dose de midostaurina ou dizer-lhe para parar de tomar midostaurina por um período de tempo ou permanentemente durante o tratamento. Isso depende dos efeitos colaterais que você experimenta. Converse com seu médico sobre como você está se sentindo durante o tratamento. Continue a tomar midostaurina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar midostaurina sem falar com o seu médico.

O seu médico pode dizer-lhe para tomar medicação para prevenir náuseas e vômitos antes de cada dose de midostaurina.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar midostaurina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à midostaurina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes das cápsulas de midostaurina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: boceprevir (não mais disponível nos EUA; Victrelis); carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, outros); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, outros); enzalutamida (Xtandi); idelalisib (Zydelig); itraconazol (Onmel, Sporanox); cetoconazol (Nizoral); medicamentos usados para tratar o vírus da imunodeficiência humana (HIV), como cobicistat (Tybost, em Evotaz, em Genvoya, em Prezcoibix, em Stribild), elvitegravir (Vitekta), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, em Kaletra, na Technivie, em Viekira), saquinavir (Invirase) e tipranavir (Aptivus); mitotano (Lysodren); nefazodona; fenitoína (Dilantin, Phenytek); posaconazol (Noxafil); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater); troleandomicina (não disponível nos EUA); e voriconazol (Vfend). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com a midostaurina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.
- informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.
- informe o seu médico se tem ou já teve batimentos cardíacos irregulares, prolongamento do intervalo QT (um problema cardíaco que pode causar batimentos cardíacos irregulares, desmaios ou morte súbita), doença pulmonar, hepática ou renal.
- informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se for mulher, não deve engravidar enquanto estiver a tomar midostaurina e até 4 meses após a sua dose final. Você precisará ter um teste de gravidez negativo dentro de 7 dias antes de começar a tomar midostaurina. Converse com seu médico sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se você for homem, você e sua parceira devem usar anticoncepcionais durante o tratamento e continuar usando anticoncepcionais por 4 meses após a última dose. Se você ou seu parceiro engravidar enquanto estiver tomando midostaurina, ligue para o seu médico imediatamente. A midostaurina pode prejudicar o feto.
- informe o seu médico se estiver a amamentar. Você não deve amamentar enquanto estiver tomando midostaurina e por 4 meses após a dose final.
- você deve saber que este medicamento pode diminuir a fertilidade em homens e mulheres.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A midostaurina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito

- diarreia
- dor de cabeça
- hemorragias nasais
- cansaço
- fraqueza
- tontura
- constipação
- hemorróidas
- aumento da sudorese
- dor de estômago
- manchas brancas ou feridas nos lábios ou na boca e garganta
- inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas
- dor nas costas, ossos, articulações, membros ou músculos
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- febre, tosse, dor de garganta, calafrios e outros sinais de infecção
- batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados
- falta de ar
- dor no peito
- rubor
- inchaço dos lábios, língua ou garganta
- dificuldade em respirar ou engolir
- urticária
- irritação na pele
- coceira
- tosse nova ou agravada
- chiado
- vomitando sangue ou vomitando material que se parece com borra de café
- sangramento ou hematomas incomuns
- ardor ou dor ao urinar

A midostaurina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico pode solicitar certos exames de laboratório para verificar a resposta do seu corpo à midostaurina.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Rydapt®

Última revisão - 15/08/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022