



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html>

ميدوستورين (mye "doe staw 'rin) تنطق كـ

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Midostaurin مع أدوية العلاج الكيميائي الأخرى لعلاج أنواع معينة من سرطان الدم النخاعي الحاد (AML)؛ نوع من سرطان خلايا الدم البيضاء). يستخدم ميدوستورين أيضاً لأنواع معينة من كثرة الخلايا البدينة (اضطراب في الدم يوجد فيه عدد كبير جداً من الخلايا البدينة [نوع معين من خلايا الدم البيضاء]). ينتمي ميدوستورين إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات كيناز، إنه يعمل عن طريق منع عمل البروتين غير الطبيعي الذي يشير إلى تكاثر الخلايا السرطانية. هذا يساعد على وقف انتشار الخلايا البدينة والسرطانية.

فكيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Midostaurin على شكل كبسولة لأخذها عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مع الطعام مرتين في اليوم. خذ الميدوستورين في نفس الأوقات تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ الميدوستورين تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلاع الكبسولات كاملة. لا تفتحها أو تسحقها.

إذانقيات بعد تناول ميدوستورين، فلا تتناول جرعة أخرى. استمر في جدول الجرعات المعتمد.

قد يقلل طبيبك من جرعتك من الميدوستورين أو يخبرك بالتوقف عن تناول الميدوستورين لفترة من الوقت أو بشكل دائم أثناء العلاج. هذا يعتمد على الآثار الجانبية التي تواجهها. تحدث إلى طبيبك حول ما تشعر به أثناء علاجك. استمر في تناول الميدوستورين حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول ميدوستورين دون التحدث مع طبيبك.

قد يخبرك طبيبك بتناول دواء لمنع الغثيان والقيء قبل كل جرعة من الميدوستورين.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلتناول ميدوستورين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الميدوستورين أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات كبسولات ميدوستورين. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.

• أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكمّلات الغذائيّة التي تتناولها أو تخطّط لتناولها. تأكّد من ذكر أيّ مما يلي: boceprevir (لم يعد متوفّراً في الولايات المتّحدة)؛ Victrelis (كاربامازيبين (كارباترول، إيكيترو، تيجريتول، وغيرها)؛ كلاريثروميسين (بياكسين، في بريفاك)؛ ديلتيازيم (كارديزيم، كارتيا، تيازاك، آخرون)؛ إنزالوتاميد (إكتاندي)؛ إديلاليسيب (زيديليج)؛ إيتراكونازول (أونميلا، سبورانوكس)؛ الكيتوكونازول (نيزورال) الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) مثل Evotaz (Tybost) cobicistat (مثل HIV) Prezcobix (elvitegravir (Vitekta)، indinavir (Crixivan)، nelfinavir (Viracept)، ritonavir (Stribild)، tipranavir (Aptivus)، saquinavir (Invirase)، في Viekira، في Technivie)، في Norravir (Kalin)، في Norravir (Miyotan) ليسودرين)؛ نيفاوزدون. الفينيتويين (ديلانتين، فينيتيك)؛ بوساكونازول (نوكسافيل)؛ ريفامبين (ريفادين، ريماكتان، في ريفامات، في ريفاتر)؛ troleandomycin (غير متوفّر في الولايات المتّحدة)؛ voriconazole (Vfend). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية. قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع الميدوستورين، لذا تأكّد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، حتى تلك التي لا تظهر في هذه القائمة.

- أخبر طبيبك عن المنتجات العشبية التي تتناولها، وخاصة نبتة سانت جون.

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب أو عانيت من قيل، أو إطالة كيو تي (مشكلة قلبية قد تسبّب عدم انتظام ضربات القلب أو الإغماء أو الموت المفاجئ) أو أمراض الرئّة أو الكبد أو الكلّ.

• أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخطّطين للحمل. إذا كنت أنت، يجب ألا تحمل أثناء تناول ميدوستورين ولمدة تصل إلى 4 أشهر بعد الجرعة النهائية. سوف تحتاج إلى إجراء اختبار حمل سلبي في غضون 7 أيام قبل البدء في تناول الميدوستورين. تحدث إلى طبيبك حول طرق تحديد النسل التي ستتناسبك. إذا كنت ذكراً، فيجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل منع الحمل أثناء العلاج والاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل لمدة 4 أشهر بعد الجرعة النهائية. إذا أصبحت أنت أو شريكك حاملاً أثناء تناول الميدوستورين، فاتصل بطبيبك على الفور. قد يضر الميدوستورين بالجنين.

- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب ألا ترضع من الثدي أثناء تناول ميدوستورين ولمدة 4 أشهر بعد الجرعة النهائية.

- يجب أن تعلم أن هذا الدواء قد يقلل من الخصوبة عند الرجال والنساء.

قبعة تعليمات غذائيّة خاصة يجب عليّ اتباعها؟

تحدث إلى طبيبك حول تناول الجريب فروت وشرب عصير الجريب فروت أثناء تناول هذا الدواء.

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك، استمر في نظامك الغذائي المعتمد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

تخطي الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتمد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسيّة.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب ميدوستورين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أيّ من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ

• إسهال

• صداع الرأس

• نزيف في الأنف

• تعب

• ضعف

• دوخة

• إمساك

• بواسير

• زيادة التعرق

• آلام في المعدة

• بقع بيضاء أو تقرحات على الشفاه أو في الفم والحلق

• تورم في اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو أسفل الساقين

• آلام الظهر أو العظام أو المفاصل أو الأطراف أو العضلات

• صعوبة في النوم أو البقاء نائماً

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيّاً من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

• الحمى والسعال والتهاب الحلق والقشعريرة وغيرها من علامات العدوى

• ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو خاطفة

• ضيق في التنفس

• ألم مصدر

• تدفق مائي - صرف

• تورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق

• صعوبة في التنفس أو البلع

• قشعريرة

• متسرع

• متلهف، متسلق

• سعال جديد أو متفاقم

• أزيز

• يتقيأ ماداً أو يتقيأ مادة تشبه القهوة المطحونة

• نزيف أو كدمات غير عادية

• حرقان أو ألم عند التبول

قد يسبب ميديستورين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
 (1-800-332-1088) أو عبر الهاتف (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>].

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكן الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المرحاض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويتك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامات / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [<http://goo.gl/c4Rm4p>] [<http://c4Rm4p>] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترن트 على [<https://www.poisonhelp.org/help>] [<https://www.poisonhelp.org/help>]. إذا انهارت الصدرية ، أو أصيب بنبوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احفظ جميع المواجه مع طبيبك والمخبر. قد يتطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للميديستورين.

من المهم أن تحفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكمّلات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- RIDA-BT®

آخر مراجعة - 15/08/2017

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



أجزاء المسؤولة من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الأمريكية الازدواجية ، 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland.

للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP

المكتبة الوطنية للطب Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022