



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Midostaurin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html>

Midostaurin

(mye"doe staw' rin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Midostaurin, belirli akut miyeloid lösemi türlerini (AML; beyaz kan hücrelerinin bir tür kanseri) tedavi etmek için diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Midostaurin ayrıca belirli mastositoz türlerinde (çok fazla mast hücresinin [belirli bir beyaz kan hücresi türü] bulunduğu bir kan hastalığı) kullanılır. Midostaurin, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine çoğalma sinyali veren anormal proteinin etkisini bloke ederek çalışır. Bu, mast ve kanser hücrelerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Midostaurin ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle birlikte alınır. Midostaurin'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Midostaurin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; açmayın veya ezmeyin.

Midostaurin aldıktan sonra kusarsanız, başka bir doz almayınız. Normal doz programınıza devam edin.

Doktorunuz midostaurin dozunuzu azaltabilir veya tedaviniz sırasında bir süre veya kalıcı olarak midostaurin almayı bırakmanızı söyleyebilir. Bu, yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun. Kendinizi iyi hissetseniz bile midostaurin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan midostaurin almayı kesmeyiniz.

Doktorunuz, her midostaurin dozundan önce bulantı ve kusmayı önlemek için ilaç almanızı söyleyebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Midostaurin almadan önce,

- midostaurin'e, diğer ilaçlara veya midostaurin kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: boceprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Victrelis); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri); klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri); enzalutamid (Xtandi); idealalisib (Zydelig); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); kobisistat (Tybost, Evotaz'da, Genvoya'da, Prezcoibix'te, Stribild'de), elvitegravir (Vitekta), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) gibi insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar , Technivie'de, Viekira'da), sakonavir (Invirase) ve tipranavir (Aptivus); mitotan (Lisodren); nefazodon; fenitoin (Dilantin, Phenytek); posakonazol (Noxafil); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); troleandomisin (ABD'de mevcut değildir); ve vorikonazol (Vfend). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da midostaurin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.
- Düzensiz kalp atışınız, QT uzaması (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen bir kalp sorunu), akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.
- Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, midostaurin alırken ve son dozunuzdan sonraki 4 aya kadar hamile kalmamalısınız. Midostaurin almaya başlamadan önce 7 gün içinde negatif bir hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz tedaviniz sırasında doğum kontrolünü kullanmalı ve son dozunuzdan sonra 4 ay boyunca doğum kontrolünü kullanmaya devam etmelisiniz. Midostaurin alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Midostaurin fetüse zarar verebilir.
- Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Midostaurin alırken ve son dozunuzdan sonraki 4 ay boyunca emzirmemelisiniz.
- Bu ilacın erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Midostaurin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- mide bulantısı
- kusma

- ishal
- baş ağrısı
- burun kanaması
- yorgunluk
- zayıflık
- baş dönmesi
- kabızlık
- hemoroid
- artan terleme
- karın ağrısı
- dudaklarda veya ağızda ve boğazda beyaz lekeler veya yaralar
- ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi
- sırt, kemik, eklem, uzuv veya kas ağrısı
- uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- ateş, öksürük, boğaz ağrısı, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri
- hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı
- nefes darlığı
- göğüs ağrısı
- kızarma
- dudakların, dilin veya boğazın şişmesi
- nefes alma veya yutma zorluğu
- kurdeşen
- döküntü
- kaşıntı
- yeni veya kötüleşen öksürük
- hırıltı
- kahve telvesi gibi görünen kan kusma veya malzeme kusma
- olağandışı kanama veya morarma
- idrar yaparken yanma veya ağrı

Midostaurin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun midostaurin'e verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Rydapt®

Son Revize - 08/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022