

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612038.html>

## ميرابيغرون تنطق باسم (mir 'a beg' ron)

### لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Mirabegron بمفرده أو بالاشتراك مع (Vesicare) solifenacin لعلاج فرط نشاط المثانة (حالة تنقبض فيها عضلات المثانة بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتسبب التبول المتكرر والحاجة الملحة للتبول وعدم القدرة على التحكم في التبول) عند البالغين. كما أنه يستخدم لعلاج فرط نشاط النافصة العصبية (حالة التحكم في المثانة الناتجة عن مشكلة الدماغ أو نخاع الشوكي أو الأعصاب) عند الأطفال بعمر 3 سنوات فما فوق. ميرابيغرون ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى ناهضات بيتا 3 الأدرينالية. وهو يعمل عن طريق إرخاء عضلات المثانة لمنع التبول العاجل أو المتكرر أو غير المنضبط.

### كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Mirabegron كجهاز لوحي ممتد المفعول (طويل المفعول) وكتعليق ممتد المفعول ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناول الأقراص مع أو بدون طعام مرة واحدة يومياً للبالغين ومع الطعام مرة واحدة يومياً عند الأطفال. عادة ما يتم تناول المعلق مع الطعام مرة واحدة في اليوم. خذ mirabegron في نفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ ميرابيغرون بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلاع أقراص ممتدة المفعول كاملة بالماء ؛ لا تقسمها أو تمضغها أو تسحقها.

من المهم استخدام جهاز الجرعات الفموية لقياس وأخذ جرعتك بدقة من تعليق الإصدار الممتد. اسأل الصيدلي عن جهاز إذا لم يتم توفيره. رجي الزجاجة بقوة لمدة دقيقة واحدة ، ثم اتركها لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تختفي الرغوة الموجودة أعلى التعليق. إذا لم تختلط الحبيبات جيداً ، قم برج الزجاجة بقوة مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة واطرفها حتى تختفي الرغوة. استخدم جهاز الجرعات الفموية لرسم التعليق وتجاهل أي فقاعات في قياسك. لا تحتفظ بالجرعة في حقنة الجرعات لوقت لاحق ؛ استخدم في غضون 1 ساعة بعد التحضير. بعد كل استخدام ، اغسل جهاز الجرعات الفموية بصابون لطيف ، ثم اشطفه بماء الصنبور واتركه يجف في الهواء. إذا لم يتم استخدام المعلق لمدة يومين أو أكثر ، قم برج الزجاجة لمدة دقيقة واحدة كل يوم.

قد يزيد طبيبك جرعتك ، اعتماداً على مدى التحكم في الأعراض والآثار الجانبية التي تواجهها. تحدث إلى طبيبك حول ما تشعر به أثناء علاجك بـ Mirabegron.

يتحكم Mirabegron في أعراض فرط نشاط المثانة أو فرط النشاط العصبي ، لكنه لا يعالج هذه الحالات. قد يستغرق الأمر 8 أسابيع أو أكثر قبل أن تشعر بالفائدة الكاملة لـ mirabegron. استمر في تناول ميرابيجرون حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول ميرابيجرون دون التحدث مع طبيبك.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

### قبل أخذ ميرابيجرون ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ميرابيجرون أو أي أدوية أخرى أو أي من المكونات الموجودة في أقراص ميرابيجرون الممتدة المفعول والتعليق. اسأل الصيدلي أو تحقق من معلومات المريض للحصول على قائمة بالمكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين (كومادين ، جانتوفين) ؛ ديسبيرامين (نوربرامين) ؛ الديجوكسين (لانوكسين) ؛ فليكاينيد (تامبوكور) ؛ أدوية أخرى لفرط نشاط المثانة مثل داريفيناسين (إنابليكس) ، فيزوتيرودين (توفياز) ، أوكسي بوتينين (جلينيك ، أوكسيترول) ، سوليفيناسين (VESIcare) ، تولتيرودين (ديترول) ، وتروسبيوم ؛ بروفاينون (ريشمول) ؛ ميتوبرولول (لوبريسور ، توبرول ، في دوتوبرول) ؛ وثيوريدازين. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من انسداد في مخرج المثانة (انسداد في قاعدة المثانة يمنع البول من التدفق بحرية خارج المثانة ويسبب صعوبة في إفراغ المثانة و / أو ضعف مجرى البول) ، ارتفاع ضغط الدم ، أو أمراض الكلى أو الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول ميرابيجرون ، فاتصل بطبيبك.
- يجب أن تعلم أن ضغط دمك قد يرتفع أثناء علاجك بميرابيجرون. سيقوم طبيبك بفحص ضغط الدم بانتظام أثناء العلاج.

## قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

## قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

إدامضى أقل من 12 ساعة على الجرعة الفائتة ، فتناولها حالما تتذكرها. إذا مر أكثر من 12 ساعة على الجرعة الفائتة ، فتخطها واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Mirabegron آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- صداع الراس
- دوخة
- فم جاف
- إمساك
- ألم في الظهر
- ألم المفاصل

• صعوبة إفراغ المثانة ، أو ضعف مجرى البول (خاصة عند استخدامه مع سوليفيناسين)

## بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- انتفاخ الوجه ، الشفتين ، اللسان أو الحلق ، صعوبة في التنفس أو البلع ، شرى ، طفح جلدي ، حكة.
- التبول الصعب أو المؤلم أو العاجل أو المتكرر

قد يسبب Mirabegron آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزين الأجهزة اللوحية في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). قم بتخزين المعلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 28 يوماً بعد تاريخ تحضير الصيدلي للتعليق.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org] http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] http://goo.gl/c4Rm4p]. لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

## نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- ضربات قلب سريعة أو خفقان

## قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

ابقاء جميع المواعيد مع الطبيب.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحصار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

- Myrbetriq®

آخر مراجعة - 15/06/2021

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022