

פרמיפקסול (pra mi pex' ole) מבוסא בתור

היי האם נרשמה תרופה זו?

פרמיפקסול הוא בקבוצה של תרופות הנקראות אגוניסטים לדופמין. זה פועל על ידי פעולה במקום דופמין, חומר טבעי במוח הדרוש לשליטה בתנועה. (מצב הגורם לאי נוחות ברגליים ודחף חזק להזיז את הרגליים, במיוחד בלילה ובישיבה או שכיבה; RLS) משמש גם לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוחה Pramipexole. כולל רעד של חלקים בגוף, נוקשות, האטה בתנועות, ובעיות בשיווי משקל, הפרעה במערכת העצבים הגורמת לקשיים בתנועה, שליטה בשרירים ושיווי משקל; PD) משמש לבד או עם תרופות אחרות לטיפול בסימפטומים של מחלת פרקינסון Pramipexole

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

מגיע כטבליה וטבליה בשחרור מורחב (ארוכת טווח) לנטילה דרך הפה. כאשר משתמשים בפרמיפקסול לטיפול במחלת פרקינסון, הטבליה הרגילה נלקחת בדרך כלל שלוש פעמים ביום וטבליית השחרור המורחבת נלקחת בדרך כלל פעם ביום. כאשר פרמיפקסול משמש לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוחה, הטבליה הרגילה נלקחת בדרך כלל פעם ביום, 2 עד 3 שעות לפני השינה. טבליות פרמיפקסול בשחרור מורחב אינן משמשות לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוחה. ניתן ליטול פרמיפקסול עם או בלי אוכל, אך נטילת פרמיפקסול עם אוכל עשויה לסייע במניעת בחילות שעלולות להיגרם על ידי התרופה. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח פרמיפקסול בדיוק לפי ההוראות Pramipexole

לבלוע את הטבליות בשחרור מורחב בשלמותן; אין לפצל, ללעוס או לכתוש אותם.

הרופא שלך יתחיל במינון נמוך של פרמיפקסול ויגדיל בהדרגה את המינון. הרופא שלך כנראה לא יעלה את המינון שלך לעתים קרובות יותר מפעם אחת כל 4 עד 7 ימים. ייתכן שיחלפו מספר שבועות עד שתגיע למינון המתאים לך.

אם אתה נוטל פרמיפקסול לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוחה, עליך לדעת שככל שהטיפול שלך נמשך, הסימפטומים שלך עשויים להחמיר, עשויים להתחיל מוקדם יותר בערב או אחר הצהריים, או עלולים להופיע בשעות הבוקר המוקדמות. התקשר לרופא שלך אם התסמינים שלך מחמירים או אם הם מתחילים להופיע בזמנים שונים מאשר בעבר.

פרמיפקסול שולט בסימפטומים של מחלת פרקינסון ותסמונת רגליים חסרות מנוח אך אינו מרפא מצבים אלו. המשך ליטול פרמיפקסול גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול פרמיפקסול מבלי לדבר עם הרופא שלך. אם אתה נוטל פרמיפקסול לטיפול במחלת פרקינסון ואתה מפסיק לפתע לקחת את התרופה, אתה עלול לחוות חום, בלבול, נוקשות שרירים, חוסר עניין או דאגה לפעילויות רגילות או לדברים שבדרך כלל אכפת לך מהם, חרדה, דיכאון, עייפות, קושי להירדם או להישאר ישן, הזעה או כאב. אם אתה נוטל פרמיפקסול לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוח ואתה מפסיק לפתע לקחת את התרופה, הסימפטומים שלך עלולים להחמיר ממה שהיו לפני שהתחלת ליטול את התרופה. הרופא שלך כנראה יקטין את המינון שלך בהדרגה.

אם אתה מפסיק ליטול פרמיפקסול מכל סיבה שהיא, אל תתחיל לקחת את התרופה שוב מבלי לדבר עם הרופא שלך. הרופא שלך כנראה ירצה להעלות שוב את המינון בהדרגה.

בקש מהרוקח או מהרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו נרשמה לפעמים לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת פרמיפקסול,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לפרמיפקסול או לכל תרופה אחרת, או לאחד מהמרכיבים בטבליות פרמיפקסול או בטבליות בשחרור מורחב. בקש מהרופא או הרוקח שלך רשימה של המרכיבים הלא פעילים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: אנטיהיסטמינים; סימטידין (Tagamet); תרופות לאלרגיות, מחלות נפש ובחילות; (Reglan) metoclopramide; תרופות הרגעה; כדורי שינה; וכדורי הרגעה. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת נפש, בעיות בשליטה על תנועת השרירים שלך, הפרעת שינה מלבד תסמונת רגליים חסרות מנוחה, סחרחורת, עילפון, לחץ דם נמוך או מחלת כליות.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת פרמיפקסול, התקשר לרופא שלך.
- עליך לדעת כי פרמיפקסול עלול לגרום לך לנמנום או לגרום לך להירדם בפתאומיות במהלך הפעילויות היומיומיות הרגילות שלך. אולי לא תרגיש מנומנם לפני שאתה נרדם פתאום. אין לנהוג במכונית או להפעיל מכונות בתחילת הטיפול עד שתדע כיצד פרמיפקסול ישפיע עליך. אם אתה נרדם לפתע בזמן שאתה עושה משהו כמו צפייה בטלוויזיה או נסיעה במכונית, או אם אתה נהיה מנומנם מאוד, התקשר לרופא שלך. אל תנהג או תפעיל מכונות עד שתדבר עם הרופא שלך.
- אתה צריך לדעת שאלכוהול יכול להוסיף לנמנום הנגרמת על ידי תרופה זו. ספר לרופא שלך אם אתה שותה באופן קבוע משקאות אלכוהוליים.
- עליך לדעת כי פרמיפקסול עלול לגרום לסחרחורת, סחרחורת, בחילה, עילפון או הזעה כאשר אתה קם מהר מדי מישיבה או שכיבה. זה נפוץ יותר כשאתה

התחל תחילה ליטול פרמיפקסול, או כאשר המינון שלך גדל. כדי להימנע מבעיה זו, צא מהכיסא או מהמיטה באיטיות, הנח את הרגליים על הרצפה למשך מספר דקות לפני קימה.

- עליך לדעת שחלק מהאנשים שלקחו תרופות כגון פרמיפקסול לטיפול במחלת פרקינסון או תסמונת רגליים חסרות מנוחה פיתחו בעיות הימורים, עניין מוגבר בקניות או מין, בעיות אכילת יתר או דחפים או התנהגויות עזות אחרות שהיו כפייתיות או חריגות עבורם. אין מספיק מידע כדי לדעת אם האנשים פיתחו את הבעיות הללו בגלל שהם נטלו את התרופה או מסיבות אחרות. התקשר לרופא שלך אם אתה מפתח דחפים עזים או מתקשה לשלוט בכל אחת מההתנהגויות הללו. ספר לבני משפחתך על הסיכונים הללו כדי שיוכלו להתקשר לרופא גם אם אינך מבין שההתנהגות שלך הפכה לבעיה.
- עליך לדעת שאם אתה נוטל את הטבליות בשחרור מורחב, ייתכן שתבחין במשהו שנראה כמו טבליה נפוחה או חתיכות טבליות נפוחות בצואה שלך. אם זה קורה, במיוחד יחד עם החמרה בתסמיני מחלת הפרקינסון, התקשר לרופא שלך.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשיך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם אתה נוטל טבליות פרמיפקסול רגילות לטיפול במחלת פרקינסון, קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר זאת. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשיך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

אם אתה נוטל טבליות פרמיפקסול רגילות לטיפול בתסמונת רגליים חסרות מנוחה, דלג על המנה שהוחמצה. קח את המנה הרגילה שלך 2 עד 3 שעות לפני השינה הבאה שלך. אין להכפיל את המנה הבאה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אם אתה נוטל את טבליות הפרמיפקסול בשחרור מורחב ואתה מתגעגע למנה, קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר זאת. עם זאת, אם חלפו יותר מ-12 שעות מאז המנה שהוחמצה, דלג על המנה שהוחמצה והמשיכו בלוח הזמנים הרגיל של המינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

פרמיפקסול עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- בחילה
- חולשה
- סתירות
- איבוד שיווי משקל, נפילה
- קושי להירדם או להישאר ישן
- קושי לזכור
- חלומות לא נורמליים
- צרבת

- עצירות
- שלשול
- פה יבש
- מפרקים נפוחים, נוקשים או כואבים
- כאבים בגב, בידיים או ברגליים
- הטלת שתן תכופה או צורך דחוף במתן שתן
- קושי במתן שתן או כאב בעת מתן שתן

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא שלך מיד:

- הזיות (לראות דברים או לשמוע קולות שאינם קיימים), בלבול, התנהגות תוקפנית, תסיסה, מחשבות חריגות
- שינויים בראייה
- תנועות גוף חריגות ותנועות שאינך יכול לשלוט בהן
- שינויים באופן שבו אתה יושב או עומד שאינך יכול לשלוט בהם, כמו הצוואר שלך מתכופף קדימה, כיפוף קדימה במוותניים, או הטיה הצידה כשאתה יושב, עומד או הולך,
- שתן כהה, אדום או בצבע קולה
- רגישות בשרירים
- נוקשות שרירים או כאבים
- חולשת שרירים

פרמיפקסול עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן שאתה נוטל תרופה זו.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה). אחסן את הטבליות הרגילות הרחק מאור.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון משמר גלולות שבועי ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (http://goo.gl/c4Rm4p) [http://goo.gl/c4Rm4p].

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help> [https://www.poisonhelp.org/help]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- דופק מהיר

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- מיראפקס®
- מיראפקס® ER

עדכון אחרון - 15/02/2022

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

© AHFS מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022