



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [プラミペキソール](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html>

プラミペキソール

(pra mi pex'ole) と発音されます

なぜこの薬が処方されているのですか？

プラミペキソールは、パーキンソン病 (PD;運動、筋肉制御、バランスの問題を引き起こす神経系の障害) の症状を治療するために、単独で、または他の薬と一緒に使用されます。とバランスの問題。プラミペキソールは、むずむず脚症候群 (RLS;特に夜間や座ったり横になったりするとき脚に不快感を与え、脚を動かしたいという強い衝動を引き起こす状態) の治療にも使用されます。プラミペキソールは、ドーパミン作動薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、動きを制御するために必要な脳内の天然物質であるドーパミンの代わりに作用することによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

プラミペキソールは、錠剤と徐放性 (長時間作用型) 錠剤として経口摂取できます。パーキンソン病の治療にプラミプレキソールを使用する場合、通常の錠剤は通常1日3回服用し、徐放性錠剤は通常1日1回服用します。むずむず脚症候群の治療にプラミプレキソールを使用する場合、通常の錠剤は通常、就寝時刻の2~3時間前に1日1回服用します。プラミペキソール徐放性錠剤は、むずむず脚症候群の治療には使用されません。プラミペキソールは食事の有無にかかわらず服用できますが、食事と一緒に服用すると、薬によって引き起こされる可能性のある吐き気を防ぐのに役立つ場合があります。処方箋ラベルの指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにプラミペキソールを服用してください。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

あなたの医師はプラミペキソールの低用量であなたを始めて、徐々にあなたの用量を増やします。あなたの医師はおそらく4から7日に1回より頻繁にあなたの用量を増やすことはありません。あなたがあなたのために働く用量に達するまでに数週間かかるかもしれません。

むずむず脚症候群の治療にプラミペキソールを服用している場合は、治療を続けると症状が悪化したり、夕方や午後が始まったり、早朝に発生したりする可能性があることを知っておく必要があります。症状が悪化した場合、または過去とは異なる時期に症状が現れ始めた場合は、医師にご相談ください。

プラミペキソールはパーキンソン病とむずむず脚症候群の症状をコントロールしますが、これらの症状を治すことはありません。気分が良くてもプラミペキソールを服用し続けてください。医師に相談せずにプラミペキソールの服用を中止しないでください。パーキンソン病を治療するためにプラミペキソールを服用していて、突然薬の服用をやめた場合、通常の活動や通常気になることへの関心や懸念の欠如、不安、うつ病、倦怠感、眠りにつく、または眠り続けることの困難、発汗、または痛み。むずむず脚症候群を治療するためにプラミペキソールを服用していて、突然薬の服用をやめた場合、この薬を服用し始める前よりも症状が悪化する可能性があります。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に減らします。

何らかの理由でプラミペキソールの服用を中止した場合は、医師に相談せずに薬の服用を再開しないでください。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に増やしたいと思うでしょう。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方されることもあります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

プラミペキソールを服用する前に、

- プラミペキソールやその他の薬、またはプラミペキソール錠や徐放性錠の成分にアレルギーがあるかどうかを医師や薬剤師に伝えてください。不活性成分のリストについては、医師または薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の処方薬と非処方薬のビタミン、栄養補助食品、ハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。抗ヒスタミン薬。シメチジン（タガメット）；アレルギー、精神疾患、および吐き気のための薬；メトクロプラミド（レグラ）；鎮静剤；睡眠薬；と精神安定剤。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 精神疾患、筋肉の動きの制御の問題、むずむず脚症候群以外の睡眠障害、めまい、失神、低血圧、または腎臓病があるかどうかを医師に伝えてください。
- 妊娠しているか、妊娠を計画しているか、授乳中であるかを医師に伝えてください。プラミペキソールの服用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。
- プラミペキソールは、通常の日常生活の中で眠気を催したり、突然眠りにつく可能性があることを知っておく必要があります。突然眠りにつく前に、眠気を感じないかもしれません。プラミペキソールがどのように影響するかがわかるまで、治療の開始時に車を運転したり、機械を操作したりしないでください。テレビを見たり、車に乗ったりしているときに突然眠りに落ちた場合、または非常に眠くなった場合は、医師に連絡してください。医師に相談するまでは、機械を運転したり操作したりしないでください。
- あなたはアルコールがこの薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があることを知っておくべきです。定期的にアルコール飲料を飲む場合は、医師に相談してください。
- プラミペキソールは、座ったり横臥したりする姿勢から立ち上がるのが速すぎると、めまい、立ちくらみ、吐き気、失神、発汗を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。これはあなたが

最初にプラミペキソールの服用を開始するか、用量を増やしたときに服用を開始します。この問題を回避するには、椅子またはベッドからゆっくりと降り、立ち上がる前に数分間床に足を置きます。

- パーキンソン病やむずむず脚症候群を治療するためにプラミペキソールなどの薬を服用した人の中には、ギャンブル依存症、買い物やセックスへの関心の高まり、過食の問題、または他の強い衝動や行動を強要または異常にした人がいることを知っておく必要があります。人々が薬を服用したため、または他の理由でこれらの問題を発症したかどうかを判断するのに十分な情報はありません。強い衝動を引き起こしたり、これらの行動のいずれかを制御するのが困難な場合は、医師に連絡してください。自分の行動が問題になっていることに気づかなくても、家族が医者に電話できるように、これらのリスクについて家族に伝えてください。
- 徐放性錠剤を服用している場合、スツール内の錠剤の腫れや錠剤の破片のように見えるものに気付く可能性があることを知っておく必要があります。これが発生した場合、特にパーキンソン病の症状が悪化した場合は、医師に連絡してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

パーキンソン病を治療するために通常のプラミペキソール錠を服用している場合は、忘れた分を覚えてからすぐに服用してください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

むずむず脚症候群を治療するために通常のプラミペキソール錠を服用している場合は、飲み忘れた場合はスキップしてください。次の就寝時刻の2〜3時間前に通常の服用をしてください。飲み忘れた分を補うために、次の服用を2倍にしないでください。

徐放性プラミペキソール錠を服用していて、服用し忘れた場合は、覚えてからすぐに服用してください。ただし、飲み忘れてから12時間以上経過した場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

プラミペキソールは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 弱点
- めまい
- バランスの喪失、低下
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- 覚えにくい
- 異常な夢
- 胸焼け

- 便秘
- 下痢
- 口渇
- 関節の腫れ、こわばり、または痛み
- 背中、腕または脚の痛み
- 頻尿または緊急の排尿の必要性
- 排尿困難または排尿時の痛み

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 幻覚（存在しないものを見たり、声を聞いたりする）、混乱、攻撃的な行動、動揺、異常な思考
- 視力の変化
- 異常な体の動きや制御できない動き
- 首を前に曲げたり、腰を前に曲げたり、座ったり、立ったり、歩いたりするときに横に傾くなど、制御できない座り方や立ち方の変化。
- 濃い、赤、またはコーラ色の尿
- 筋肉の優しさ
- 筋肉のこわばりや痛み
- 筋力低下

プラミベキソールは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬を服用しているときに異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) または電話 (1-800-332-1088)。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。通常の錠剤は光を避けて保管してください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- 速い心拍数

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ミラベックス®
- ミラベックス®ER

最終改訂日-2022年2月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日