



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Pramipexol

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html>

## **Pramipexol** pronunțat ca (pra mi pex' ole)

### **de ce este prescris acest medicament?**

Pramipexolul este utilizat singur sau împreună cu alte medicamente pentru a trata simptomele bolii Parkinson (PD; o tulburare a sistemului nervos care provoacă dificultăți de mișcare, control muscular și echilibru), inclusiv tremuraturul unor părți ale corpului, rigiditatea, mișcările încetinite, și probleme cu echilibrul. Pramipexolul este, de asemenea, utilizat pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite (RLS; o afecțiune care provoacă disconfort la nivelul picioarelor și o nevoie puternică de a mișca picioarele, în special noaptea și când stați în picioare sau întins). Pramipexolul face parte dintr-o clasă de medicamente numite agoniști ai dopaminei. Funcționează acționând în locul dopaminei, o substanță naturală din creier care este necesară pentru a controla mișcarea.

### **cum trebuie utilizat acest medicament?**

Pramipexolul vine sub formă de comprimat și un comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) pentru administrare pe cale orală. Când pramipexolul este utilizat pentru a trata boala Parkinson, comprimatul obișnuit este de obicei luat de trei ori pe zi, iar comprimatul cu eliberare prelungită este de obicei administrat o dată pe zi. Când pramipexolul este utilizat pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite, comprimatul obișnuit se ia de obicei o dată pe zi, cu 2 până la 3 ore înainte de culcare. Pramipexol comprimate cu eliberare prelungită nu este utilizat pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite. Pramipexol poate fi luat cu sau fără alimente, dar administrarea pramipexolului cu alimente poate ajuta la prevenirea greață care poate fi cauzată de medicament. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați pramipexol exact conform instrucțiunilor.

Înghițiți comprimatele cu eliberare prelungită întregi; nu le despicăți, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă va începe să utilizați o doză mică de pramipexol și vă va crește treptat doza. Probabil că medicul dumneavoastră nu vă va crește doza mai des decât o dată la 4 până la 7 zile. Poate dura câteva săptămâni până când ajungeți la o doză care funcționează pentru dumneavoastră.

Dacă luați pramipexol pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite, trebuie să știți că, pe măsură ce tratamentul dumneavoastră continuă, simptomele dumneavoastră se pot agrava, pot începe mai devreme seara sau după-amiaza sau pot apărea dimineața devreme. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau dacă încep să apară în momente diferite decât în trecut.

Pramipexolul controlează simptomele bolii Parkinson și ale sindromului picioarelor neliniștite, dar nu vindecă aceste afecțiuni. Continuați să luați pramipexol chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați pramipexol fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă luați pramipexol pentru a trata boala Parkinson și încetați brusc să luați medicamentul, este posibil să aveți febră, confuzie, rigiditate musculară, lipsă de interes sau îngrijorare pentru activitățile obișnuite sau pentru lucrurile care vă pasă de obicei, anxietate, depresie, oboseală, dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit, transpirație sau durere. Dacă luați pramipexol pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite și încetați brusc să luați medicamentul, simptomele dumneavoastră pot deveni mai agravate decât erau înainte de a începe să luați acest medicament. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil doza treptat.

Dacă încetați să luați pramipexol din orice motiv, nu începeți să luați din nou medicamentul fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va dori probabil să vă mărească din nou doza treptat.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

### **există utilizări pentru acest medicament**

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

## **ce precauții speciale ar trebui să urmez?**

### **Înainte de a lua pramipexol,**

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pramipexol sau la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de pramipexol sau comprimatelor cu eliberare prelungită. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a ingredientelor inactive.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antihistaminice; cimetidină (Tagamet); medicamente pentru alergii, boli mintale și greață; metoclopramidă (Reglan); sedative; somnifere; și tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală mintală, dificultăți în controlul mișcării mușchilor, o tulburare de somn, alta decât sindromul picioarelor neliniștite, amețeli, leșin, tensiune arterială scăzută sau boli de rinichi.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați pramipexol, adresați-vă medicului dumneavoastră.
- trebuie să știți că pramipexolul vă poate provoca somnolență sau vă poate face să adormiți brusc în timpul activităților zilnice obișnuite. Este posibil să nu simțiți somnolență înainte de a adormi brusc. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje la începutul tratamentului până când nu știți cum vă va afecta pramipexolul. Dacă adormi brusc în timp ce faci ceva, cum ar fi să te uiți la televizor sau să mergi într-o mașină, sau dacă devii foarte somnoros, cheamă-ți medicul. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje până nu discutați cu medicul dumneavoastră.
- trebuie să știți că alcoolul poate adăuga somnolență cauzată de acest medicament. Spuneți medicului dumneavoastră dacă beți în mod regulat băuturi alcoolice.
- trebuie să știți că pramipexolul poate provoca amețeli, amețeli, greață, leșin sau transpirație atunci când vă treziți prea repede dintr-o poziție așezată sau culcat. Acest lucru este mai frecvent când dvs

Începeți mai întâi să luați pramipexol sau când doza dumneavoastră este crescută. Pentru a evita această problemă, ridicați-te încet de pe scaun sau din pat, sprijinindu-ți picioarele pe podea câteva minute înainte de a te ridica.

- Trebuie să știți că unele persoane care au luat medicamente precum pramipexol pentru a trata boala Parkinson sau sindromul picioarelor neliniștite au dezvoltat probleme legate de jocurile de noroc, un interes crescut pentru cumpărături sau sex, probleme de alimentație excesivă sau alte impulsuri sau comportamente intense care erau compulsive sau neobișnuite pentru ei. Nu există suficiente informații pentru a spune dacă oamenii au dezvoltat aceste probleme pentru că au luat medicamentele sau din alte motive. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți îndemnuri intense sau aveți dificultăți în a controla oricare dintre aceste comportamente. Spune-le membrilor familiei despre aceste riscuri, astfel încât să poată suna medicul chiar dacă nu realizezi că comportamentul tău a devenit o problemă.
- trebuie să știți că, dacă luați comprimate cu eliberare prelungită, este posibil să observați ceva care arată ca un comprimat umflat sau bucăți de comprimat umflate în scaun. Dacă se întâmplă acest lucru, în special împreună cu o agravare a simptomelor bolii Parkinson, adresați-vă medicului dumneavoastră.

## ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă luați obișnuit comprimate de pramipexol pentru a trata boala Parkinson, luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă luați comprimate obișnuite de pramipexol pentru a trata sindromul picioarelor neliniștite, săriți peste doza omisă. Luați doza obișnuită cu 2 până la 3 ore înainte de următoarea culcare. Nu dublați doza următoare pentru a compensa doza omisă.

Dacă luați comprimatele de pramipexol cu eliberare prelungită și omiteți o doză, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă au trecut mai mult de 12 ore de la doza omisă, săriți peste doza uitată și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

**Pramipexolul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:**

- greață
- slăbiciune
- amețelă
- pierderea echilibrului, cădere
- dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit
- dificultate de amintire
- vise anormale
- arsuri la stomac

- constipație
- diaree
- gură uscată
- articulații umflate, rigide sau dureroase
- dureri de spate, brațe sau picioare
- urinare frecventă sau nevoie urgentă de a urina
- dificultate la urinare sau durere la urinare

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:**

- halucinații (vezi lucruri sau auzi voci care nu există), confuzie, comportament agresiv, agitație, gânduri anormale
- modificări ale vederii
- mișcări anormale ale corpului și mișcări pe care nu le puteți controla
- modificări ale modului în care stai sau stai în picioare pe care nu le poți controla, cum ar fi gâtul aplecat înainte, aplecat înainte la talie sau înclinat lateral când stai, stai în picioare sau mergi,
- urină închisă, roșie sau de culoarea cola
- sensibilitate musculară
- rigiditate sau durere musculară
- slăbiciune musculară

Pramipexolul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

### **ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?**

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Păstrați comprimatele obișnuite departe de lumină.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

### Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- ritm cardiac rapid

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Mirapex®
- Mirapex®ER

Ultima revizuire - 15.02.2022

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS® Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022