



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Pramipexol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html>

## Pramipexol

uttalas som (pra mi pex'ole)

### hur är denna medicin utskriven?

Pramipexol används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla symptomen på Parkinsons sjukdom (PD; en störning i nervsystemet som orsakar svårigheter med rörelse, muskelkontroll och balans), inklusive skakningar av delar av kroppen, stelhet, långsamma rörelser, och problem med balansen. Pramipexol används också för att behandla restless legs syndrome (RLS; ett tillstånd som orsakar obehag i benen och en stark lust att röra på benen, särskilt på natten och när man sitter eller ligger ner). Pramipexol är i en klass av läkemedel som kallas dopaminagonister. Det fungerar genom att verka i stället för dopamin, ett naturligt ämne i hjärnan som behövs för att kontrollera rörelser.

### hur ska detta läkemedel användas?

Pramipexol kommer som en tablett och en tablett med förlängd frisättning (långverkande) att ta genom munnen. När pramipexol används för att behandla Parkinsons sjukdom, tas den vanliga tabletten vanligtvis tre gånger om dagen och tabletten med förlängd frisättning tas vanligtvis en gång dagligen. När pramipexol används för att behandla restless legs-syndrom, tas den vanliga tabletten vanligtvis en gång om dagen, 2 till 3 timmar före sänggåendet. Pramipexol tabletter med förlängd frisättning används inte för att behandla restless legs syndrome. Pramipexol kan tas med eller utan mat, men att ta pramipexol med mat kan hjälpa till att förhindra illamående som kan orsakas av medicinen. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta pramipexol exakt enligt anvisningarna.

Svälj tabletterna med förlängd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Din läkare kommer att börja med en låg dos pramipexol och gradvis öka din dos. Din läkare kommer förmodligen inte att öka din dos oftare än en gång var 4:e till 7:e dag. Det kan ta flera veckor innan du når en dos som fungerar för dig.

Om du tar pramipexol för att behandla restless legs syndrome, bör du veta att när din behandling fortsätter kan dina symtom förvärras, kan börja tidigare på kvällen eller eftermiddagen eller kan uppstå tidigt på morgonen. Ring din läkare om dina symtom förvärras eller om de börjar uppstå vid andra tidpunkter än tidigare.

Pramipexol kontrollerar symptomen på Parkinsons sjukdom och restless legs syndrom men botar inte dessa tillstånd. Fortsätt att ta pramipexol även om du mår bra. Sluta inte ta pramipexol utan att tala med din läkare. Om du tar pramipexol för att behandla Parkinsons sjukdom och du plötsligt slutar ta medicinen, kan du uppleva feber, förvirring, muskelstelhet, ointresse eller oro för vanliga aktiviteter eller saker du brukar bry dig om, ångest, depression, trötthet, svårigheter att somna eller sova, svettning eller smärta. Om du tar pramipexol för att behandla restless legs-syndrom och du plötsligt slutar ta medicinen, kan dina symtom bli värre än de var innan du började ta denna medicin. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

Om du slutar ta pramipexol av någon anledning, börja inte ta medicinen igen utan att prata med din läkare. Din läkare kommer troligen att vilja öka din dos gradvis igen.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

#### användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

#### Innan du tar pramipexol,

- Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pramipexol eller någon annan medicin, eller någon av ingredienserna i pramipexol tabletter eller depottabletter. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över de inaktiva ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antihistaminer; cimetidin (Tagamet); mediciner för allergier, psykisk sjukdom och illamående; metoklopramid (Reglan); lugnande medel; sömntabletter; och lugnande medel. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft psykisk sjukdom, problem med att kontrollera dina musklers rörelser, en annan sömnstörning än restless legs syndrome, yrsel, svimning, lågt blodtryck eller njursjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar pramipexol, kontakta din läkare.
- du bör veta att pramipexol kan göra dig dåsig eller kan få dig att plötsligt somna under dina vanliga dagliga aktiviteter. Du kanske inte känner dig dåsig innan du plötsligt somnar. Kör inte bil eller använd maskiner i början av din behandling förrän du vet hur pramipexol kommer att påverka dig. Om du plötsligt somnar medan du gör något som att titta på tv eller åka bil, eller om du blir mycket dåsig, ring din läkare. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du pratat med din läkare.
- du bör veta att alkohol kan öka dåsigheten som orsakas av denna medicin. Tala om för din läkare om du regelbundet dricker alkoholhaltiga drycker.
- du bör veta att pramipexol kan orsaka yrsel, yrsel, illamående, svimning eller svettning när du reser dig upp för snabbt från sittande eller liggande läge. Detta är vanligare när du

börja ta pramipexol först, eller när din dos höjs. För att undvika detta problem, gå långsamt upp ur stolen eller sängen, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.

- du bör veta att vissa personer som tog mediciner som pramipexol för att behandla Parkinsons sjukdom eller restless legs syndrom utvecklade spelproblem, ett ökat intresse för shopping eller sex, överättningsproblem eller andra intensiva drifter eller beteenden som var tvångsmässiga eller ovanliga för dem. Det finns inte tillräckligt med information för att säga om personerna utvecklade dessa problem för att de tog medicinen eller av andra skäl. Ring din läkare om du utvecklar intensiva drifter eller har svårt att kontrollera något av dessa beteenden. Berätta för dina familjemedlemmar om dessa risker så att de kan ringa läkaren även om du inte inser att ditt beteende har blivit ett problem.
- du bör veta att om du tar tablettorna med förlängd frisättning kan du märka något som ser ut som en svullen tablett eller svullna tabletter i avföringen. Om detta händer, särskilt tillsammans med förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, kontakta din läkare.

## **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

### **hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?**

Om du tar vanliga pramipexol-tabletter för att behandla Parkinsons sjukdom, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Om du tar vanliga pramipexol-tabletter för att behandla restless legs-syndrom, hoppa över den missade dosen. Ta din vanliga dos 2 till 3 timmar före nästa läggdags. Dubbla inte nästa dos för att kompensera för den missade dosen.

Om du tar pramipexol-tablettorna med förlängd frisättning och du missar en dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det gått mer än 12 timmar sedan din missade dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

## **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Pramipexol kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- illamående
- svaghet
- yrsel
- förlust av balans, fallande
- svårt att somna eller att sova
- svårt att komma ihåg
- onormala drömmar
- halsbränna

- förstoppning
- diarre
- torr mun
- svullna, stela eller smärtsamma leder
- smärta i rygg, armar eller ben
- frekvent urinering eller akut behov av att kissa
- svårighet att kissa eller smärta vid kissning

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart:**

- hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns), förvirring, aggressivt beteende, agitation, onormala tankar
- förändringar i synen
- onormala kroppsrörelser och rörelser som du inte kan kontrollera
- förändringar i sättet du sitter eller står på som du inte kan kontrollera, som att din nacke böjs framåt, böjer dig framåt i midjan eller lutar i sidled när du sitter, står eller går,
- mörk, röd eller kolafärgad urin
- muskelömheter
- muskelstelhet eller värk
- muskelsvaghet

Pramipexol kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

## **Hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?**

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara de vanliga tablettorna borta från ljus.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

## n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

### Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- snabb puls

### hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## rand namn

- Mirapex®
- Mirapex®ER

Senast reviderad - 2022-02-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022