



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 普拉克索

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html>

## 普拉克索

发音为 (pra mi pex' ole)

### 为什么要开这种药?

普拉克索单独使用或与其他药物一起用于治疗帕金森病 (PD; 一种导致运动、肌肉控制和平衡困难的神经系统疾病) 的症状, 包括身体部位的颤抖、僵硬、运动缓慢、和平衡问题。普拉克索还用于治疗不宁腿综合征 (RLS; 一种导致腿部不适和强烈要求移动腿部的疾病, 尤其是在夜间和坐着或躺下时)。普拉克索属于一类称为多巴胺激动剂的药物。它通过代替多巴胺起作用, 多巴胺是大脑中控制运动所需的一种天然物质。

### 这个药应该怎么用?

普拉克索以片剂和缓释 (长效) 片剂的形式口服。当使用普拉克索治疗帕金森病时, 常规片剂通常每天服用 3 次, 缓释片剂通常每天服用一次。当普拉克索用于治疗不宁腿综合征时, 常规片剂通常每天服用一次, 睡前 2 至 3 小时。普拉克索缓释片不用于治疗不宁腿综合征。普拉克索可以与食物一起服用, 也可以不与食物一起服用, 但与食物一起服用普拉克索可能有助于预防可能由药物引起的恶心。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用普拉克索。

吞下整个缓释片; 不要分裂、咀嚼或压碎它们。

您的医生会让您开始服用低剂量的普拉克索, 然后逐渐增加剂量。您的医生可能不会每 4 到 7 天增加一次剂量。您可能需要数周时间才能达到适合您的剂量。

如果您正在服用普拉克索治疗不宁腿综合征, 您应该知道随着治疗的继续, 您的症状可能会恶化, 可能在晚上或下午早些时候开始, 或者可能在清晨发生。如果您的症状恶化或开始出现的时间与过去不同, 请致电您的医生。

普拉克索可以控制帕金森病和不安腿综合征的症状，但不能治愈这些疾病。即使您感觉良好，也要继续服用普拉克索。不要在未咨询医生的情况下停止服用普拉克索。如果您正在服用普拉克索来治疗帕金森病并且突然停止服药，您可能会出现发烧、精神错乱、肌肉僵硬、对日常活动或您通常关心的事情缺乏兴趣或关心、焦虑、抑郁、疲倦、难以入睡或保持睡眠，出汗或疼痛。如果您正在服用普拉克索来治疗不宁腿综合征并且您突然停止服药，您的症状可能会变得比您开始服用这种药物之前更严重。您的医生可能会逐渐减少您的剂量。

如果您因任何原因停止服用普拉克索，请不要在未咨询医生的情况下再次开始服药。您的医生可能会希望再次逐渐增加您的剂量。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

## 该药的其他用途

这种药物有时用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用普拉克索之前，

- 如果您对普拉克索或任何其他药物或普拉克索片剂或缓释片剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。请向您的医生或药剂师索取非活性成分的清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：抗组胺药；西咪替丁（Tagamet）；治疗过敏、精神疾病和恶心的药物；甲氧氯普胺（Reglan）；镇静剂；安眠药；和镇静剂。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 告诉您的医生您是否患有或曾经患有精神疾病、难以控制肌肉运动、除了不安腿综合征之外的睡眠障碍、头晕、昏厥、低血压或肾病。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用普拉克索期间怀孕，请致电您的医生。
- 您应该知道，普拉克索可能会使您昏昏欲睡，或者可能导致您在日常日常活动中突然入睡。在突然入睡之前，您可能不会感到困倦。在您知道普拉克索对您的影响之前，不要在治疗开始时开车或操作机器。如果您在做某事（例如看电视或开车时）突然睡着了，或者如果您变得非常困倦，请致电您的医生。在与您的医生交谈之前，请勿驾驶或操作机器。
- 您应该知道，酒精会加重这种药物引起的嗜睡。如果您经常喝酒精饮料，请告诉您的医生。
- 您应该知道，当您从坐姿或卧姿起床过快时，普拉克索可能会导致头晕、头晕、恶心、昏厥或出汗。这更常见，当你

首先开始服用普拉克索，或者当你的剂量增加时。为避免此问题，请慢慢从椅子或床上起身，将双脚放在地板上几分钟，然后再站起来。

- 您应该知道，一些服用普拉克索等药物治疗帕金森病或不宁腿综合征的人出现赌博问题、对购物或性行为的兴趣增加、暴饮暴食问题或其他对他们来说是强迫性或不寻常的强烈冲动或行为。没有足够的信息来判断人们出现这些问题是因为他们服用了药物还是其他原因。如果您有强烈的冲动或难以控制任何这些行为，请致电您的医生。告诉您的家人这些风险，即使您没有意识到您的行为已经成为问题，他们也可以打电话给医生。
- 你应该知道，如果你正在服用缓释片，你可能会注意到你的粪便中有一些看起来像肿胀的药片或肿胀的药片。如果发生这种情况，尤其是随着您的帕金森病症状恶化，请致电您的医生。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

## 如果我忘记服药该怎么办？

如果您正在服用常规的普拉克索片剂来治疗帕金森病，请在记起错过的剂量后立即服用。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

如果您正在服用常规普拉克索片剂来治疗不安腿综合征，请跳过错过的剂量。在下次睡前 2 至 3 小时服用常规剂量。不要将下一次剂量加倍以弥补错过的剂量。

如果您正在服用缓释普拉克索片剂并且您错过了剂量，请在记住后立即服用错过的剂量。但是，如果您错过的剂量超过 12 小时，请跳过错过的剂量并继续您的常规给药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

## 这种药物会引起副作用吗？

**普拉克索可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 恶心
- 弱点
- 头晕
- 失去平衡，跌倒
- 难以入睡或保持睡眠
- 记忆困难
- 不正常的梦
- 胃灼热

- 便秘
- 腹泻
- 口干
- 肿胀、僵硬或疼痛的关节
- 背部、手臂或腿部疼痛
- 尿频或急需排尿
- 排尿困难或排尿时疼痛

### **一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：**

- 幻觉（看到不存在的事物或听到不存在的声音）、混乱、攻击性行为、激动、异常想法
- 视力变化
- 您无法控制的异常身体动作和动作
- 您无法控制的坐姿或站立方式发生变化，例如您的脖子向前弯曲，腰部向前弯曲，或在您坐着、站立或行走时向侧面倾斜，
- 深色、红色或可乐色尿液
- 肌肉压痛
- 肌肉僵硬或疼痛
- 肌肉无力

普拉克索可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

### **我应该知道这种药物的储存和处置吗？**

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。将普通药片存放在避光处。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理,以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是,您不应该将这种药物冲入马桶。相反,处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门,了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划,请了解更多信息。

## n 紧急情况/过量

如果服用过量,请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来,请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

### 过量服用的症状可能包括以下内容:

- 心率快

### 我应该知道其他信息吗?

与您的医生保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药(非处方药)以及任何产品(如维生素、矿物质或其他膳食补充剂)的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时,您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 米拉佩克斯®
- 米拉佩克斯®急诊室

最后修订 - 2022 年 2 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



### [美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有, 2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日