



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Pramipexole

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697029.html>

Pramipexole

prononcé comme (pra mi pex'ole)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le pramipexole est utilisé seul ou avec d'autres médicaments pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson (MP ; un trouble du système nerveux qui entraîne des difficultés de mouvement, de contrôle musculaire et d'équilibre), y compris des tremblements de certaines parties du corps, de la raideur, des mouvements ralentis, et des problèmes d'équilibre. Le pramipexole est également utilisé pour traiter le syndrome des jambes sans repos (SJSR ; une affection qui provoque une gêne dans les jambes et une forte envie de bouger les jambes, en particulier la nuit et en position assise ou couchée). Le pramipexole appartient à une classe de médicaments appelés agonistes de la dopamine. Il agit en agissant à la place de la dopamine, une substance naturelle du cerveau nécessaire au contrôle des mouvements.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le pramipexole se présente sous la forme d'un comprimé et d'un comprimé à libération prolongée (à action prolongée) à prendre par voie orale. Lorsque le pramipexole est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, le comprimé ordinaire est généralement pris trois fois par jour et le comprimé à libération prolongée est généralement pris une fois par jour. Lorsque le pramipexole est utilisé pour traiter le syndrome des jambes sans repos, le comprimé ordinaire est généralement pris une fois par jour, 2 à 3 heures avant le coucher. Les comprimés à libération prolongée de pramipexole ne sont pas utilisés pour traiter le syndrome des jambes sans repos. Le pramipexole peut être pris avec ou sans nourriture, mais la prise de pramipexole avec de la nourriture peut aider à prévenir les nausées pouvant être causées par le médicament. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le pramipexole exactement comme indiqué.

Avalez les comprimés à libération prolongée entiers; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

Votre médecin vous prescrira une faible dose de pramipexole et augmentera progressivement votre dose. Votre médecin n'augmentera probablement pas votre dose plus d'une fois tous les 4 à 7 jours. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que vous atteigniez une dose qui vous convient.

Si vous prenez du pramipexole pour traiter le syndrome des jambes sans repos, vous devez savoir qu'à mesure que votre traitement se poursuit, vos symptômes peuvent s'aggraver, peuvent commencer plus tôt dans la soirée ou l'après-midi ou peuvent survenir tôt le matin. Appelez votre médecin si vos symptômes s'aggravent ou s'ils commencent à se produire à des moments différents de ceux du passé.

Le pramipexole contrôle les symptômes de la maladie de Parkinson et du syndrome des jambes sans repos, mais ne guérit pas ces affections. Continuez à prendre le pramipexole même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le pramipexole sans en parler à votre médecin. Si vous prenez du pramipexole pour traiter la maladie de Parkinson et que vous arrêtez soudainement de prendre le médicament, vous pouvez ressentir de la fièvre, de la confusion, une raideur musculaire, un manque d'intérêt ou d'inquiétude pour les activités habituelles ou les choses qui vous tiennent à cœur, de l'anxiété, de la dépression, de la fatigue, difficulté à s'endormir ou à rester endormi, transpiration ou douleur. Si vous prenez du pramipexole pour traiter le syndrome des jambes sans repos et que vous arrêtez soudainement de prendre le médicament, vos symptômes peuvent s'aggraver par rapport à ce qu'ils étaient avant de commencer à prendre ce médicament. Votre médecin diminuera probablement votre dose progressivement.

Si vous arrêtez de prendre le pramipexole pour une raison quelconque, ne recommencez pas à prendre le médicament sans en parler à votre médecin. Votre médecin voudra probablement augmenter à nouveau votre dose progressivement.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament est parfois prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre le pramipexole,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au pramipexole ou à tout autre médicament, ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de pramipexole ou les comprimés à libération prolongée. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien une liste des ingrédients inactifs.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : antihistaminiques ; cimétidine (Tagamet); médicaments contre les allergies, les maladies mentales et les nausées ; métoclopramide (Reglan); sédatifs; somnifères; et tranquillisants. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie mentale, des difficultés à contrôler les mouvements de vos muscles, un trouble du sommeil autre que le syndrome des jambes sans repos, des étourdissements, des évanouissements, une pression artérielle basse ou une maladie rénale.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du pramipexole, appelez votre médecin.
- vous devez savoir que le pramipexole peut provoquer une somnolence ou un endormissement soudain au cours de vos activités quotidiennes habituelles. Vous pourriez ne pas vous sentir somnolent avant de vous endormir soudainement. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines au début de votre traitement jusqu'à ce que vous sachiez comment le pramipexole vous affectera. Si vous vous endormez soudainement alors que vous faites quelque chose comme regarder la télévision ou conduire une voiture, ou si vous devenez très somnolent, appelez votre médecin. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines tant que vous n'en avez pas parlé à votre médecin.
- vous devez savoir que l'alcool peut augmenter la somnolence causée par ce médicament. Informez votre médecin si vous consommez régulièrement des boissons alcoolisées.
- vous devez savoir que le pramipexole peut provoquer des étourdissements, des étourdissements, des nausées, des évanouissements ou de la transpiration lorsque vous vous levez trop rapidement d'une position assise ou allongée. Ceci est plus fréquent lorsque vous

commencer à prendre du pramipexole ou lorsque votre dose est augmentée. Pour éviter ce problème, sortez lentement de la chaise ou du lit, en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes avant de vous lever.

- vous devez savoir que certaines personnes qui ont pris des médicaments tels que le pramipexole pour traiter la maladie de Parkinson ou le syndrome des jambes sans repos ont développé des problèmes de jeu, un intérêt accru pour le shopping ou le sexe, des problèmes de suralimentation ou d'autres envies ou comportements intenses qui étaient compulsifs ou inhabituels pour eux. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour dire si les personnes ont développé ces problèmes parce qu'elles ont pris le médicament ou pour d'autres raisons. Appelez votre médecin si vous développez des envies intenses ou avez des difficultés à contrôler l'un de ces comportements. Informez les membres de votre famille de ces risques afin qu'ils puissent appeler le médecin même si vous ne réalisez pas que votre comportement est devenu un problème.
- vous devez savoir que si vous prenez des comprimés à libération prolongée, vous remarquerez peut-être quelque chose qui ressemble à un comprimé gonflé ou à des morceaux de comprimé gonflés dans vos selles. Si cela se produit, en particulier avec une aggravation des symptômes de la maladie de Parkinson, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous prenez régulièrement des comprimés de pramipexole pour traiter la maladie de Parkinson, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous prenez régulièrement des comprimés de pramipexole pour traiter le syndrome des jambes sans repos, sautez la dose oubliée. Prenez votre dose habituelle 2 à 3 heures avant votre prochain coucher. Ne doublez pas la dose suivante pour compenser la dose oubliée.

Si vous prenez les comprimés de pramipexole à libération prolongée et que vous oubliez une dose, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, si plus de 12 heures se sont écoulées depuis la dose oubliée, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le pramipexole peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- nausée
- la faiblesse
- vertiges
- perte d'équilibre, chute
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- difficulté à se souvenir
- rêves anormaux
- brûlures d'estomac

- constipation
- diarrhée
- bouche sèche
- articulations enflées, raides ou douloureuses
- douleur dans le dos, les bras ou les jambes
- miction fréquente ou besoin urgent d'uriner
- difficulté à uriner ou douleur en urinant

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin :

- hallucinations (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas), confusion, comportement agressif, agitation, pensées anormales
- changements de vision
- mouvements corporels anormaux et mouvements que vous ne pouvez pas contrôler
- des changements dans la façon dont vous vous asseyez ou vous tenez debout que vous ne pouvez pas contrôler, comme votre cou penché vers l'avant, penché vers l'avant au niveau de la taille ou incliné sur le côté lorsque vous vous asseyez, vous tenez debout ou marchez,
- urine foncée, rouge ou de couleur cola
- sensibilité musculaire
- raideur ou douleur musculaire
- faiblesse musculaire

Le pramipexole peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Conservez les comprimés ordinaires à l'abri de la lumière.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

En cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- rythme cardiaque rapide

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

Noms rands

- Mirapex®
- Mirapex®Urgences

Dernière révision - 15/02/2022

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022