TITLE - MYCOPHENOLIC ACID / MYFORTIC MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601081.html

Micofenolato

pronunciado como (mye koe fen' oh tarde)

AVISO IMPORTANTE:

Risco de defeitos congênitos:

O micofenolato não deve ser tomado por mulheres grávidas ou que possam engravidar. Existe um alto risco de que o micofenolato cause aborto espontâneo (perda da gravidez) durante os primeiros 3 meses de gravidez ou faça com que o bebê nasça com defeitos congênitos (problemas presentes no nascimento).

Você não deve tomar micofenolato se estiver grávida ou se puder engravidar. Você deve ter um teste de gravidez negativo antes de iniciar seu tratamento com micofenolato, novamente 8 a 10 dias depois, e nas consultas de acompanhamento de rotina. Você deve usar controle de natalidade aceitável durante o tratamento e por 6 semanas após parar de tomar micofenolato. Seu médico lhe dirá quais formas de controle de natalidade são aceitáveis para você usar. O micofenolato pode diminuir a eficácia dos contraceptivos orais (pílulas anticoncepcionais), por isso é especialmente importante usar uma segunda forma de contraceptivo junto com esse tipo de contraceptivo.

Se você é um homem com uma parceira que pode engravidar, você deve usar métodos contraceptivos aceitáveis durante o tratamento e por pelo menos 90 dias após a última dose. Não doe esperma durante o tratamento e por pelo menos 90 dias após a última dose.

Ligue para o seu médico imediatamente se achar que você ou seu parceiro está grávida ou se você perder um período menstrual.

Devido à possibilidade de sua doação ser destinada a uma mulher que pode estar ou engravidar, não doe sangue durante o tratamento e por pelo menos 6 semanas após a última dose.

Riscos de infecções graves:

O micofenolato enfraquece o sistema imunológico do corpo e pode diminuir sua capacidade de combater infecções. Lave as mãos com frequência e evite pessoas doentes enquanto estiver tomando este medicamento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: febre, dor de garganta, arrepios ou tosse; hematomas ou sangramentos incomuns; dor ou ardor ao urinar;

micção frequente; ferida ou ferida vermelha, quente ou que não cicatriza; drenagem de uma ferida na pele; fraqueza geral, cansaço extremo ou sensação de mal-estar; sintomas de "gripe" ou "resfriado"; dor ou inchaço no pescoço, virilha ou axilas; manchas brancas na boca ou garganta; herpes labial; bolhas; dor de cabeça ou dor de ouvido; ou outros sinais de infecção.

Você pode estar infectado com certos vírus ou bactérias, mas não tem nenhum sinal de infecção. Tomar micofenolato aumenta o risco de que essas infecções se tornem mais graves e causem sintomas. Informe o seu médico se tiver algum tipo de infecção, como hepatite B ou C, incluindo uma infecção que não causa sintomas.

O micofenolato pode aumentar o risco de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP; uma infecção rara do cérebro que não pode ser tratada, prevenida ou curada e que geralmente causa morte ou incapacidade grave). Informe o seu médico se você tem ou já teve PML, ou outra condição que afeta seu sistema imunológico, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV); síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); sarcoidose (uma condição que causa inchaço nos pulmões e às vezes em outras partes do corpo); leucemia (câncer que faz com que muitas células sanguíneas sejam produzidas e liberadas na corrente sanguínea); ou linfoma. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte imediatamente o seu médico: fraqueza num dos lados do corpo ou nas pernas; dificuldade ou incapacidade de controlar seus músculos; confusão ou dificuldade em pensar com clareza; instabilidade; perda de memória; dificuldade em falar ou entender o que os outros dizem; ou falta de interesse ou preocupação por atividades habituais ou coisas com as quais você normalmente se importa.

O micofenolato pode aumentar o risco de desenvolver certos tipos de câncer, incluindo linfoma (um tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático) e câncer de pele. Informe o seu médico se você ou alguém da sua família tem ou já teve câncer de pele. Evite exposição desnecessária ou prolongada à luz solar real e artificial (camas de bronzeamento artificial, lâmpadas solares) e terapia de luz e use roupas de proteção, óculos de sol e protetor solar (com fator de FPS 30 ou superior). Isso ajudará a diminuir o risco de desenvolver câncer de pele. Ligue para o seu médico se tiver algum dos seguintes sintomas: dor ou inchaço no pescoço, virilha ou axilas; uma nova ferida ou inchaço na pele; uma mudança no tamanho ou cor de uma toupeira; uma lesão de pele marrom ou preta (ferida) com bordas irregulares ou uma parte da lesão que não se parece com a outra; alterações na pele; feridas que não cicatrizam; febre inexplicável; cansaço que não passa; ou perda de peso.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com micofenolato e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA)http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]para obter o Guia de Medicação.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes de laboratório para verificar a resposta do seu corpo ao micofenolato.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar micofenolato.

por que este medicamento é prescrito?

Micofenolato (CellCept) é usado com outros medicamentos para ajudar a prevenir a rejeição de órgãos transplantados (ataque do órgão transplantado pelo sistema imunológico da pessoa que recebe o órgão) em adultos que receberam transplantes de coração e fígado e em adultos e crianças com 3 meses de idade e idosos que receberam transplantes de rim. Micofenolato (Myfortic) é usado com outros medicamentos para ajudar a evitar que o corpo rejeite transplantes de rim. O micofenolato está em uma classe de medicamentos chamados agentes imunossupressores. Funciona enfraquecendo o sistema imunológico do corpo para que não ataque e rejeite o órgão transplantado.

como este medicamento deve ser usado?

O micofenolato vem como uma cápsula, um comprimido, um comprimido de liberação retardada (libera o medicamento no intestino) e uma suspensão (líquido) para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes ao dia com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas depois de comer ou beber, a menos que seu médico lhe diga o contrário). Tome micofenolato aproximadamente nos mesmos horários todos os dias e tente espaçar suas doses em cerca de 12 horas. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome micofenolato exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

O medicamento no comprimido de liberação retardada (Myfortic) é absorvido pelo organismo de forma diferente do medicamento na suspensão, comprimido e cápsula (CellCept). Estes produtos não podem ser substituídos entre si. Cada vez que você tiver sua receita preenchida, certifique-se de ter recebido o produto certo. Se você acha que recebeu a medicação errada, fale com seu médico e farmacêutico imediatamente.

Engula os comprimidos, comprimidos de liberação retardada e cápsulas inteiras; não os parta, mastigue ou esmague. Não abra as cápsulas.

Não misture a suspensão de micofenolato com qualquer outro medicamento.

Tenha cuidado para não derramar a suspensão ou espirrá-la na pele. Se a suspensão entrar em contato com a pele, lave bem a área com água e sabão. Se a suspensão entrar em contato com os olhos, lave com água pura. Use toalhas de papel molhadas para limpar qualquer líquido derramado.

O micofenolato ajuda a prevenir a rejeição de transplantes de órgãos apenas enquanto você estiver tomando a medicação. Continue a tomar micofenolato mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar micofenolato sem falar com o seu médico.

outros usos para este medicamento

O micofenolato também é usado para tratar a doença de Crohn (uma condição na qual o corpo ataca o revestimento do trato digestivo, causando dor, diarréia, perda de peso e febre). Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar micofenolato,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao micofenolato, ácido micofenólico, qualquer outro medicamento ou qualquer um dos ingredientes do produto micofenolato ou ácido micofenólico que está tomando. Se estiver a tomar micofenolato líquido, informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao aspartame ou ao sorbitol. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: carvão ativado; aciclovir (Zovirax); certos antibióticos, como amoxicilina e ácido clavulânico (Augmentin), ciprofloxacina (Cipro) e sulfametoxazol/trimetoprim (Bactrim); azatioprina (Azasan, Imuran); colestiramina (Prevalite); ganciclovir (Cytovene, Valcyte); outros medicamentos que suprimem o sistema imunológico; isavuconazônio (Cresemba); probenecida (Probalan); inibidores da bomba de prótons, como lansoprazol (Dexilant, Prevacid) e pantoprazol (Protonix); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, Rifater); telmisartan (Micardis, em Twynsta); valaciclovir (Valtrex); e valganciclovir (Valcyte). Informe também o seu médico se estiver a tomar uma combinação de norfloxacina (Noroxin) e metronidazol (Flagyl). Muitos outros medicamentos também podem interagir com o micofenolato, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista. Também não se esqueça de informar o seu médico se você parar de tomar qualquer um dos seus medicamentos. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- se estiver tomando sevelamer (Renagel, Renvela), ou antiácidos que contenham magnésio ou alumínio, tome-os 2 horas após tomar micofenolato.
- informe o seu médico se tem ou já teve síndrome de Lesch-Nyhan ou síndrome de Kelley-Seegmiller (doenças hereditárias que causam níveis elevados de uma determinada substância no sangue, dores nas articulações e problemas de movimento e comportamento); anemia (um número menor do que o normal de glóbulos vermelhos); neutropenia (número inferior ao normal de glóbulos brancos); úlceras ou qualquer doença que afete seu estômago, intestinos ou sistema digestivo; qualquer tipo de câncer; ou doença renal ou hepática.
- informe o seu médico se estiver a amamentar.
- você deve saber que o micofenolato pode deixá-lo sonolento, confuso, tonto, atordoado ou causar agitação incontrolável de uma parte do corpo. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.
- não tome nenhuma vacina sem falar com o seu médico. Pergunte ao seu médico se você deve tomar uma vacina contra a gripe antes ou durante o tratamento, pois tomar micofenolato pode aumentar o risco de infecção.
- se você tem fenilcetonúria (PKU, uma condição hereditária na qual uma dieta especial deve ser seguida para evitar danos ao cérebro que podem causar deficiência intelectual grave), você deve saber que a suspensão de micofenolato contém aspartame, uma fonte de fenilalanina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se estiver a tomar comprimido, cápsula ou suspensão de micofenolato (Cellcept), tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se a próxima dose estiver a menos de 2 horas, pule a dose esquecida e

continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Se estiver a tomar o comprimido de libertação retardada de micofenolato (Myfortic), tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Micofenolato pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- constipação
- dor de estômago ou inchaço
- náusea
- vômito
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- dor, especialmente nas costas, músculos ou articulações
- dor de cabeça
- gás
- sensação de formigamento, formigamento ou queimação na pele
- rigidez ou fraqueza muscular

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

- diarreia, dor de estômago súbita e grave
- inchaço das mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas
- dificuldade para respirar
- dor no peito
- irritação na pele
- coceira
- batimento cardíaco rápido
- tontura
- desmaio
- falta de energia
- pele pálida
- sangramento ou hematomas incomuns
- fezes pretas e alcatroadas

- sangue vermelho nas fezes
- vômito sangrento
- vômito que parece borra de café
- sangue na urina
- amarelecimento da pele ou olhos

O micofenolato pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). A suspensão de micofenolato também pode ser armazenada em geladeira. Não congele a suspensão de micofenolato. Descarte qualquer suspensão de micofenolato não utilizada após 60 dias.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- dor de estômago
- náusea

- vômito
- azia
- diarréia
- febre, dor de garganta, calafrios, tosse e outros sinais de infecção

Quais outras informações devo saber?

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- CellCept®
- Myfortic®

Última revisão - 15/01/2022

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022