

Source : NPS Australia

حقن Fraxiparine®

ندروبارين الكالسيوم
9500 وحدة دولية من محلول مضاد

١ mL / Xa للحقن

معلومات طب المستهلك

ما هو في هذه النشرة

تجيب هذه النشرة على بعض الأسئلة الشائعة حول حقن Fraxiparine. أنه لا يحتوي على جميع المعلومات المتاحة. لا يحل محل التحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

جميع الأدوية لها فوائد ومخاطر. قام طبيبك بموازنة مخاطر تناولك Fraxiparine مقابل الفوائد التي يتوقعونها لك.

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن تناول هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

احتفظ بهذه النشرة مع الحقن. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

ما هو استخدام Fraxiparine

ينتمي Fraxiparine إلى مجموعة من الأدوية تسمى الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي. يستخدم Fraxiparine لمنع تخثر الدم بعد الجراحة، أثناء غسيل الكلى، أثناء الاستشفاء لمرضى حاد أو في وحدة العناية المركزة مع الراحة في الفراش الممتد، كما يستخدم لعلاج الجلطات الدموية الموجودة التي تسد الأوعية الدموية.

إنه دواء يعمل عن طريق تأخير الإجراء الذي تتشكل به جلطات الدم. يؤدي هذا إلى بقاء الدم رقيقاً ويمنع تكون الجلطات التي قد تستقر في الأوعية الدموية ويعالج الجلطات الدموية إذا كانت قد تشكلت بالفعل.

هذا الدواء متوفر فقط بوصفة طبيب.

لا توجد معلومات كافية للتوصية بكيفية تأثير استخدام هذا الدواء على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

لا توجد معلومات كافية للتوصية باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. لذلك، لا ينصح باستخدام Fraxiparine في الأطفال أو المراهقين.

قبل استخدام Fraxiparine

عندما لا يجب عليك استخدامه

لا تستخدم Fraxiparine إذا كان لديك حساسية من:

- أي دواء يحتوي على الكالسيوم نادروبارين
 - الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي
 - أي من المكونات المذكورة في نهاية هذه النشرة.
- قد تشمل بعض أعراض الحساسية ما يلي:

- ضيق في التنفس
- أزيز أو صعوبة في التنفس
- انتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم
- طفح جلدي أو حكة أو خلايا على الجلد لا تستخدم Fraxiparine إذا كنت:
- كان لديهم قلة الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية) بسبب استخدام Fraxiparine من قبل
- لديك خطر متزايد من النزيف أو اضطراب النزيف
- لديك تاريخ من القرحة في المعدة أو الأمعاء

قد تتداخل بعض الأدوية و Fraxiparine مع بعضها البعض. وتشمل هذه:

- الأسبرين أو الأدوية الأخرى المستخدمة لتقليل الألم والالتهابات (العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو الساليسيلات)
- تيكلويدين أو الأدوية الأخرى المستخدمة لتسييل الدم ومنع تخثره (مضادات التخثر الفموية والعوامل المضادة للصفائح)

- الكورتيكوستيرويدات (الأدوية المستخدمة لتقليل الالتهاب).
- ديكسترانيس (الأدوية المستخدمة لتسييل الدم)
- مبينات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب الأخرى)

قد تتأثر هذه الأدوية بـ Fraxiparine أو قد تؤثر على مدى نجاحها. قد تحتاج إلى كميات مختلفة من الأدوية الخاصة بك، أو قد تحتاج إلى تناول أدوية مختلفة.

لدى طبيبك والصيدلي مزيد من المعلومات حول الأدوية التي يجب توخي الحذر معها أو تجنبها أثناء تناول هذا الدواء.

كيف يتم إعطاء Fraxiparine

ستعتمد جرعة Fraxiparine التي ستحتاجها على سبب علاجك بـ Fraxiparine وأيضاً على وزن جسمك.

إذا كنت تقوم بحقن هذا الدواء بنفسك، فسيتم إرشادك من قبل طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي حول كيفية التحضير وإعطاء الحقن تحت الجلد (تحت الجلد). استخدمه تماماً كما هو موصوف ولا تتجاوز الجرعة الموصوفة.

كم يستغرق وك من الوقت تأخذ

Fraxiparine

منع تجلط الدم:

للقاية العامة من الجلطات الدموية، سيتم إعطاء Fraxiparine عن طريق الحقن تحت الجلد (تحت الجلد)، كجرعة يومية واحدة من 0.3 مل (2850 وحدة دولية من مضادات Xa) لمدة 7 أيام على الأقل أو حسب توجيهات الطبيب. بالنسبة لمعظم مرضى الجراحة، يجب إعطاء الجرعة الأولى من 2 إلى 4 ساعات قبل الجراحة.

إذا كنت ستخضع لجراحة العظام، فسيتم إعطاء الجرعات الأولى قبل 12 ساعة من الجراحة و 12 ساعة بعد نهاية الجراحة. سيحسب طبيبك هذه الجرعة والجرعات المعطاة بعد ذلك وفقاً لوزن جسمك.

يجب أن يكون العلاج لمدة 10 أيام على الأقل أو حسب توجيهات الطبيب.

إذا كنت تعاني من ضعف متوسط أو شديد في الكلى، فقد تحتاج إلى جرعة مخفضة.

اتبع تعليمات طبيبك حول المقدار الذي يجب أن يؤخذ Fraxiparine.

علاج جلطات الدم الموجودة: لعلاج جلطات الدم الموجودة، سيتم إعطاء Fraxiparine عن طريق الحقن تحت الجلد (تحت الجلد) مرتين يومياً لمدة 10 أيام. سيتم احتساب الجرعة من قبل طبيبك وفقاً لوزن جسمك.

إذا كنت تعاني من ضعف متوسط أو شديد في الكلى، فقد تحتاج إلى جرعة مخفضة.

اتبع تعليمات طبيبك حول المقدار الذي يجب أن يؤخذ Fraxiparine.

الوقاية من التخثر أثناء غسيل الكلى:

لمنع تجلط الدم أثناء

- لديك انفجار في الأوعية الدموية في دماغك
- لديك التهاب شغاف القلب (التهاب بطانة القلب).
- لديك فشل كلوي حاد ويتم علاجها من جلطة دموية

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الكرتون أو إذا كانت العبوة ممزقة أو ظهرت عليها علامات العبث.

إذا انتهت صلاحيته أو تالف، قم بإعادته إلى الصيدلي للتخلص منه.

إذالم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب عليك البدء في استخدام هذا الدواء، فتحدث إلى طبيبك.

قبل أن تبدأ في تناوله

أخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية من أي أدوية أو أطعمة أو مواد حافظة أو أصباغ أخرى.

لا تأخذ هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل إلا إذا ناقشت أنت وطبيبك المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها الأمر.

من غير المعروف ما إذا كان Fraxiparine يمكن أن يؤذي طفلك إذا تم استخدامه أثناء الحمل.

لا ترضعي إذا كنت تتناول هذا الدواء.

يمكن أن ينتقل العنصر النشط في Fraxiparine إلى حليب الثدي. التأثير على الطفل غير معروف. لذلك لا ينبغي أن تستخدم Fraxiparine أثناء الرضاعة الطبيعية.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الحالات أو الإجراءات الطبية التالية أو كنت قد عانيت منها:

- زيادة خطر النزيف بما في ذلك: مشاكل الكبد أو فشل الكبد -ارتفاع شديد في ضغط الدم -تاريخ الإصابة بقرحة المعدة -اضطرابات النزيف -اضطراب الأوعية الدموية في العين -الجراحة الحديثة للدماغ أو التخاع الشوكي أو العين
- مرض كلوي
- مشاكل في قلبك بما في ذلك الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية
- ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم
- داء السكري
- الحماض الأيضي (الكثير من الحمض في الدم)

قلة الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية)

حقنة حديثة أو مخططة في العمود الفقري أو فوق الجافية (حقنة حول الحبل الشوكي)

حساسية من مادة اللاتكس، لأن درع الإبرة للمحقنة قد يحتوي على مادة اللاتكس

أنسجة الجلد الميتة (نخر جلدي) حول مواقع الحقن

أخبر طبيبك إذا كنت مسناً أو أقل من 18 عاماً.

إذالم تخبر طبيبك بأي مما سبق، أخبره / ها قبل البدء في تناول Fraxiparine.

تناول أدوية أخرى

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها بدون وصفة طبية من الصيدلية أو السوبرماركت أو متجر الأطعمة الصحية.

غسيل الكلى ، عادة ما يتم إعطاء Fraxiparine كجرعة وحيدة في الخط الشرياني لجهاز غسيل الكلى في بداية كل جلسة. سيتم احتساب هذه الجرعة من قبل طبيبك وفقاً لوزن جسمك. يمكن إعطاء جرعة أصغر إضافية أثناء غسيل الكلى للجلسات التي تدوم أكثر من 4 ساعات.

الوقاية من التجلط أثناء الاستشفاء مع الراحة في الفراش لفترات طويلة: للوقاية من التجلط أثناء الاستشفاء مع الراحة في الفراش (لمدة 3 أيام على الأقل) ، سيتم إعطاء Fraxiparine عن طريق الحقن تحت الجلد (تحت الجلد) ، كجرعة يومية واحدة. سيتم احتساب الجرعة من قبل طبيبك وفقاً لوزن جسمك.

اتبع تعليمات طبيبك حول مقدار ومدة تناول Fraxiparine.

كيفية الإدارة الذاتية Fraxiparine

في بعض الحالات ، قد يُسمح لك بمعاملة نفسك بـ Fraxiparine. يجب عليك اتباع الإرشادات أدناه للتأكد من حقن Fraxiparine بشكل صحيح. يجب أن تتحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف بشأن كيفية إعطاء الحقنة. ومع ذلك ، سيتم إعطاء الحقنة لمعظم الناس من قبل ممرضة أو طبيب.

إزالة العبوة قبل الحقن: لتقسيم المحاقن ، قم بطي العبوة المزدوجة بعناية عدة مرات ، بحيث تعود المحاقن إلى الخلف ، ثم ببطة باستخدام ضغط متساوٍ ، اقمس المحقتين بدءاً من نهاية المكبس بالعبوة.

إزالة المحقنة من عبوتها البلاستيكية ، قم بتمزيق فيلم الدعم العلوي تماماً من الصينية البلاستيكية (بدءاً من طرف المكبس) ، ثم اترك المحقنة تتدرج على راحة يدك الأخرى.

قديبدو الغطاء المطاطي الموجود فوق الإبرة وكأنه بعيد عن مركز المحقنة ، ومع ذلك ، يحدث هذا أثناء التعبئة ولا يعني أن الإبرة مثنية.

تحضير محقنة للحقن تحت الجلد:

إزالة الغطاء عن إبرة المحقنة:

- امسك المحقنة بشكل عمودي (الغطاء الرمادي في الأعلى)
- أمسك الغطاء الرمادي من طوقه ، وبرميل المحقنة في يدك الأخرى ، ثم قم بتدوير برميل المحقنة ببطة واسحبها لأسفل في نفس الوقت ، حتى يتم سحب الإبرة بالكامل من الغطاء

- لا تسحب الغطاء لأعلى من المحقنة - فقد يؤدي ذلك إلى ثني الإبرة

المحاقن المعبأة مسبقاً Fraxiparine 0.2 مل و 0.3 مل و 0.4 مل مخصصة لإعطاء جرعات كاملة فقط. يجب حقن محتويات المحقنة بالكامل. قد تكون هناك فقاعة هواء صغيرة في المحقنة ولكن لا يلزم إزالتها.

يمكن استخدام محاقن Fraxiparine 0.6 مل و 0.8 مل و 1.0 مل متدرجة مسبقاً لإدارة الجرعات المعدلة. امسك المحقنة عمودياً مع وضع الإبرة في المقدمة وتأكد من وجود فقاعة الهواء في الجزء العلوي من المحقنة. ادفع المكبس إلى الحجم / الجرعة المطلوبة ، وطرده الهواء وأي فائض.

يجب التخلص من أي جزء غير مستخدم من Fraxiparine مرة واحدة.

طريقة إعطاء تحت الجلد:

• الموقع المناسب للحقن هو الجلد الموجود في الجزء السفلي من المعدة ، بعيداً عن أي جرح أو مفاصل. بدلاً من ذلك يمكن إجراء الحقن في الخد.

• اقرص طية الجلد. ملحوظة: قد يؤدي استخدام الكحول إلى تقوية الجلد ، مما يجعل الحقن اللاحق صعباً.

• حافظ على الطية وأدخل الإبرة عمودياً إلى عمقها الكامل ثم احقن Fraxiparine لمدة 10 إلى 15 ثانية. قد تكون هناك فقاعة هواء صغيرة في برميل المحقنة ولكن لا يلزم إزالتها.

• لا تزال ممسكاً بطية الجلد ، اسحب الإبرة عمودياً. لا تفرك مكان الحقن.

• بعد إعطاء الحقن ، قم بتثبيت نظام الأمان على حقنة Fraxiparine وتخلص منه بعناية.

غير مخصص للحقن مباشرة في العضلات Fraxiparine

إذا كنت تأخذ الكثير (جرعة زائدة)

اتصل على الفور بطبيبك أو بطبيبك مركز معلومات السموم (هاتف 13 11 26) للحصول على المشورة ، أو الذهاب إلى قسم الحوادث و الطوارئ في أقرب مستشفى ، إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر قد تناولت الكثير من Fraxiparine.

افعل ذلك حتى لو لم تكن هناك علامات عدم الراحة أو التسمم. أنت تحتاج لعناية مستعجلة.

الزيف الزائد أو المفرط هو العلامة الرئيسية لجرعة زائدة. يمكن معالجة الجرعة الزائدة عن طريق تقليل أو تأخير الجرعات التالية من Fraxiparine أو في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن لعقار يسمى كبريتات البروتامين أن يعكس جزئياً تأثير Fraxiparine.

أثناء استخدامك Fraxiparine أشياء

يجب أن تفعلها

إذا كنت على وشك البدء في أي دواء جديد ، ذكر طبيبك والصيدي أنك تتناول

فراكتسيبارين.

أخبر أي أطباء وأطباء أسنان وصيادلة يعالجونك أنك تتناول هذا الدواء.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية ، أخبر الجراح أو طبيب التخدير أنك تتناول هذا الدواء.

قد يؤثر على الأدوية الأخرى المستخدمة أثناء الجراحة.

إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول هذا الدواء ، أخبر طبيبك على الفور.

إذا كنت على وشك إجراء أي فحوصات دم ، أخبر طبيبك أنك تتناول هذا الدواء.

قد يتداخل مع نتائج بعض الاختبارات.

احتفظ بجميع مواعيد طبيبك حتى يمكن التحقق من تقدمك.

أشياء لا يجب عليك فعلها

لا تأخذ Fraxiparine لعلاج أي شكوى أخرى مالم يخبرك طبيبك بذلك.

لا تعطي دوائك لأي شخص آخر ، حتى لو كان لديه نفس حالتك.

لا تتوقف عن تناول دوائك أو تخفض الجرعة دون استشارة طبيبك.

أشياء يجب توخي الحذر منها

كن حذراً في القيادة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر Fraxiparine عليك.

آثار جانبية

أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا كنت لا تشعر بصحة جيدة أثناء العلاج بـ Fraxiparine.

مثل الأدوية الأخرى ، يمكن أن يسبب Fraxiparine بعض الآثار الجانبية. في بعض الأحيان يكونون جادين ، وفي معظم الأحيان ليسوا كذلك. قد تحتاج إلى رعاية طبية إذا أصبت ببعض الآثار الجانبية.

لا تنزعج من قوائم الأعراض الجانبية التالية. قد لا تواجه أي منها.

اطلب من طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي الإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي مما يلي وهم يعلقونك:

الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً:

- جلطة دموية صغيرة تحت الجلد عند موقع الحقن
- نزيف غير طبيعي
- تفاعلات موقع الحقن. آثار جانبية أقل شيوعاً:

- طفح جلدي ، خلايا ، احمرار أو حكة حول موقع الحقن
- رواسب الكالسيوم في موقع الحقن
- أنسجة الجلد الميتة (نخر جلدي) في موقع الحقن

قد يراقبك طبيبك باختبارات الدم من أجل:

- مستويات عالية من البروتينات
- مستويات عالية من البوتاسيوم
- انخفاض عدد الصفائح الدموية أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء
- مستويات عالية من بعض إنزيمات الكبد

في حالة حدوث أي مما يلي ، أخبر طبيبك على الفور أو انتقل إلى قسم الطوارئ

في أقرب مستشفى:

- ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي وتورم الوجه بما في ذلك الفم والشفتين و / أو اللسان والحلق والصغير وضيق التنفس

• الانتصاب المؤلم المستمر للقضيب (القساح).

وتشمل القائمة أعلاه آثار جانبية خطيرة جداً. قد تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة أو المستشفى. هذه الآثار الجانبية نادرة جداً.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي شيء يعطلك تشعر بتوعك.

يعد استخدام Fraxiparine

تخزين

يجب تخزين Fraxiparine في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. يفعل لا تجمد. لا تقم بالتبريد ، لأن الحقن الباردة قد تكون مؤلمة.

احتفظ بها حيث لا يستطيع الأطفال الوصول إليها. تعتبر الخزنة المقفلة التي لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف عن سطح الأرض مكاناً جيداً لتخزين الأدوية.

إزالة

استخدم Fraxiparine مرة واحدة فقط وتخلص من أي جزء غير مستخدم من كل حقنة.

إذا أخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول هذا الدواء أو انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية ،

اسأل الصيدلي عما يجب أن تفعله بأي دواء متبقي.

وصف المنتج

ما يبدو عليه

هو محلول معقم للحقن تحت الجلد.

Fraxiparine

يتم تقديم Fraxiparine على شكل محاقن بجرعة 0.2 مل و 0.3 مل و 0.4 مل و 0.6 مل و 0.8 مل و 1.0 مل محاقن متدرجة. محاقن 0.2 مل و 0.3 مل و 0.4 مل و 0.6 مل تأتي في عبوات من 2 و 10 محاقن. تأتي الحقن 0.8 مل و 1.0 مل في عبوات من 10 محاقن.

مكونات

يحتوي Fraxiparine على nadroparin

كالكسيوم anti-Xa 9,500 IU لكل 1.0 مل

كمكون نشط.

- ماء للحقن
- هيدروكسيد الكالسيوم أو حمض الهيدروكلوريك المخفف

لا يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز أو السكر أو الغلوتين أو التارترازين أو أي أصباغ آزو أخرى.

الموردين

يتم توفير Fraxiparine في أستراليا عن طريق:

Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

Aspen Pharmacare

سانتيليوناردز ، 2065 ، نيو ساوث ويلز

هي علامة تجارية مسجلة لشركة Fraxiparine®

Aspen Global Inc.

0.2 مل حقنة 0.3 AUST R 51308

مل حقنة 0.4 AUST R 51309

حقنة 0.6 AUST R 51310 مل

حقنة 0.8 AUST R 51311 مل

حقنة 1.0 AUST R 51312 مل

حقنة AUST R 51313

تم إعداد هذه النشرة في سبتمبر 2017. الإصدار 5.0