Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685041.html

纳曲酮

发音为 (nal trex' one)

重要警告：

大剂量服用纳曲酮可能会导致肝损伤。服用推荐剂量的纳曲酮不太可能引起肝损伤。如果您患有或曾经患有肝炎或肝病，请告诉您的医生。如果您出现以下任何症状，请停止服用纳曲酮并立即就医：过度疲劳、异常出血或瘀伤、食欲不振、胃右上部疼痛持续数天以上、排便颜色浅，尿色深，或皮肤或眼睛发黄。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对纳曲酮的反应。

与您的医生讨论服用纳曲酮的风险。

为什么要开这种药？

纳曲酮与咨询和社会支持一起使用，以帮助停止饮酒和使用街头毒品的人继续避免饮酒或吸毒。纳曲酮不应用于治疗仍在使用街头毒品或大量饮酒的人。纳曲酮属于一类称为阿片拮抗剂的药物。它的作用是减少对酒精的渴望并阻止阿片类药物和阿片类街头药物的作用。

这个药应该怎么用？

纳曲酮以片剂形式出现，可在家中或在诊所或治疗中心的监督下口服。在家中服用纳曲酮时，通常每天服用一次，有或没有食物。在诊所或治疗中心服用纳曲酮时，可以每天服用一次、隔天服用一次、每三天服用一次或除周日外每天服用一次。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用纳曲酮。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

纳曲酮仅在用作成瘾治疗计划的一部分时才有用。参加所有咨询会议、支持小组会议、教育计划或医生推荐的其他治疗，这一点很重要。

纳曲酮将帮助您避免使用药物和酒精，但它不会预防或缓解您停止使用这些物质时可能出现的戒断症状。相反，纳曲酮可能会导致或加重戒断症状。如果您最近停止使用阿片类药物或阿片类街头药物并且现在出现戒断症状，则不应服用纳曲酮。

只要您服用纳曲酮，它就会帮助您避免吸毒和酗酒。即使您感觉良好，也要继续服用纳曲酮。不要在未咨询医生的情况下停止服用纳曲酮。

该药的其他用途

这种药物有时可能会用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用纳曲酮之前，

- 如果您对纳曲酮纳洛酮、其他阿片类药物或任何其他药物过敏，请告诉您的医生和药剂师。
- 告诉您的医生您是否正在服用任何阿片类药物（麻醉剂）或街头药物，包括醋酸左美沙酮（LAAM、ORLAAM）（在美国不可用）或美沙酮（Dolophine、Methadose）；以及某些治疗腹泻、咳嗽或疼痛的药物。如果您在过去 7 到 10 天内服用过任何这些药物，也请告诉您的医生。如果您不确定您服用的药物是否为阿片类药物，请咨询您的医生。您的医生可能会下令进行某些检查，以了解您在过去 7 至 10 天内是否服用过任何阿片类药物或使用过任何阿片类街头药物。如果您在过去 7 至 10 天内服用或使用过阿片类药物，您的医生会告诉您不要服用纳曲酮。
- 在纳曲酮治疗期间不要服用任何阿片类药物或使用阿片类街头药物。纳曲酮阻断阿片类药物和阿片类街头药物的作用。如果您以低剂量或正常剂量服用或使用这些物质，您可能不会感受到这些物质的影响。如果您在使用纳曲酮治疗期间服用或使用更高剂量的阿片类药物或药物，可能会导致严重伤害、昏迷（长期昏迷状态）或死亡。
- 您应该知道，如果您在接受纳曲酮治疗之前服用了阿片类药物，那么您在完成治疗后可能对这些药物的效果更加敏感。完成治疗后，请告诉任何可能为您开药的医生您之前接受过纳曲酮治疗。
- 告诉您的医生您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。一定要提到双硫仑（Antabuse）和硫利达嗪。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有或曾经患有抑郁症或肾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用纳曲酮时怀孕，请致电您的医生。

- 如果您需要医疗或手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用纳曲酮。佩戴或携带医疗证明，以便在紧急情况下为您治疗的医疗保健提供者知道您正在服用纳曲酮。

- 您应该知道，过度吸毒或酗酒的人经常会变得抑郁，有时会试图伤害或自杀。接受纳曲酮不会降低您试图伤害自己的风险。如果您出现抑郁症状，例如悲伤、焦虑、绝望、内疚、无价值或无助感，或考虑伤害或自杀或计划或试图这样做，您或您的家人应立即就医。确保您的家人知道哪些症状可能很严重，这样如果您无法自行寻求治疗，他们可以立即致电医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果您的下一次服药时间快到了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

纳曲酮可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 胃痛或痉挛
- 腹泻
- 便秘
- 食欲不振
- 头痛
- 头晕
- 焦虑
- 紧张
- 易怒
- 泪流满面
- 难以入睡或保持睡眠
- 增加或减少能量
- 睡意
- 肌肉或关节疼痛

- 皮疹

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或重要警告部分中列出的症状，请立即致电您的医生：

- 困惑
- 幻觉（看到不存在的事物或听到不存在的声音）
- 模糊的视野
- 严重呕吐和/或腹泻

纳曲酮可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and reach. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

在进行任何实验室检查之前，请告诉您的医生和实验室人员您正在服用纳曲酮。

如果您对纳曲酮有任何疑问，请咨询您的医生或药剂师。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 雷维亚®

最后修订 - 2017 年 10 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日