

TITLE - NAPROXEN + ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM/ VIMOVO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

VIMOVO_{çb}500 mg/20 mg modifiye salımlı tabletler naproksen ve esomeprazol

Bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

bu broşürde:

1. VIMOVO nedir ve ne için kullanılır?
2. VIMOVO'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. VIMOVO nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. VIMOVO nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. VIMOVO nedir ve ne için kullanılır?

VIMOVO nedir?

VIMOVO, naproksen ve esomeprazol adı verilen iki farklı ilaç içerir. Bu ilaçların her biri farklı bir şekilde çalışır.

- Naproksen, "Steroid Olmayan Anti-İnflamatuvar İlaçlar" (NSAID'ler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Ağrı ve iltihabı azaltır.
- Esomeprazol, "proton pompası inhibitörleri" adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Midenizdeki asit miktarını azaltır.

Esomeprazol, NSAİİ alması gereken hastalarda gelişen ülser ve mide sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur.

VIMOVO ne için kullanılır?

VIMOVO, yetişkinlerde aşağıdaki semptomların giderilmesi için kullanılır:

- Kireçlenme.
- Romatizmal eklem iltihabı.
- Ankilozan spondilit.

VIMOVO ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısıyı (iltihabı) azaltmaya yardımcı olur.

Daha düşük bir NSAID dozunun ağrınızı hafifletmesinin olası olmadığı düşünülüyorsa ve NSAID kullanırken mide ülseri veya ince bağırsağınızın (bağırsak) ilk kısmında (duodenum) ülser olma riskiniz varsa bu ilaç verilecektir.

2. VIMOVO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIMOVO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Naproksen'e karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var.
- Esomeprazol veya diğer proton pompası inhibitörü ilaçlara alerjiniz var.
- Bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var (Bölüm 6'da listelenmiştir).
- "atazanavir" veya "nelfinavir" (HIV tedavisinde kullanılan) adlı bir ilaç alıyorsunuz.
- Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), naproksen veya ibuprofen, diklofenak veya COX-2 inhibitörleri (örneğin selekoksib, etoricoxib) gibi diğer NSAID'ler astıma (hırıltı) veya kaşıntı veya deri döküntüsü (ürtiker) gibi alerjik bir reaksiyona neden olduysa .
- Hamileliğinizin son 3 ayındasınız.

- **Varşiddetli** karaciğeriniz, böbreklerinüz veya kalbinüzle ilgili sorunlar. Midenüzde veya bağırsağınızda ülser var.
- Herhangi bir kanama bozukluğunuz veya ciddi ve beklenmedik bir kanamanız varsa.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse VIMOVO'yu kullanmayınız. Emin değilsenüz, VIMOVO'yu almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve Önlemler

VIMOVO'yu almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VIMOVO'yu almadan önce veya alırken aşağıdakilerden biri olursa, VIMOVO'yu almamalı ve hemen doktorunuzla konuşmamalısınız, çünkü bu ilaç diğer hastalıkların semptomlarını gizleyebilir:

- Sebepsiz yere çok kilo kaybedersiniz ve yutma sorunları yaşarsınız.
- Yiyecek veya kan kusmaya başlarsınız.
- **Siyah dışkı (kanlı dışkı) çıkarıyorsunuz.**

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilsenüz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Aşağıdaki durumlarda bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

- **Bağırsaklarınızda iltihaplanma var (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit).**
- Karaciğeriniz veya böbreklerinüzle ilgili başka sorunlarınız varsa veya yaşlıysanız.
- Ağız yoluyla alınan kortikosteroidler, varfarin, klopidogrel, Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI'lar), asetilsalisilik asit (aspirin) veya COX-2 inhibitörleri dahil NSAID'ler (Diğer ilaçlar ve VIMOVO bölümüne bakınız) alıyorsunuz.
- Mide asidini azaltan esomeprazol (VIMOVO'nun bir bileşenidir) benzeri bir ilaçla tedaviden sonra hiç cilt reaksiyonu yaşamadınız.
- Spesifik bir kan testi yaptırmanız gerekiyor (Chromogranin A).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilsenüz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Daha önce mide ülseri veya kanaması yaşadığınız, doktorunuza bildirmelisinüz. Midenüzden kaynaklanan olağan dışı herhangi bir semptomu (örneğin ağrı) doktorunuza bildirmenüz istenecektir.

VIMOVO gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya felç riskinde küçük bir artışla ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile herhangi bir risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayın.

VIMOVO, NSAID naproksen içerir. Tüm NSAID'lerde olduğu gibi, istenmeyen etki riskini azaltmak için naproksen mümkün olan en kısa süre boyunca en düşük etkili dozda kullanılmalıdır. Bu nedenle doktorunuz düzenli aralıklarla VIMOVO'nun sizin için hala uygun olup olmadığını değerlendirecektir.

Ağrı kesici naproksenin kanınıza geçmesi birkaç saat aldığından, VIMOVO akut ağrının hızlı bir şekilde giderilmesi için uygun değildir.

Ayrıca, herhangi bir kalp probleminüz varsa, daha önce inme geçirdiyseünüz veya bu problemler için risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışın. Aşağıdaki durumlarda bu sorunları yaşama riskiniz olabilir:

- **Yüksek tansiyonunuz var.**
- **Kan dolaşımınız veya kanınızın pıhtılaşması ile ilgili sorunlarınız var.**
- Şeker hastalığınız var.
- Yüksek kolesterolünüz var.
- Sen bir sigara tiryakisisin.

Bir proton pompası inhibitörü (VIMOVO'nun bir bileşenidir), özellikle bir yıldan uzun bir süre boyunca almak, kalça, bilek veya omurgada kırılma riskinizi hafifçe artırabilir. Osteoporozunuz varsa veya kortikosteroid kullanıyorsanız (ki bu osteoporoz riskini artırabilir) doktorunuza söyleyiniz.

Cildinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde kızarıklık olursa, VIMOVO tedavinizi kesmeniz gerekebileceğinden, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizdeki ağrı gibi diğer yan etkilerden de bahsetmeyi unutmayın.

Çocuklar ve ergenler

VIMOVO'nun 18 yaş ve altındaki çocuklarda veya adolesanlarda kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve VIMOVO

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. Bunun nedeni, VIMOVO'nun diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı diğer ilaçlar da VIMOVO'nun çalışma şeklini etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, bu ilacı almayınız ve doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

- "atazanavir" veya "nelfinavir" adı verilen bir ilaç (HIV tedavisinde kullanılır).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- Asetilsalisilik asit (aspirin) (ağrı kesici olarak veya kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır). Düşük doz asetilsalisilik asit (aspirin) alıyorsanız, yine de VIMOVO alabilirsiniz.
- Diğer NSAID ilaçları (COX-2 inhibitörleri dahil).
- Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol (bir mantarın neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır) gibi belirli ilaçlar.
- Erlotinib (veya aynı sınıftan başka bir antikanser ilacı).
- Kolestiramin (kolesterolü düşürmek için kullanılır).
- Klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır).
- Siprofloksasin veya moksifloksasin gibi "kinolon antibiyotik" (enfeksiyonlar için).
- Diazepam (anksiyete tedavisinde, kaslarınızı gevşetmek için veya epilepside kullanılır).
- Fenitoin gibi hidantoinler (sara tedavisinde kullanılır).
- Lityum (bazı depresyon türlerini tedavi etmek için kullanılır).
- Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır).
- Probenesid (gut için).
- "Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri" (SSRI'lar) (majör depresyon veya anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır).
- Siklosporin veya takrolimus (vücudun bağışıklık tepkilerini azaltmak için kullanılan ilaçlar). Digoksin (kalp bozukluklarının tedavisinde kullanılır).
- Glimepirid (şeker hastalığında kan şekerinizi kontrol etmek için kullanılan oral ilaçlar) gibi sülfonilüreler.
- Diüretikler (furosemid veya hidroklorotiyazid gibi), ACE inhibitörleri (enalapril gibi), anjiyotensin II reseptör antagonistleri (losartan gibi) ve beta blokerleri (örneğin propranolol) adı verilen yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
- Hidrokortizon veya prednizolon gibi kortikosteroid ilaçlar (anti-inflamatuar ilaçlar olarak kullanılır).
- Varfarin, dikumarol, heparin veya klopidogrel gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.
- Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır).
- Sarı Kantaron (*Hypericum perforatum*) (hafif depresyon tedavisinde kullanılır).
- Silostazol (zayıf kan akışı nedeniyle bacaklarda ağrı için kullanılır).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), VIMOVO'yu almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VIMOVO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

VIMOVO'nun etkisini azaltabileceği ve/veya geciktirebileceği için VIMOVO'yu yiyeceklerle birlikte almayınız. Tabletlerinizi yemekten en az 30 dakika önce alınız.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

- Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız VIMOVO almayınız.

- Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşun. VIMOVO'yu alıp alamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
- VIMOVO alıyorsanız emzirmeyiniz. Bunun nedeni, küçük miktarların anne sütüne geçebilmesidir. Emzirmeyi planlıyorsanız VIMOVO almamalısınız.

Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VIMOVO hamile kalmayı zorlaştırabilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Araç ve makine kullanma

VIMOVO kullanırken baş dönmesi hissedebilir veya bulanık görme yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

VIMOVO, metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parahidroksibenzoat (E216) içerir.Bu bileşenler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar hemen gerçekleşmeyebilir.

VIMOVO, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında 'sodyum içermez'.

3. VIMOVO nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacı almak

- Tabletlerinizi bütün olarak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyin, parçalamayın veya ezmeyin. İlacınızın düzgün çalışabilmesi için tabletlerinizi bütün olarak almanız önemlidir.
- Tabletlerinizi yemekten en az 30 dakika önce alınız. Yiyecekler, VIMOVO'nun mideniz ve bağırsağınız üzerindeki koruyucu etkisini azaltabilir. Yiyecekler ayrıca ağrı ve iltihabın giderilmesinde önemli bir gecikmeye neden olabilir.
- Bu ilacı uzun süredir alıyorsanız, doktorunuz sizi izlemek isteyecektir (özellikle bir yıldan uzun süredir alıyorsanız).

ne kadar alınır

- Doktorunuzun size söylediği süre boyunca günde iki kez bir tablet alınız.
- VIMOVO sadece 500 mg/20 mg'da mevcuttur. Doktorunuz bu dozun sizin için uygun olmadığını düşünürse başka bir tedavi önerebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VIMOVO kullandıysanız

VIMOVO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Doz aşımı belirtileri arasında uyuşukluk, baş dönmesi, uyuşukluk, üst karın ağrısı ve/veya rahatsızlık, mide ekşimesi, hazımsızlık, mide bulantısı, karaciğer sorunları (kan testinde gösterilir), şiddetli olabilen böbrek sorunları, vücudunuzdaki normal asit düzeylerinden daha yüksek olabilir. kan, kafa karışıklığı, kusma, mide veya bağırsaklarda kanama, yüksek tansiyon, nefes almada güçlük, koma, ani alerjik reaksiyonlar (nefes darlığı, deri döküntüleri, yüz ve/veya boğazda şişme ve/veya çökmeyi içerebilir) ve kontrolsüz vücudun hareketleri.

VIMOVO'yu kullanmayı unutursanız

- Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın.
- Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz (aynı anda iki doz) almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir. Bu ilaçla aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz VIMOVO kullanmayı bırakın ve hemen bir doktora görünün – acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:

- Ani hırıltı, dudaklarınızda, dilinizde ve boğazınızda veya vücudunuzda şişme, döküntü, bayılma veya yutma güçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon).
- Kabarcıklar veya soyulma ile cildinizin kızarması. Ayrıca dudaklarda, gözlerde, ağızda, burunda ve cinsel organlarda şiddetli kabarcıklar ve kanamalar olabilir.
- Cildin veya göz aklarının sararması, koyu renkli idrar ve karaciğer sorunlarının belirtileri olabilen yorgunluk.
- VIMOVO gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya felç riskinde küçük bir artışla ilişkilendirilebilir. Belirtiler arasında boynunuza ve omuzlarınıza ve sol kolunuza yayılan göğüs ağrısı, kafa karışıklığı veya kas zayıflığı veya vücudunuzun sadece bir tarafında olabilen uyuşma yer alır.
- Siyah yapışkan bağırsak hareketleriniz (dışkı) veya kanlı ishaliniz var. Kahve telvesi gibi görünen herhangi bir kan veya koyu renkli parçacıklar kusarsınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini yaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşun:

VIMOVO, nadiren beyaz kan hücrelerini etkileyerek bağışıklık yetmezliğine neden olabilir.

Şiddetli genel durumla seyreden ateş veya boyun, boğaz veya ağızda ağrı veya idrar yapmada güçlük gibi lokal enfeksiyon belirtileri ile birlikte ateş gibi belirtilerle seyreden bir enfeksiyonunuz varsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. Beyaz kan hücrelerinin eksikliği (agranülositoz) bir kan testi ile ekarte edilebilir. Bu sırada ilaçlarınız hakkında bilgi vermeniz önemlidir.

Diğer olası yan etkiler şunlardır:

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)

- Baş ağrısı.
- Yorgun hissetmek.
- Susamış hissetmek.
- Depresif hissetmek.
- Nefes nefese hissetmek.
- Artan terleme.
- Kaşıntılı cilt ve deri döküntüleri.
- Dönme hissi (baş dönmesi).
- Cildinizde kırmızı veya mor izler, morluklar veya lekeler.
- Hasta hissetmek (bulantı) veya hasta olmak (kusma).
- Kalbinizde çarpınan bir his (çarpıntı). Rahatsız uyku veya uyku sorunu (uykusuzluk). İştihâ sorunları veya kulaklarınızda çınlama. Baş dönmesi, uykulu hissetme veya sersemlik hissi.
- Ellerin, ayakların ve ayak bileklerinin şişmesi (ödem). Ağız içinde bir iltihap.
- Görme sorunları.
- İshal, mide ağrısı, mide ekşimesi, hazımsızlık, kabızlık, gaz çıkarma veya gaz (şişkinlik).
- İnce bağırsağın ilk kısmındaki (duodenum) mide ülseri veya ülseri.
- Mide zarının iltihaplanması (gastrit). Midede iyi huylu polipler.

Yaygın olmayan, seyrek veya çok seyrek (100 kişiden 1'ini veya daha azını etkileyebilir)

- Ağrılı bir ağız veya ağız ülseri.
- Bulanık görme, konjonktivit veya göz ağrısı gibi görme sorunları.

- Garip rüyalar.
- Uykulu hissediyor.
- Kanınızdaki şeker (glikoz) miktarında artış. Semptomlar susama hissi ve artan idrar miktarını içerebilir.
- Kanınızdaki düşük şeker (glikoz) seviyeleri. Semptomlar aç veya zayıf hissetmeyi, terlemeyi ve hızlı kalp atışını içerebilir.
- Koma.
- Kan damarlarının iltihabı. Mide veya bağırsakta perforasyon (delik).
- Sistemik lupus eritematozus (SLE), vücudun bağışıklık sisteminin vücuda saldırdığı ve eklem ağrısı, deri döküntüleri ve ateşe neden olan bir hastalık.
- Büyümüş lenf bezleri.
- Kalça, bilek veya omurga kırığı (VIMOVO yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanılıyorsa). Ateş.
-
- Bayılma.
- Kuru ağız.
- saldırganlık
- İşitme kaybı.
- Astım krizi.
- Uyuyor veya nöbetler.
- Dönem sorunları.
- Ağırlık değişir.
- Saç dökülmesi (alopesi).
- Topaklı döküntü (kurdeşen).
- Eklem ağrısı (artralji). Erkeklerde büyümüş göğüsler.
- Ağrılı veya şişmiş dil. Seğirme veya kas titremesi. İştah sorunları veya tat değişiklikleri. Kas zayıflığı veya ağrısı (miyalji). Kanınızın pıhtılaşması daha uzun sürebilir.
- Kadınların hamile kalma sorunları. Ateş, kızarıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri. Düzensiz, yavaş veya çok hızlı kalp atışı. "iğneler ve iğneler" gibi karıncalanma hisleri. Hafızanız veya konsantrasyonunuzla ilgili zorluk.
- Heyecanlı, kafası karışmış, endişeli veya gergin hissetmek. Genellikle kendini kötü, zayıf ve enerjisiz hissetmek.
-
-
-
- Su aldığınız için vücudunuzun şişmiş veya ağrılı kısımları. Yüksek veya düşük tansiyon. Baygınlık veya baş dönmesi hissedebilirsiniz.
- Deri döküntüsü veya kabarması veya cildinizin güneş ışığına maruz kaldığında daha hassas hale gelmesi.
- Orada olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar).
- Karaciğerinizin nasıl çalıştığını görmek gibi kan testi sonuçlarındaki değişiklikler. Doktorunuz daha fazlasını açıklayabilir.
- Bağırsakları etkileyebilen ve bir mantarın neden olduğu "pamukçuk" adı verilen bir enfeksiyon. İdrarınızda (suda) kan veya diğer böbrek sorunları. Sırt ağrınız olabilir.
- Yavaş yavaş kötüleşebilen nefes almada zorluk. Bu, pnömoni veya gelişen akciğerlerinizin şişmesi belirtileri olabilir.
- Kanınızdaki düşük tuz (sodyum) seviyeleri. Bu halsizliğe, hastalanmaya (kusmaya) ve kramplara neden olabilir.
- Ateş, hissetme veya hasta olma, boyun tutulması, baş ağrısı, parlak ışığa duyarlılık ve kafa karışıklığı gibi menenjit belirtileri.
- Pankreasınızla ilgili sorunlar. İşaretler, sırtınıza yayılan şiddetli mide ağrısını içerir. Ciddi karaciğer problemlerinin (hepatit) belirtisi olan soluk renkli dışkı. Ciddi karaciğer sorunları, karaciğer yetmezliğine ve beyin bozukluğuna yol açabilir.

- Kolit veya Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalığının kötüleşmesi. Belirtiler arasında mide ağrısı, ishal, kusma ve kilo kaybı sayılabilir.
- Kırmızı küre (anemi), beyaz küre veya trombosit sayısında azalma gibi kan sorunları. Bu halsizliğe, morarmaya, ateşe, şiddetli titremeye, boğaz ağrısına neden olabilir veya enfeksiyonları daha olası hale getirebilir. Belirli bir tür beyaz kan hücresi sayısında artış (eozinofili).
- Her tür kan hücresi eksikliği (pansitopeni).
- Kalbinizin vücuda kan pompalama şekliyle ilgili sorunlar veya kan damarlarınızda hasar. Belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, bayılma hissi, göğüs ağrısı veya genel ağrıyı içerebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklık tahmin edilemiyor)

- Üç aydan uzun süredir VIMOVO kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır. Düşük magnezyum seviyeleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi veya artmış kalp hızı olarak görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum seviyeleri ayrıca kandaki potasyum veya kalsiyum seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Doktorunuz magnezyum seviyenizi izlemek için düzenli kan testleri yapmaya karar verebilir.
- Döküntü, muhtemelen eklemlerde ağrı ile.

Bu olası yan etkiler listesi sizi endişelendirmesin.Bunların hiçbirini alamayabilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan şu yollarla da bildirebilirsiniz:

İrlanda

HPRa Farmakovijilans, Web Sitesi:www.hpra.ie .

Birleşik Krallık

Sarı Kart Programı:www.mhra.gov.uk/sari-kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartı arayın

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. VIMOVO nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı karton, şişe veya blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

30°C'nin üzerinde saklamayın.

Şişe: Orijinal ambalajında saklayınız ve nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı tutunuz.

Blister: Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler

VIMOVO'nun içeriği

- Aktif maddeler naproksen 500 mg ve esomeprazol 20 mg'dır.
- Tablet çekirdeğindeki diğer bileşenler (yardımcı maddeler) kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, povidon K90, koloidal silikon dioksit ve film kaplamada karnauba mumu, gliserol monostearat 40-55, hipromelloz tip 2910 (3 mPas, 6 mPas ve 50 mPas), demir oksit (E172, sarı, siyah), makrogol 8000, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, metil parahidroksibenzoat (E218), polidekstroz, polisorbitat 80, propilen glikol, propil parahidroksibenzoat (E216), sodyum laurilsülfat, titanyum dioksit (E171), trietil sitrat.

VIMOVO'nun görünüşü ve paketin içeriği

Bunlar, siyah mürekkeple 500/20 olarak işaretlenmiş 18x9.5 mm oval sarı tabletlerdir.

Şişe:

Paket boyutları - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 veya 500 değiştirilmiş salımlı tablet.

Şişeler, vidalı kapakta (tabletleri kuru tutmak için) silika jel kurutucu içerir.

Alüminyum blister ambalaj:

Paket boyutları - 10, 20, 30, 60 veya 100 değiştirilmiş salımlı tablet.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

VIMOVO'nun pazarlama yetkisi Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, İrlanda'ya aittir.

VIMOVO, Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Almanya tarafından üretilmiştir. veya AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, İsveç .

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde Vimovo adı altında aşağıdaki ülkelerde ruhsatlandırılmıştır:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.

Bu broşür en son Ekim 2021'de güncellenmiştir.

Yalnızca İngiltere

Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:

0800 198 5000

Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

Ürün adı

VIMOVO 500 mg/20 mg tabletler

Referans numarası

50414/0022

Bu, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü tarafından sağlanan bir hizmettir.