

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → นารทริปตัน

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601083.html>

## นารทริปตัน

ออกเสียงว่า (นาร์ 'การ'เดินทางสี่น้ำตา)

### hy เป็นยานี้กำหนด?

นารทริปแทนใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรน (อาการปวดศีรษะแบบสั้นอย่างรุนแรง ซึ่งบางครั้งมีอาการคลื่นไส้และไวต่อเสียงหรือแสง) นารทริปแทนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า selective serotonin receptor agonists มันทำงานโดยทำให้หลอดเลือดรอบ ๆ สมอแคงลง หยุดสัญญาณความเจ็บปวดจากการถูกส่งไปยังสมอง และหยุดการปล่อยสารธรรมชาติบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการปวด คลื่นไส้ และอาการอื่นๆ ของไมเกรน Naratriptan ไม่ได้ป้องกันการโจมตีไมเกรนหรือลดจำนวนอาการปวดหัวที่คุณมี

### ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Naratriptan มาเป็นแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักใช้เมื่อมีอาการปวดหัวไมเกรน หากอาการของคุณดีขึ้นหลังจากทานนารทริปแทนแต่กลับมากหลังจาก 4 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น คุณอาจทานยาเม็ดที่สอง อย่างไรก็ตาม หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากทานนารทริปแทนแล้ว อย่าใช้ยาเม็ดที่สองก่อนโทรหาแพทย์ แพทย์ของคุณจะแจ้งจำนวนเม็ดยาสูงสุดที่คุณอาจใช้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจทานนารทริปแทนตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

คุณอาจรับประทานนารทริปแทนครั้งแรกในสำนักงานแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่คุณสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่ร้ายแรงได้

โทรหาแพทย์หากอาการปวดหัวของคุณไม่ดีขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังจากรับประทานนารทริปแทน

หากคุณรับประทานนารทริปแทนบ่อยกว่าหรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำ อาการปวดศีรษะของคุณอาจแย่ลงหรืออาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น คุณไม่ควรทานนารทริปแทนหรือยารักษาอาการปวดศีรษะอื่นๆ นานกว่า 10 วันต่อเดือน โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณต้องการทานนารทริปแทนเพื่อรักษาอาการปวดหัวมากกว่าสี่ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

### ใช้สำหรับยานี้

ยานี้บางครั้งมีกำหนดสำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวด ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนรับประทานนาราทริปแทน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ยาอื่น ๆ ของ naratriptan หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล naratriptan สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- อย่าใช้ naratriptan หากเคยใช้ยาต่อไปนี้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวรับ serotonin แบบเลือกอื่น ๆ เช่น almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, ใน Treximet) หรือ zolmitriptan (Zomig); หรือยาประเภท ergot เช่น bromocriptine (Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar), methylergonovine (Methergine), methysergide และเปอร์โกลด์ (Permax)
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาหรือวางแผนที่จะใช้หรือวางแผนที่จะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetaminophen (Tylenol); ยากล่อมประสาท เช่น amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor), protriptyline (Vivactil) และ trimipramine (เซอร์มอนทิล); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ยาคุมกำเนิด (ยาคุมกำเนิด); เลือก serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, ใน Symbyax), fluvoxamine, paroxetine (Paxil), และเซอราลีน (โซลอฟต์); และยาในกลุ่ม selective serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), sibutramine (Meridia) และ venlafaxine (Effexor) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา: โอโซคาร์บอนอกซาลิด (มาร์แพน), ฟินลีสซิน (นาร์ดีล), เซลิกิลีน (เอลเดพริล) และกรานิลโซโพรมีน (พาร์เนก) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา: โอโซคาร์บอนอกซาลิด (มาร์แพน), ฟินลีสซิน (นาร์ดีล), เซลิกิลีน (เอลเดพริล) และกรานิลโซโพรมีน (พาร์เนก) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา: โอโซคาร์บอนอกซาลิด (มาร์แพน), ฟินลีสซิน (นาร์ดีล), เซลิกิลีน (เอลเดพริล) และกรานิลโซโพรมีน (พาร์เนก) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย; โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); หัวใจเต้นผิดปกติ จังหวะหรือ 'mini-stroke'; ปัญหาการไหลเวียนเช่นเส้นเลือดอุดตัน, สัมเลือดที่ขา, โรค Raynaud (ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไปยังนิ้วมือ, นิ้วเท้า, หูและจมูก) หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ต้องเสียเป็นเลือดและปวดท้องที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปยังลำไส้ลดลง); แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรทานนาราทริปแทน
- แจ้งแพทย์หากคุณสูบบุหรี่หรือมีน้ำหนักเกิน หากเคยเป็นหรือเคยเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน โคเลสเตอรอลสูง โรคไตหรือตับ หากผ่านวัยหมดประจำเดือน (เปลี่ยนชีวิต); หรือถ้าสมาชิกในครอบครัวคนใดเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ทานยา ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากตั้งครรภ์ขณะทานนาราทริปแทนให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
- ควรรู้ว่านาราทริปแทนอาจทำให้ง่วงได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
- ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะเพื่อให้แน่ใจว่าอาการเหล่านี้เกิดจากไมเกรน ไม่ควรใช้ Naratriptan ในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนบางประเภท (ไมเกรนอัมพาตครึ่งซีกหรือ basilar) หรืออาการปวดศีรษะประเภทอื่นๆ (เช่น อาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์)

### ผลข้างเคียงของหมวด ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

### นาราทริปแทนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ความอ่อนแอ

- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- อาการเวียนศีรษะ
- รู้สึกอึดหรือเย็น

### **ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:**

- แน่น ปวด กดดัน หรือหนักในหน้าอก คอ คอ หรือกราม
- หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ
- หายใจถี่
- เหนื่อยออกง่ายขึ้น
- มีนหัว
- อ่อนแรงหรือชาหรือแขนหรือขา
- พุดช้ำหรือพุดยาก
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
- เสียงแหบ
- ลมพิษ
- ผื่น
- อาการคัน
- ปวดท้องกะทันหันหรือรุนแรง
- ท้องเสียเป็นเลือด
- ท้องผูก
- อาเจียน
- นิวหรือนิวเท่าสีซีดหรือสีน้ำเงิน
- ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

### **หมวก ฉนวนควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?**

เก็บยาไว้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อกฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- มึนหัว
- เจ็บคอ
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- สูญเสียการประสานงาน
- อาการเจ็บหน้าอก

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ ควรตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรจดบันทึกการปวดหัวโดยการเขียนเมื่อคุณมีอาการปวดหัวและเมื่อคุณทานนารากริปแทน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ทามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- Amerge®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2015

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS<sup>®</sup>ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists<sup>®</sup>, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบธesda, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ  
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

---

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022