

[Nhà](#) → [Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung](#) → Naratriptan

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601083.html>

Naratriptan

phát âm là (nar 'a trip tan)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Naratriptan được sử dụng để điều trị các triệu chứng của chứng đau nửa đầu (đau đầu dữ dội, đau nhói đôi khi kèm theo buồn nôn và nhạy cảm với âm thanh hoặc ánh sáng). Naratriptan nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất chủ vận thụ thể serotonin có chọn lọc. Nó hoạt động bằng cách thu hẹp các mạch máu xung quanh não, ngăn chặn tín hiệu đau được gửi đến não và ngừng giải phóng một số chất tự nhiên gây đau, buồn nôn và các triệu chứng khác của chứng đau nửa đầu. Naratriptan không ngăn chặn các cơn đau nửa đầu hoặc giảm số lượng cơn đau đầu mà bạn có.

có nên sử dụng thuốc này không?

Naratriptan có dạng viên nén để uống. Thuốc thường được dùng khi có dấu hiệu đầu tiên của chứng đau nửa đầu. Nếu các triệu chứng của bạn cải thiện sau khi bạn dùng naratriptan nhưng trở lại sau 4 giờ hoặc lâu hơn, bạn có thể uống viên thứ hai. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng của bạn không cải thiện sau khi bạn dùng naratriptan, đừng uống viên thứ hai trước khi gọi cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho bạn biết số lượng viên thuốc tối đa bạn có thể uống trong khoảng thời gian 24 giờ. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. Hãy naratriptan đúng theo chỉ dẫn. Không dùng nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc uống thường xuyên hơn so với quy định của bác sĩ.

Bạn có thể dùng liều naratriptan đầu tiên tại phòng khám bác sĩ hoặc cơ sở y tế khác, nơi bạn có thể được theo dõi các phản ứng nghiêm trọng.

Gọi cho bác sĩ nếu cơn đau đầu của bạn không thuyên giảm hoặc xảy ra thường xuyên hơn sau khi dùng naratriptan.

Nếu bạn dùng naratriptan thường xuyên hơn hoặc lâu hơn khoảng thời gian được khuyến nghị, cơn đau đầu của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc có thể xảy ra thường xuyên hơn. Bạn không nên dùng naratriptan hoặc bất kỳ loại thuốc đau đầu nào khác quá 10 ngày mỗi tháng. Gọi cho bác sĩ nếu bạn cần dùng naratriptan để điều trị hơn 4 cơn đau đầu trong thời gian 1 tháng.

Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

nhịet sử dụng cho thuốc này

Thuốc này đôi khi được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi dùng naratriptan,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với naratriptan bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong viên nén naratriptan. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.
- Không dùng naratriptan nếu bạn đã dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây trong 24 giờ qua: chất chủ vận thụ thể serotonin có chọn lọc khác như almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, trong Treximet), hoặc zolmitriptan (Zomig); hoặc thuốc dạng ergot như bromocriptine (Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylate (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar), methylergonovine (Sans), ergide và pergolide (Permax).
- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ chất nào sau đây: acetaminophen (Tylenol); thuốc chống trầm cảm như amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor), protriptyline Surmontil); aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác (NSAIDS) như ibuprofen (Advil, Motrin) và naproxen (Aleve, Naprosyn); thuốc tránh thai (thuốc tránh thai); thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) như citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, trong Symbyax), fluvoxamine, paroxetine (Paxil), và sertraline (Zoloft); và các chất ức chế tái hấp thu serotonin / norepinephrine có chọn lọc (SNRI) như desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), sibutramine (Meridia), và venlafaxine (Effexor). Cũng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau hoặc đã ngừng dùng trong vòng hai tuần qua: isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) và tranylcypromine (Parnate). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận hơn về các tác dụng phụ. Cũng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau hoặc đã ngừng dùng trong vòng hai tuần qua: isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) và tranylcypromine (Parnate). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận hơn về các tác dụng phụ. Cũng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau hoặc đã ngừng dùng trong vòng hai tuần qua: isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) và tranylcypromine (Parnate). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận hơn về các tác dụng phụ.
- nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã hoặc đã từng bị bệnh tim; một cơn đau tim; đau thắt ngực (đau ngực); nhịp tim không đều; đột quỵ hoặc 'nét nhỏ'; các vấn đề về tuần hoàn như giãn tĩnh mạch, cục máu đông ở chân, bệnh Raynaud (các vấn đề về lưu lượng máu đến ngón tay, ngón chân, tai và mũi) hoặc bệnh thiếu máu cục bộ đường ruột (tiêu chảy ra máu và đau dạ dày do giảm lưu lượng máu đến ruột); Bác sĩ có thể yêu cầu bạn không dùng naratriptan.
- cho bác sĩ biết nếu bạn hút thuốc hoặc thừa cân; nếu bạn bị hoặc đã từng bị huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, hoặc bệnh thận hoặc gan; nếu bạn đã trải qua thời kỳ mãn kinh (thay đổi cuộc sống); hoặc nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị hoặc đã từng mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có kế hoạch hoạt động tình dục trong khi đang dùng thuốc này, hãy nói chuyện với bác sĩ về các phương pháp ngừa thai hiệu quả. Nếu bạn có thai trong khi dùng naratriptan, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.
- bạn nên biết rằng naratriptan có thể làm cho bạn buồn ngủ. Không lái xe ô tô hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
- nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng đau đầu của bạn để chắc chắn rằng chúng là do chứng đau nửa đầu gây ra. Naratriptan không nên được sử dụng để điều trị một số loại đau nửa đầu (đau nửa đầu hoặc đau nửa đầu) hoặc các loại đau đầu khác (chẳng hạn như đau đầu cụm).

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Naratriptan có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

- yếu đuối

- mệt mỏi
- đau bụng
- buồn nôn
- chóng mặt
- cảm thấy ấm hoặc lạnh

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:

- thắt chặt, đau, áp lực hoặc nặng hơn ở ngực, cổ họng, cổ hoặc hàm
- nhịp tim nhanh, đập thành thịch hoặc không đều
- hụt hơi
- toát mồ hôi lạnh
- cảm giác lâng lâng
- yếu hoặc tê hoặc cánh tay hoặc chân
- nói chậm hoặc khó
- khó thở hoặc nuốt
- sưng mặt, cổ họng, lưỡi, môi, mắt, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân
- khàn tiếng
- tổ ong
- phát ban
- ngứa
- đau dạ dày đột ngột hoặc dữ dội
- tiêu chảy ra máu
- táo bón
- nôn mửa
- ngón tay hoặc ngón chân tái nhợt hoặc xanh
- đau, rát hoặc ngứa ran ở bàn tay hoặc bàn chân

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?

Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm).

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ Thuốc An toàn của FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy cập vào chương trình mua lại.

Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tại <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm những điều sau:

- cảm giác lâng lâng
- đau cổ
- mệt mỏi
- mất phối hợp
- đau ngực

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn. Huyết áp của bạn nên được kiểm tra thường xuyên.

Bạn nên ghi nhật ký về cơn đau đầu bằng cách viết ra giấy khi bạn bị đau đầu và khi bạn dùng naratriptan.

Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn thuốc của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

- Amerge®

Sửa đổi lần cuối - 15/10/2015

[Tìm hiểu cách trích dẫn trang này](#)



[Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm](#)

AHFS® Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022