



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Nelfinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html>

## Nelfinavir

pronunțat ca (nel fin' a vier)

### de ce este prescris acest medicament?

Nelfinavir este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV). Nelfinavirul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de protează. Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși nelfinavirul nu vindecă HIV, vă poate reduce șansele de a dezvolta sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) și boli legate de HIV, cum ar fi infecții grave sau cancer. Luarea acestor medicamente împreună cu practicarea sexului mai sigur și efectuarea altor schimbări în stilul de viață poate scădea riscul de transmitere a virusului HIV către alte persoane.

### cum trebuie utilizat acest medicament?

Nelfinavir se prezintă sub formă de tablete și pulbere pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia de două până la trei ori pe zi cu alimente. Luați nelfinavir aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați nelfinavir exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă nu puteți înghiți comprimatul, îl puteți pune într-un pahar și îl puteți dizolva într-o cantitate mică de apă. Se amestecă bine lichidul și se bea imediat. Clătiți paharul cu mai multă apă și înghițiți întregul amestec pentru a vă asigura că ați luat toate medicamentele.

Pulberea orală de nelfinavir poate fi adăugată în apă, lapte, formulă, lapte de soia sau suplimente alimentare. Se amestecă bine și se bea tot lichidul imediat pentru a lua doza completă. Eticheta de prescripție vă spune câte cupe de pulbere de nelfinavir să adăugați la lichid. Dacă amestecul nu este luat imediat, acesta trebuie păstrat la frigider și luat în decurs de 6 ore. Nu amestecați pulberea orală de nelfinavir cu alimente sau suc acide (suc de portocale, suc de mere sau sos de mere). Nu amestecați nelfinavir cu apă în recipientul original.

Nelfinavir controlează infecția cu HIV, dar nu o vindecă. Continuați să luați nelfinavir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați nelfinavir fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați nelfinavir sau săriți peste doze, infecția dumneavoastră se poate agrava sau deveni rezistentă la medicamente.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

### există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

## ce precauții speciale ar trebui să urmez?

### Înainte de a lua nelfinavir,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la nelfinavir, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din tablete sau pulbere de nelfinavir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alfuzosin (Uroxatral); amiodarona (Cordarone, Nexterone, Pacerone); cisapridă (Propulsid; nu este disponibil în SUA); medicamente de tip ergot, cum ar fi bromocriptina (Cycloset, Parlodel), dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilații ergoloizi (Hydergine), ergotamina (Ergomar, în Cafergot, în Migergot) și metilergonovină (Methergine); lovastatin (Altoprev); lurasidonă (Latuda); midazolam (Versed) pe cale orală; pimozidă (Orap); chinidină (în Nuedexta); rifampin (Rimactane, Rifadin, în Rifater, în Rifamate); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, în Vytorin); Sunătoare; și triazolam (Halcion). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați nelfinavir dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanti ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); azitromicină (Azasite, Zithromax, Zmax); bosentan (Tracleer); anumite medicamente care blochează canalele de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc, în Prestalia, în Twynsta, altele), felodipină, isradipină, nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipină (Nymalize) și nisoldipină (Sular); carbamazepină (Carbatrol, Eptol, Equetro, Tegretol, altele); anumite medicamente care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, în Caduet) și rosuvastatin (Crestor); colchicina (Colcrys, Mitigare); delavirdină (Rescriptor); fluticazonă (Flonase, Flovent; în Advair); indinavir (Crixivan); medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) și tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); metadonă (doloфинă, metadoză); nevirapină (Viramune); anumiți inhibitori ai fosfodiesterazei (inhibitori PDE-5) utilizați pentru disfuncția erectilă, cum ar fi sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) și vardenafil (Levitra); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) și rabeprazol (AcipHex); quetiapină (Seroquel); rifabutină (Mycobutin); ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Viekira Pak); salmeterol (Serevent, în Advair); saquinavir (Invirase); și trazodonă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu nelfinavirul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.
- dacă luați didanozină (Videx), luați-o cu 1 oră înainte sau cu mai mult de 2 ore după nelfinavir.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați pilule contraceptive. Nelfinavir poate scădea eficacitatea contraceptivelor orale. Ar trebui să utilizați o altă metodă de control al nașterii în timp ce luați acest medicament. Discutați cu medicul dumneavoastră despre controlul nașterilor în timp ce luați nelfinavir.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, hemofilie (un grup de tulburări de sângerare moștenite în care capacitatea de coagulare a sângelui nu este normală) sau boală hepatică.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați nelfinavir, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați dacă aveți infecție cu HIV și luați nelfinavir.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați nelfinavir.

- trebuie să fiți conștient de faptul că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi partea superioară a spatelui, gâtul („cocoașă de bivoliță”), sânii și în jurul stomacului. Este posibil să observați o pierdere de grăsime corporală de pe față, picioare și brațe.
- trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creșteri ale zahărului din sânge) în timp ce luați acest medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timp ce luați nelfinavir: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere încețoșată sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți oricare dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută care nu este tratată poate provoca o afecțiune gravă numită cetoacidoză. Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. Simptomele cetoacidozei includ gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație, respirație care miroase fructat și scăderea stării de conștiență.
- dacă aveți fenilcetonurie (PKU, o afecțiune moștenită în care trebuie urmată o dietă specială pentru a preveni afectarea creierului care poate provoca dizabilitate intelectuală severă), trebuie să știți că pulberea orală de nelfinavir este îndulcită cu aspartam care formează fenilalanina.
- trebuie să știți că, în timp ce luați medicamente pentru tratarea infecției cu HIV, sistemul dumneavoastră imunitar poate deveni mai puternic și poate începe să lupte împotriva altor infecții care erau deja în corpul dumneavoastră. Acest lucru vă poate determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții. Dacă aveți simptome noi sau care se agravează în orice moment în timpul tratamentului cu nelfinavir, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră.

## **ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?**

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## **ce ar trebui să fac dacă uit o doză?**

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

## **ce efecte secundare poate provoca acest medicament?**

**Nelfinavir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:**

- diaree
- greață
- gaz
- dureri de stomac
- pierderea poftei de mâncare
- eczemă

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:**

- urticarie
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire

Nelfinavir conține o substanță chimică care provoacă cancer la animalele de laborator. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a cerut producătorului să facă modificări în modul în care se face nelfinavirul pentru a scădea cantitatea de această substanță chimică din produsele cu nelfinavir. Riscul pentru oameni este necunoscut, dar poate fi mai mare la copii și femeile gravide. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua nelfinavir.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## ce ar trebui să știi despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). După ce pulberea de nelfinavir a fost adăugată în lichid, amestecul poate fi păstrat la temperatura camerei timp de până la 6 ore.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la nelfinavir.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Țineți o cantitate de nelfinavir la îndemână. Nu așteptați până când rămâneți fără medicamente pentru a vă reumple rețeta.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitamine, minerale sau alte diete.

suplimente. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Viracept®

Ultima revizuire - 15.01.2022

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022