



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → nelfinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html>

nelfinavir

pronunciado como (nel fin' a veer)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El nelfinavir se usa junto con otros medicamentos para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El nelfinavir pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la proteasa. Funciona al disminuir la cantidad de VIH en la sangre. Aunque el nelfinavir no cura el VIH, puede disminuir la posibilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer. Tomar estos medicamentos junto con practicar sexo más seguro y hacer otros cambios en el estilo de vida puede disminuir el riesgo de transmitir el virus del VIH a otras personas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El nelfinavir viene en tabletas y en polvo para tomar por vía oral. Por lo general, se toma de dos a tres veces al día con alimentos. Tome nelfinavir aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome nelfinavir exactamente como se le indique. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Si no puede tragar la tableta, puede ponerla en un vaso y disolverla en una pequeña cantidad de agua. Mezcle bien el líquido y bébalo inmediatamente. Enjuague el vaso con más agua y trague toda la mezcla para asegurarse de haber tomado todo el medicamento.

El polvo oral de nelfinavir se puede agregar al agua, leche, fórmula, leche de soya o suplementos dietéticos. Mezcle bien y beba todo el líquido de inmediato para tomar la dosis completa. La etiqueta de su receta le indica cuántas cucharadas de polvo de nelfinavir debe agregar al líquido. Si la mezcla no se toma de inmediato, debe almacenarse en el refrigerador y tomarse dentro de las 6 horas. No mezcle el polvo oral de nelfinavir con alimentos o jugos ácidos (jugo de naranja, jugo de manzana o compota de manzana). No mezcle nelfinavir con agua en el envase original.

Nelfinavir controla la infección por VIH pero no la cura. Continúe tomando nelfinavir incluso si se siente bien. No deje de tomar nelfinavir sin hablar con su médico. Si deja de tomar nelfinavir o se salta algunas dosis, su infección puede empeorar o volverse resistente a los medicamentos.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar nelfinavir,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al nelfinavir, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las tabletas o el polvo de nelfinavir. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico si está tomando alfuzosina (Uroxatral); amiodarona (Cordarone, Nexterone, Pacerone); cisaprida (Propulsid; no disponible en los EE. UU.); medicamentos de tipo ergotamínico como bromocriptina (Cycloset, Parlodel), dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilatos ergoloides (Hydergine), ergotamina (Ergomar, en Cafergot, en Migergot) y metilergonovina (Methergine); lovastatina (Altoprev); lurasidona (Latuda); midazolam (Versed) por vía oral; pimozida (Orap); quinidina (en Nuedexta); rifampicina (Rimactane, Rifadin, en Rifater, en Rifamate); sildenafilo (única marca Revatio utilizada para enfermedades pulmonares); simvastatina (Zocor, en Vytorin); Hierba de San Juan; y triazolam (Halcion). Su médico probablemente le indicará que no tome nelfinavir si está tomando uno o más de estos medicamentos.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, Jantoven); azitromicina (Azasite, Zithromax, Zmax); bosentán (Tracleer); ciertos medicamentos que bloquean los canales de calcio, como amlodipina (Norvasc, en Prestalia, en Twynsta, otros), felodipina, isradipina, nicardipina (Cardene), nifedipina (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipina (Nymalize) y nisoldipina (Sular); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, otros); ciertos medicamentos para reducir el colesterol (estatinas) como atorvastatina (Lipitor, en Caduet) y rosuvastatina (Crestor); colchicina (Colcrys, Mitigare); delavirdina (Rescriptor); fluticasona (Flonase, Flovent; en Advair); indinavir (Crixivan); medicamentos que suprimen el sistema inmunitario como ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) y tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); metadona (Dolophine, Methadose); nevirapina (Viramune); ciertos inhibidores de la fosfodiesterasa (inhibidores de la PDE-5) utilizados para la disfunción eréctil como sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) y vardenafil (Levitra); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); inhibidores de la bomba de protones como esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) y rabeprazol (AcipHex); quetiapina (Seroquel); rifabutina (Mycobutin); ritonavir (Norvir, en Kaletra, en Viekira Pak); salmeterol (Serevent, en Advair); saquinavir (Invirasa); y trazodona. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con nelfinavir, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.
- si está tomando didanosina (Videx), tómela 1 hora antes o más de 2 horas después del nelfinavir.
- Informe a su médico si está tomando píldoras anticonceptivas. Nelfinavir puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Debe usar otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento. Hable con su médico sobre el control de la natalidad mientras toma nelfinavir.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido diabetes, hemofilia (un grupo de trastornos hemorrágicos hereditarios en los que la capacidad de coagulación de la sangre no es normal) o enfermedad hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma nelfinavir, llame a su médico. No debe amamantar si tiene infección por VIH y está tomando nelfinavir.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando nelfinavir.

- debe tener en cuenta que su grasa corporal puede aumentar o moverse a diferentes áreas de su cuerpo, como la parte superior de la espalda, el cuello ("joroba de búfalo"), los senos y alrededor del estómago. Es posible que note una pérdida de grasa corporal en la cara, las piernas y los brazos.
- Debe saber que puede experimentar hiperglucemia (aumentos en el nivel de azúcar en la sangre) mientras toma este medicamento, incluso si aún no tiene diabetes. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas mientras toma nelfinavir: sed extrema, micción frecuente, hambre extrema, visión borrosa o debilidad. Es muy importante que llame a su médico tan pronto como tenga cualquiera de estos síntomas, porque el nivel alto de azúcar en la sangre que no se trata puede causar una afección grave llamada cetoacidosis. La cetoacidosis puede convertirse en una amenaza para la vida si no se trata en una etapa temprana. Los síntomas de la cetoacidosis incluyen boca seca, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, aliento con olor afrutado y disminución de la conciencia.
- si tiene fenilcetonuria (PKU, una afección hereditaria en la que se debe seguir una dieta especial para prevenir daños en el cerebro que pueden causar una discapacidad intelectual grave), debe saber que el polvo oral de nelfinavir está endulzado con aspartamo que forma fenilalanina.
- Debe saber que mientras toma medicamentos para tratar la infección por el VIH, su sistema inmunitario puede fortalecerse y comenzar a combatir otras infecciones que ya estaban en su cuerpo. Esto puede hacer que usted desarrolle síntomas de esas infecciones. Si tiene síntomas nuevos o que empeoran en cualquier momento durante su tratamiento con nelfinavir, asegúrese de informar a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El nelfinavir puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- Diarrea
- náuseas
- gas
- dolor de estómago
- pérdida de apetito
- erupción

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- urticaria
- Comezón
- dificultad para respirar o tragar

Nelfinavir contiene una sustancia química que causa cáncer en animales de laboratorio. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) solicitó al fabricante que realice cambios en la forma en que se produce el nelfinavir para disminuir la cantidad de esta sustancia química en los productos de nelfinavir. Se desconoce el riesgo para los humanos, pero puede ser mayor en niños y mujeres embarazadas. Hable con su médico sobre los riesgos de tomar nelfinavir.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). Después de agregar el polvo de nelfinavir al líquido, la mezcla se puede mantener a temperatura ambiente hasta por 6 horas.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar su respuesta al nelfinavir.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Tenga a mano un suministro de nelfinavir. No espere hasta que se le acabe el medicamento para volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros medicamentos dietéticos.

suplementos Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Viracept®

Última revisión - 15/01/2022

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022