



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Nelfinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html>

Nelfinavir

prononcé comme (nel fin' a veer)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le nelfinavir est utilisé avec d'autres médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le nelfinavir appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la protéase. Il agit en diminuant la quantité de VIH dans le sang. Bien que le nelfinavir ne guérisse pas le VIH, il peut réduire votre risque de développer le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies liées au VIH telles que des infections graves ou un cancer. La prise de ces médicaments, la pratique de rapports sexuels protégés et d'autres changements de mode de vie peuvent réduire le risque de transmission du virus VIH à d'autres personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le nelfinavir se présente sous la forme d'un comprimé et d'une poudre à prendre par voie orale. Il est généralement pris deux à trois fois par jour avec de la nourriture. Prenez le nelfinavir à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le nelfinavir exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Si vous ne parvenez pas à avaler le comprimé, vous pouvez le mettre dans un verre et le dissoudre dans une petite quantité d'eau. Mélangez bien le liquide et buvez-le immédiatement. Rincez le verre avec plus d'eau et avalez tout le mélange pour vous assurer que vous avez pris tous les médicaments.

La poudre orale de nelfinavir peut être ajoutée à de l'eau, du lait, du lait maternisé, du lait de soja ou des compléments alimentaires. Mélangez bien et buvez tout le liquide immédiatement afin de prendre la dose complète. Votre étiquette de prescription vous indique combien de mesures de poudre de nelfinavir ajouter au liquide. Si le mélange n'est pas pris immédiatement, il doit être conservé au réfrigérateur et pris dans les 6 heures. Ne mélangez pas la poudre orale de nelfinavir avec des aliments ou du jus acides (jus d'orange, jus de pomme ou compote de pomme). Ne mélangez pas le nelfinavir avec de l'eau dans le récipient d'origine.

Le nelfinavir contrôle l'infection par le VIH mais ne la guérit pas. Continuez à prendre du nelfinavir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le nelfinavir sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez de prendre du nelfinavir ou sautez des doses, votre infection peut s'aggraver ou devenir résistante aux médicaments.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament est parfois prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du nelfinavir,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au nelfinavir, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés ou la poudre de nelfinavir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous prenez de l'alfuzosine (Uroxatral); amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone); cisapride (Propulsid; non disponible aux États-Unis); médicaments de type ergot tels que la bromocriptine (Cycloset, Parlodel), la dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), les mésylates d'ergoloïde (Hydergine), l'ergotamine (Ergomar, dans Cafergot, dans Migergot) et la méthylergonovine (Methergine); lovastatine (Altoprev); la lurasidone (Latuda); midazolam (Versed) par voie orale ; pimozide (Orap); quinidine (dans Nuedexta); rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; sildénafil (seule marque Revatio utilisée pour les maladies pulmonaires); simvastatine (Zocor, à Vytorin); le millepertuis ; et le triazolam (Halcion). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de nelfinavir si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine (Coumadin, Jantoven) ; azithromycine (Azasite, Zithromax, Zmax); bosentan (Tracler); certains médicaments bloquant les canaux calciques tels que l'amlodipine (Norvasc, à Prestalia, à Twynsta, autres), la félodipine, l'isradipine, la nicardipine (Cardene), la nifédipine (Adalat, Afeditab, Procardia), la nimodipine (Nymalize) et la nisoldipine (Sular); carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, autres); certains médicaments hypocholestérolémiants (statines) tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet) et la rosuvastatine (Crestor); la colchicine (Colcrys, Mitigare) ; la delavirdine (Rescriptor); fluticasone (Flonase, Flovent ; dans Advair); indinavir (Crixivan); les médicaments qui suppriment le système immunitaire tels que la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), le sirolimus (Rapamune, Torisel) et le tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); la méthadone (Dolophine, Methadose) ; névirapine (Viramune); certains inhibiteurs de la phosphodiesterase (inhibiteurs de la PDE-5) utilisés pour la dysfonction érectile tels que le sildénafil (Viagra), le tadalafil (Adcirca, Cialis) et le vardénafil (Levitra) ; phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); les inhibiteurs de la pompe à protons tels que l'ésoméprazole (Nexium), le lansoprazole (Prevacid), l'oméprazole (Prilosec), le pantoprazole (Protonix) et le rabéprazole (AcipHex); quétiapine (Seroquel); rifabutine (Mycobutin); ritonavir (Norvir, à Kaletra, à Viekira Pak); salmétérol (Serevent, dans Advair); saquinavir (Invirase); et la trazodone. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le nelfinavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.
- si vous prenez de la didanosine (Videx), prenez-la 1 heure avant ou plus de 2 heures après le nelfinavir.
- informez votre médecin si vous prenez des contraceptifs oraux. Le nelfinavir peut diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Vous devez utiliser une autre méthode de contraception pendant que vous prenez ce médicament. Parlez à votre médecin de la contraception pendant que vous prenez du nelfinavir.
- informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète, d'hémophilie (un groupe de troubles hémorragiques héréditaires dans lesquels la capacité du sang à coaguler n'est pas normale) ou d'une maladie du foie.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du nelfinavir, appelez votre médecin. Vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée par le VIH et que vous prenez du nelfinavir.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez du nelfinavir.

- vous devez savoir que votre graisse corporelle peut augmenter ou se déplacer vers différentes zones de votre corps, telles que le haut du dos, le cou ("bosse de bison"), les seins et autour de votre ventre. Vous remarquerez peut-être une perte de graisse corporelle au niveau du visage, des jambes et des bras.
- vous devez savoir que vous pourriez souffrir d'hyperglycémie (augmentation de votre taux de sucre dans le sang) pendant que vous prenez ce médicament, même si vous n'êtes pas déjà atteint de diabète. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants pendant que vous prenez du nelfinavir : soif extrême, miction fréquente, faim extrême, vision floue ou faiblesse. Il est très important d'appeler votre médecin dès que vous présentez l'un de ces symptômes, car une glycémie élevée non traitée peut provoquer une maladie grave appelée acidocétose. L'acidocétose peut devenir mortelle si elle n'est pas traitée à un stade précoce. Les symptômes de l'acidocétose comprennent la bouche sèche, des nausées et des vomissements, un essoufflement, une haleine fruitée et une diminution de la conscience.
- si vous souffrez de phénylcétonurie (PCU, une maladie héréditaire dans laquelle un régime alimentaire spécial doit être suivi pour éviter d'endommager votre cerveau pouvant entraîner une déficience intellectuelle sévère), vous devez savoir que la poudre orale de nelfinavir est édulcorée avec de l'aspartame qui forme de la phénylalanine.
- vous devez savoir que pendant que vous prenez des médicaments pour traiter l'infection par le VIH, votre système immunitaire peut se renforcer et commencer à combattre d'autres infections déjà présentes dans votre corps. Cela peut vous amener à développer des symptômes de ces infections. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent à tout moment pendant votre traitement par le nelfinavir, assurez-vous d'en informer votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le nelfinavir peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- diarrhée
- nausée
- gaz
- Douleur d'estomac
- perte d'appétit
- éruption

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- urticaire
- démangeaison
- difficulté à respirer ou à avaler

Le nelfinavir contient un produit chimique reconnu cancérigène chez les animaux de laboratoire. La Food and Drug Administration (FDA) a demandé au fabricant de modifier la façon dont le nelfinavir est fabriqué afin de réduire la quantité de ce produit chimique dans les produits à base de nelfinavir. Le risque pour l'homme est inconnu mais peut être plus élevé chez les enfants et les femmes enceintes. Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de nelfinavir.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Une fois la poudre de nelfinavir ajoutée au liquide, le mélange peut être conservé à température ambiante jusqu'à 6 heures.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

En cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier votre réponse au nelfinavir.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Gardez une réserve de nelfinavir à portée de main. N'attendez pas d'être à court de médicaments pour renouveler votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre (en vente libre) que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres produits diététiques.

suppléments. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Viracept®

Dernière révision - 15/01/2022

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022