Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617034.html

Neratinib

uitgesproken als (ne ra'ti nib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Neratinib wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaald type hormoonreceptorpositieve borstkanker (borstkanker die afhankelijk is van hormonen zoals oestrogeen om te groeien) bij volwassenen na behandeling met trastuzumab (Herceptin) en andere medicijnen. Neratinib wordt samen met capecitabine (Xeloda) gebruikt voor de behandeling van een bepaald type gevorderde hormoonreceptorpositieve borstkanker of borstkanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam na behandeling met ten minste twee andere geneesmiddelen. Neratinib zit in een klasse van medicijnen die kinaseremmers worden genoemd. Het werkt door de werking van een abnormaal eiwit te blokkeren dat kankercellen signaleert om zich te vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Neratinib wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Wanneer neratinib alleen wordt ingenomen om borstkanker te behandelen, wordt het gewoonlijk gedurende één jaar eenmaal daags met voedsel ingenomen. Wanneer neratinib wordt ingenomen met capecitabine voor de behandeling van gevorderde borstkanker of borstkanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, wordt het gewoonlijk eenmaal daags ingenomen met voedsel op dag 1 tot 21 van een cyclus van 21 dagen totdat uw toestand verslechtert of u zich ontwikkelt ernstige bijwerkingen. Neem neratinib elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem neratinib precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Uw arts kan uw dosis verlagen of uw behandeling met neratinib tijdelijk of permanent stopzetten tijdens uw behandeling. Dit hangt af van hoe goed de medicatie voor u werkt en de bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw behandeling. Blijf neratinib gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van neratinib zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u neratinib inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor neratinib, andere medicijnen of een van de bestanddelen van neratinib-tabletten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.

- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: bepaalde antibiotica, waaronder ciprofloxacine (Cipro), claritromycine (Biaxin, in Prevpac), erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin) en troleandomycine (niet langer beschikbaar in de VS); bepaalde antischimmelmiddelen, waaronder clotrimazol (Mycelex), fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) en voriconazol (Vfend); aprepitant (Emend); bosentan (Tracleer); bepaalde calciumantagonisten, waaronder diltiazem (Cardizem, Tiazac, anderen) en verapamil (Calan, Verelan, anderen); cobicistat (Tybost); conivaptan (Vaprisol); crizotinib (Xalkori); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); digoxine (Lanoxine); dronedarone (Multaq); enzalutamide (Xtandi); fexofenadine (Allegra); fluvoxamine (Luvox); idelalisib (Zydelig); imatinib (Gleevec); bepaalde medicijnen voor hepatitis C, waaronder boceprevir (niet langer verkrijgbaar in de VS, Victrelis), dasabuvir (in Viekira Pak), ombitasvir (in Technivie, in Viekira XR) en paritaprevir (in Technivie, in Viekira XR); bepaalde medicijnen voor het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), waaronder efavirenz (Sustiva, in Atripla), elvitegravir (in Genvoya, in Stribild), etravirine (Intelence), indinavir (Crixivan), lopinavir (in Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra), saquinavir (Invirase) en tipranavir (Aptivus); mitotaan (Lysodren); modafinil (Provigil); nefazodon; protonpompremmers zoals esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) en rabeprazol (AcipHex); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifater); en bepaalde medicijnen voor aanvallen, waaronder carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol) en fenytoïne (Dilantin, Phenytek). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met neratinib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met neratinib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met neratinib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

- als u een antacidum gebruikt, neem deze dan ten minste 3 uur vóór of 3 uur na het innemen van neratinib in.
- als u neratinib gebruikt en een medicijn tegen indigestie, brandend maagzuur of zweren (een H_2blokker) zoals cimetidine, famotidine (Pepcid, in Duexis), nizatidine (Axid) of ranitidine (Zantac), neem neratinib ten minste 2 uur vóór of ten minste 10 uur na inname van de H_2blokker.
- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
- vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of als u van plan bent een kind te verwekken. U mag niet zwanger worden terwijl u neratinib gebruikt. Als u een vrouw bent, moet u een zwangerschapstest doen voordat u met de behandeling begint en moet u anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met neratinib en gedurende ten minste 1 maand na inname van de laatste dosis. Als u een man bent, moeten u en uw vrouwelijke partner anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met neratinib en doorgaan tot 3 maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u neratinib gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Neratinib kan de foetus schaden.

- vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van neratinib en tot 1 maand na uw laatste dosis.
- u moet weten dat neratinib vaak diarree veroorzaakt, die ernstig kan zijn. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u de eerste 56 dagen van uw behandeling met neratinib loperamide (Imodium AD), een middel tegen diarree, moet gebruiken om uitdroging (verlies van te veel water uit uw lichaam) te voorkomen. Na 56 dagen behandeling zal uw arts uw dosis loperamide aanpassen zodat u elke dag 1 tot 2 stoelgangen heeft terwijl u neratinib gebruikt. Uw arts kan u ook vertellen om veel vloeistoffen te drinken, veranderingen in uw dieet aan te brengen of andere medicijnen te nemen om de diarree onder controle te houden. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige diarree heeft (meer dan 2 stoelgangen op 1 dag of diarree die niet stopt) of diarree

samen met zwakte, duizeligheid of koorts tijdens het gebruik van neratinib. Bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen van uitdroging ervaart: extreme dorst, droge mond en/of huid, minder plassen of snelle hartslag.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Sla de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Neratinib kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- diarree
- buikpijn
- maagzuur
- opgeblazen gevoel
- mondzweren
- verlies van eetlust
- gewichtsverlies
- bloedneus
- nagelproblemen of veranderingen
- spiertrekkingen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

- gele ogen en huid
- donkere urine
- pijn of ongemak in de rechter bovenbuik
- vermoeidheid
- misselijkheid
- braken
- uitslag
- koorts, moeite met urineren, pijn bij het plassen en andere tekenen van infectie

Neratinib kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- diarree
- misselijkheid
- braken
- buikpijn

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op neratinib te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Nerlynx®

Laatst herzien - 15-05-2020

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022