Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617034.html

Nératinib

prononcé comme (ne ra' ti nib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le nératinib est utilisé pour traiter un certain type de cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (cancer du sein qui dépend d'hormones telles que l'œstrogène pour se développer) chez les adultes après un traitement par le trastuzumab (Herceptin) et d'autres médicaments. Le nératinib est utilisé avec la capécitabine (Xeloda) pour traiter un certain type de cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs ou de cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps après un traitement avec au moins deux autres médicaments. Le nératinib appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de kinases. Il agit en bloquant l'action d'une protéine anormale qui signale aux cellules cancéreuses de se multiplier. Cela aide à ralentir ou à arrêter la propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le nératinib se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Lorsque le nératinib est pris seul pour traiter le cancer du sein, il est généralement pris avec de la nourriture une fois par jour pendant un an. Lorsque le nératinib est pris avec la capécitabine pour traiter un cancer du sein avancé ou un cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps, il est généralement pris une fois par jour avec de la nourriture les jours 1 à 21 d'un cycle de 21 jours jusqu'à ce que votre état s'aggrave ou que vous développiez effets secondaires graves. Prenez le nératinib à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le nératinib exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les comprimés entiers; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

Votre médecin peut diminuer votre dose ou arrêter temporairement ou définitivement votre traitement par le nératinib pendant votre traitement. Cela dépend de l'efficacité du médicament pour vous et des effets secondaires que vous ressentez. Discutez avec votre médecin de la façon dont vous vous sentez pendant votre traitement. Continuez à prendre du nératinib même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le nératinib sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre le nératinib,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au nératinib, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de nératinib. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.

- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : certains antibiotiques, notamment la ciprofloxacine (Cipro), la clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac), l'érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin) et la troléandomycine (n'est plus disponible aux États-Unis) ; certains antifongiques dont le clotrimazole (Mycelex), le fluconazole (Diflucan), l'itraconazole (Sporanox), le kétoconazole (Nizoral), le posaconazole (Noxafil) et le voriconazole (Vfend); aprépitant (Emend); bosentan (Tracler); certains inhibiteurs calciques, dont le diltiazem (Cardizem, Tiazac, autres) et le vérapamil (Calan, Verelan, autres); cobicistat (Tybost); le conivaptan (Vaprisol); crizotinib (Xalkori); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); digoxine (Lanoxine); dronédarone (Multaq); l'enzalutamide (Xtandi); fexofénadine (Allegra); la fluvoxamine (Luvox); idélalisib (Zydelig); imatinib (Gleevec); certains médicaments contre l'hépatite C, notamment le bocéprévir (n'est plus disponible aux États-Unis, Victrelis), le dasabuvir (dans Viekira Pak), l'ombitasvir (dans Technivie, dans Viekira XR) et le paritaprévir (dans Technivie, dans Viekira XR) ; certains médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) dont l'éfavirenz (Sustiva, dans Atripla), l'elvitégravir (dans Genvoya, dans Stribild), l'étravirine (Intelence), l'indinavir (Crixivan), le lopinavir (dans Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, à Kaletra), saquinavir (Invirase) et tipranavir (Aptivus); mitotane (Lysodren); modafinil (Provigil); néfazodone; les inhibiteurs de la pompe à protons tels que l'ésoméprazole (Nexium), le lansoprazole (Prevacid), l'oméprazole (Prilosec), le pantoprazole (Protonix) et le rabéprazole (AcipHex); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifater); et certains médicaments contre les convulsions, notamment la carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Tegretol) et la phénytoïne (Dilantin, Phenytek). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le nératinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le nératinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le nératinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

- si vous prenez un antiacide, prenez-le au moins 3 heures avant ou 3 heures après la prise de nératinib.

- si vous prenez du nératinib et un médicament contre l'indigestion, les brûlures d'estomac ou les ulcères (un H_2antagoniste) tels que la cimétidine, la famotidine (Pepcid, dans Duexis), la nizatidine (Axid) ou la ranitidine (Zantac), prenez le nératinib au moins 2 heures avant ou au moins 10 heures après la prise du H_2bloqueur.

- dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie.

- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou si vous envisagez de concevoir un enfant. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant que vous prenez du nératinib. Si vous êtes une femme, vous devrez passer un test de grossesse avant de commencer le traitement et utiliser une méthode contraceptive pour prévenir une grossesse pendant votre traitement par le nératinib et pendant au moins 1 mois après la prise de la dernière dose. Si vous êtes un homme, vous et votre partenaire féminine devez utiliser un moyen de contraception pendant votre traitement par le nératinib et continuer pendant 3 mois après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez utiliser pendant votre traitement. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du nératinib, appelez immédiatement votre médecin. Le nératinib peut nuire au fœtus.

- informez votre médecin si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez du nératinib et jusqu'à 1 mois après votre dernière dose.

- vous devez savoir que le nératinib provoque souvent des diarrhées, qui peuvent être graves. Votre médecin vous dira probablement de prendre du lopéramide (Imodium AD), un médicament antidiarrhéique, pour prévenir la déshydratation (perte d'une trop grande quantité d'eau de votre corps) pendant les 56 premiers jours de votre traitement par le nératinib. Après 56 jours de traitement, votre médecin ajustera votre dose de lopéramide afin que vous ayez 1 à 2 selles par jour pendant que vous prenez du nératinib. Votre médecin peut également vous dire de boire beaucoup de liquides, de modifier votre régime alimentaire ou de prendre d'autres médicaments pour contrôler la diarrhée. Appelez immédiatement votre médecin si vous avez une diarrhée sévère (plus de 2 selles en 1 jour ou une diarrhée qui ne s'arrête pas) ou une diarrhée

accompagnés de faiblesse, d'étourdissements ou de fièvre pendant la prise de nératinib. Appelez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des symptômes de déshydratation suivants : soif extrême, sécheresse de la bouche et/ou de la peau, diminution de la miction ou rythme cardiaque rapide.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le nératinib peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- diarrhée
- Douleur d'estomac
- brûlures d'estomac
- ballonnement
- ulcères de la bouche
- perte d'appétit
- perte de poids
- saignements de nez
- problèmes ou changements d'ongles
- spasmes musculaires

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous présentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés dans la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin :

- yeux et peau jaunes
- urine foncée
- douleur ou inconfort dans la partie supérieure droite de l'estomac
- fatigue
- nausée
- vomissement
- éruption
- fièvre, difficulté à uriner, douleur en urinant et autres signes d'infection

Le nératinib peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- diarrhée
- nausée
- vomissement
- Douleur d'estomac

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps au nératinib.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Nerlynx®

Dernière révision - 15/05/2020

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022