

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html>

נטופיטנט ופאלונוסטרוון מבוטא כ (pal" oh noe' se tron) (net ue' pi tant)

היי האם נרשמה תרופה זו?

השילוב של netupitant ו-palonosetron משמש למניעת בחילות והקאות הנגרמות על ידי כימותרפיה בסרטן. Netupitant הוא בקבוצה של תרופות הנקראות נוירוקינין (NK1) אנטגוניסטים. זה פועל על ידי חסימת נוירוקינין, חומר טבעי במוח הגורם לבחילות והקאות. Palonosetron הוא בקבוצת תרופות הנקראות HT-5 אנטגוניסטים לקולטן. זה פועל על ידי חסימת סרטונין, חומר טבעי בגוף הגורם לבחילות והקאות.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

השילוב של netupitant ו-palonosetron מגיע כקפסולה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל כשעה לפני תחילת הכימותרפיה עם או בלי אוכל. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח netupitant ו-palonosetron בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת נטופיטנט ופאלונוסטרוון,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי ל-netupitant ו(-Zofran, Zuplenz) Ondansetron, Sancuso, granisetron) Anzemet, dolasetron) Lotronex, alosetron, palonosetron, alosetron) . בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל. הקפד להזכיר כל אחד מהבאים: בנזודיאזפינים כולל אלפרזולם (קסנקס), מיידאזולם וטריאזולם (האלציון); תרופות כימותרפיות מסוימות כגון vinorelbine
Taxol, vincristine, and (paclitaxel) Camptosar, irinotecan) Gleevec, imatinib) Ifex, ifosfamide) side, Dקסמתזון; אריתרומיצין (EES, Ery-tab, אחרים);
(fentanyl) Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys; (ניזורל); ליתיום
(Lithobid); תרופות לטיפול במיגרנות כגון אלמוטריפטן (אקסרט), אלטריפטן (רלפקס), פרובאטריפטן (פרובה), נרטריפטן (אמרג'), ריזאטריפטן (מקסלט),

(זומיג); מתילן כחול; מירטזפין (רמרון); מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) כולל (Marplan) isocarboxazid, לינזוליד (Zyvox), (Eldepryl, Emsam, Zelapar) (selegiline) Nardil, (iphenelzine) Parnate, (tranylcypromine); פנוברביטל; rifampin (Rifadin, Rimactane), בריפאטר, בריפאמט); מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין סלקטיביים (SSRIs) כגון (Brisdelle, Paxil, Pexeva) (paroxetine) Luvox, (fluvoxamine) Symbyax, וטרמדול (Lexapro, fluoxetine) Prozac, (escitalopram) Celexa, (sertraline-icitalopram) Sarafem, in (Ultracet, Conzip, Ultram). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.

- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת כבד או כליות.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת נטופיטנט ופאלונוסטרון, התקשר לרופא שלך.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

יש ליטול Netupitant ו-palonosetron רק לפני כימותרפיה לפי הנחיות הרופא. אין לקחת את זה על בסיס קבוע.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלולים לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Netupitant 1-palonosetron

- כאב ראש
- כאב בטן
- צרבת
- עצירות
- חולשה
- אדמומיות של העור

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד או פנה לטיפול רפואי חירום:

- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- קוצר נשימה
- סחרחורת, סחרחורת והתעלפות
- דופק מהיר, איטי או לא סדיר
- תסיסה

- הזיות (לראות דברים או לשמוע קולות שאינם קיימים)

- חום

- שטיפה

- הזעה מוגברת

- בלבול

- בחילות, הקאות ושלשולים

- אובדן קואורדינציה

- שרירים נוקשים או מתעוותים

- התקפים

- תרדמת (אובדן הכרה)

עלולים לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה

Netupitant 1-palonosetron

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מאור, עודף חום ולחות (לא בחדר האמבטיה). לזרוק כל תרופה מיושנת או שאינה נחוצה עוד. שוחח עם הרוקח שלך לגבי סילוק נכון של התרופות שלך.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. [<http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

• אקינזאון®

מתוקן לאחרונה - 15/06/2016

[למד כיצד לצטט דף זה](#)

[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022