

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Netupitant și Palonosetron

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html>

Netupitant și Palonosetron

pronunțat ca (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

de ce este prescris acest medicament?

Combinatia de netupitant și palonosetron este utilizată pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapia cancerului. Netupitant face parte dintr-o clasă de medicamente numite antagoniști ai neurokininei (NK1). Acționează prin blocarea neurokininei, o substanță naturală din creier care provoacă greață și vărsături. Palonosetronul face parte dintr-o clasă de medicamente numită 5-HT₃antagoniști ai receptorilor. Acționează prin blocarea serotoninei, o substanță naturală din organism care provoacă greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Combinatia de netupitant și palonosetron vine ca o capsulă de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu aproximativ 1 oră înainte de începerea chimioterapiei cu sau fără alimente. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați netupitant și palonosetron exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua netupitant și palonosetron,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la netupitant și palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplenz), orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din capsulele de netupitant și palonosetron. . Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: benzodiazepine, inclusiv alprazolam (Xanax), midazolam și triazolam (Halcion); anumite medicamente pentru chimioterapie, cum ar fi ciclofosamidă (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, Taxotere), etoposidă, ifosfamidă (Ifex), imatinib (Gleevec), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), vinblastină, vincristină și vinorelbina (Navelbine); dexametazonă; eritromicină (EES, Ery-tab, altele); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); ketoconazol (Nizoral); litiu (Lithobid); medicamente pentru tratarea migrenelor, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt),

(Zomig); albastru de metil; mirtazapină (Remeron); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) incluzând izocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate); fenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifater, în Rifamate); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); și tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați netupitant și palonosetron, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Netupitant și palonosetron trebuie luate numai înainte de chimioterapie, conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră. Nu ar trebui să fie luate în mod regulat.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Netupitantul și palonosetronul pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispăre:

- durere de cap
- dureri de stomac
- arsuri la stomac
- constipație
- slăbiciune
- roșeață a pielii

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau solicitați tratament medical de urgență:

- urticarie
- eczemă
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- dificultăți de respirație
- amețeli, amețeli și leșin
- bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii
- agitație

- halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)
- febră
- înroșirea
- transpirație excesivă
- confuzie
- greață, vărsături și diaree
- pierderea coordonării
- mușchii înțepeni sau tremurători
- convulsii
- coma (pierderea cunoștinței)

Netupitantul și palonosetronul pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știi despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Aruncați orice medicament care este învechit sau nu mai este necesar. Discutați cu farmacistul despre eliminarea corectă a medicamentelor dumneavoastră.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ce alte informații ar trebui să știi?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Akynzeo®

Ultima revizuire - 15.06.2016

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022