

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Нетупитант и палоносетрон

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html>

## Нетупитант и палоносетрон

произносится как (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

### зачем назначают это лекарство?

Комбинация нетупитанта и палоносетрона используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией рака. Нетупитант относится к классу препаратов, называемых антагонистами нейрокинина (NK1). Он работает, блокируя нейрокинин, естественное вещество в мозгу, которое вызывает тошноту и рвоту. Палоносетрон относится к классу лекарств, называемых 5-HT<sub>3</sub>-антагонистами рецепторов. Он работает, блокируя серотонин, естественное вещество в организме, которое вызывает тошноту и рвоту.

### Как следует использовать это лекарство?

Комбинация нетупитанта и палоносетрона выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают примерно за 1 час до начала химиотерапии независимо от приема пищи. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте нетупитант и палоносетрон. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

### использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

### Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

#### Прежде чем принимать нетупитант и палоносетрон,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на нетупитант и палоносетрон, алосетрон (лотронекс), доласетрон (анземет), гранисетрон (санкузо), ондансетрон (зофран, зупленц), любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в капсулах нетупитанта и палоносетрона. . Попросите у фармацевта список ингредиентов.
- сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете. Обязательно упомяните любое из следующего: бензодиазепины, включая алпразолам (ксанакс), мидазолам и триазолам (хальцион); некоторые химиотерапевтические препараты, такие как циклофосфамид (Цитоксан), доцетаксел (Доцефрез, Таксотер), этопозид, ифосфамид (Ифекс), иматиниб (Гливек), иринотекан (Камптозар), паклитаксел (Таксол), винбластин, винкристин и винорелбин (Навельбин); дексаметазон; эритромицин (ЭЭС, Эри-таб, др.); фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); кетоконазол (Низорал); литий (литобид); лекарства для лечения мигрени, такие как алмотриптан (аксерт), элетриптан (релпакс), фроватриптан (фрова), наратриптан (амэрдж), ризатриптан (максалт),

(Зомиг); метиленовый синий; мirtазапин (Ремерон); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая изокарбоксазид (Марплан), линезолид (Зивокс), фенелзин (Нардил), селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат); фенобарбитал; рифампин (Рифадин, Римактан, Рифатер, Рифамат); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyx), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); и трамадол (Конзип, Ультрам, в Ультрацете). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

- Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени или почек.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при приеме нетупитанта и палоносетрона, позвоните своему врачу.

### **какие специальные диетические указания я должен соблюдать?**

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

### **Что мне делать, если я забыл принять дозу?**

Нетупитант и палоносетрон следует принимать только перед химиотерапией в соответствии с указаниями врача. Его не следует принимать на регулярной основе.

### **Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?**

Нетупитант и палоносетрон могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- Головная боль
- боль в животе
- изжога
- запор
- слабость
- покраснение кожи

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

- крапивница
- сыпь
- зуд
- затрудненное дыхание или глотание
- сбивчивое дыхание
- головокружение, дурнота и обмороки
- быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение
- волнение

- галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)
- жар
- смывание
- чрезмерное потоотделение
- путаница
- тошнота, рвота и диарея
- потеря координации
- жесткие или подергивания мышц
- припадки
- кома (потеря сознания)

Нетупитант и палонсетрон могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

## Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Выбросьте все лекарства, которые просрочены или больше не нужны. Поговорите со своим фармацевтом о надлежащей утилизации вашего лекарства.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

## ранд имена

- Акинзео®

Последняя редакция — 15.06.2016

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Инс. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

---

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.