

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html>

Netupitant و Palonosetron تنطق (pal' oh noe 'se tron) (net ue 'pi tant)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يتم استخدام مزيج من netupitant و palonosetron لمنع الغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي للسرطان. Netupitant ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات نيوروكينين (NK1). وهو يعمل عن طريق منع النوروكينين ، وهي مادة طبيعية في الدماغ تسبب الغثيان والقيء. Palonosetron في فئة من الأدوية تسمى 5-HT3 مضادات المستقبلات. وهو يعمل عن طريق منع مادة السيروتونين ، وهي مادة طبيعية في الجسم تسبب الغثيان والقيء.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي الجمع بين netupitant و palonosetron كبسولة لأخذها عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله قبل حوالي ساعة من بدء العلاج الكيميائي مع أو بدون طعام. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ netupitant و palonosetron تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل أخذ netupitant و palonosetron ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه netupitant (و Zuplenz ، Ondansetron) Zofran ، palonosetron ، alosetron) Lotronex (، dolasetron) Anzemet (، granisetron) Sancuso (، أي من المكونات الموجودة في كبسولات netupitant و palonosetron . اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: البنزوديازيبينات بما في ذلك ألبرازولام (زاناكس) ، وميدازولام ، وتريازولام (هالسيون) ؛ بعض أدوية العلاج الكيميائي مثل سيكلوفوسفاميد (سيتوكسان) ، ودوسيتاكسيل (دوكسفيريز ، تاكسوتيري) ، إيتوبوسيد ، إيفوسفاميد (إيفكس) ، إيماتينيب (جليفيك) ، إرينوتيكان (كامبتوسار) ، باكليتاكسيل (تاكسول) ، فينبلاستين ، فينيلريستين (فينبلاستين) ؛ ديكساميثازون. الإريثروميسين (Ery-tab ، EES ، وأدوية أخرى) ؛ الفنتانيل (أبسترال ، أكتيك ، دوريجسيك ، فينتورا ، لازاندا ، أونسوليس ، سوبسيس) ؛ الكيتوكونازول (نيزورال) الليثيوم (ليثويد) ؛ الأدوية لعلاج الصداع النصفي مثل ألموتريبتان (أكسيرت) وإليتربتان (ريلباكس) وفروفاتريبتان (فروفا) وناراتريبتان (أميرج) وريزاتريبتان (ماكسالت) ،

(زوميج) ؛ الميثيلين الأزرق ميرتازابين (ريميرون) ؛ مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAO) بما في ذلك إيزوكاربوكسازيد (ماريلان) ، لينزوليد (زيفوكس) ، فينيلزين (نارديل) ، سيليجيلين (الدبريل) ، إمسام ، زيلابار ، وترانيلسيبرومين (بارنات) ؛ الفينوباربيتال. ريفامبين (ريفادين) ، ريماكتان ، في ريفاتر ، في ريفامات) ؛ مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل سيتالوبرام (سيليكسا) ، إيسيتالوبرام (ليكسابرو) ، فلوكستين (بروزاك) ، سارافيم ، في سيميبيكس) ، فلوفوكسامين (لوفوكس) ، باروكستين (بريسديل ، باكسيل ، بيكسيفا) ، وسيرترالين (زولوفت) ؛ وترامادول (Ultram ، Conzip ، في Ultracet). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول netupitant و palonosetron ، فاتصل بطبيبك.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

يجب ألا يتم تناول Netupitant و palonosetron إلا قبل العلاج الكيميائي وفقاً لتعليمات الطبيب. لا ينبغي أن يؤخذ على أساس منتظم مجدول.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يتسبب Netupitant و palonosetron في آثار جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- صداع الرأس
- آلام في المعدة
- حرقنة من المعدة
- إمساك
- ضعف
- احمرار الجلد

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور أو اطلب العلاج الطبي الطارئ:

- قشعريرة
- متسرع
- متلهف، متشوق
- صعوبة في التنفس أو البلع
- ضيق في التنفس
- الدوخة والدوار والإغماء
- ضربات قلب سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة
- الإثارة

- الهلوسة(رؤية الأشياء أو سماع أصوات غير موجودة)
- حمى
- تدفق مائي - صرف
- التعرق المفرط
- ارتباك
- الغثيان والقيء والإسهال
- فقدان التنسيق
- تصلب العضلات أو ارتعاشها
- النوبات
- غيبوبة(فقدان الوعي)

قد يتسبب Netupitant و palonosetron في آثار جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الضوء والحرارة الزائدة والرطوبة (وليس في الحمام). تخلص من أي دواء قديم أو لم تعد هناك حاجة إليه. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك حول التخلص المناسب من أدويةك.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.
[http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org]

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

إبقاء جميع المواعيد مع الطبيب.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

• أكينزيو®

آخر مراجعة - 15/06/2016

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022