

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → Netupitant 和帕洛诺司琼

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html>

Netupitant 和帕洛诺司琼

发音为 (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

为什么要开这种药?

netupitant 和帕洛诺司琼的组合用于预防癌症化疗引起的恶心和呕吐。Netupitant 属于一类称为神经激肽 (NK1) 拮抗剂的药物。它通过阻断神经激肽起作用, 神经激肽是大脑中引起恶心和呕吐的一种天然物质。帕洛诺司琼属于一类称为 5-HT₃ 受体拮抗剂。它通过阻断血清素起作用, 血清素是一种在体内引起恶心和呕吐的天然物质。

这个药应该怎么用?

netupitant 和帕洛诺司琼的组合以胶囊形式口服。通常在化疗开始前约 1 小时服用或不服用食物。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用 netupitant 和帕洛诺司琼。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途; 向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用 netupitant 和帕洛诺司琼之前,

- 如果您对 netupitant 和 palonosetron、alosetron (Lotronex)、dolasetron (Anzemet)、granisetron (Sancuso)、ondansetron (Zofran, Zuplenz)、任何其他药物或 netupitant 和 palonosetron 胶囊中的任何成分过敏, 请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项: 苯二氮卓类药物, 包括阿普唑仑 (Xanax)、咪达唑仑和三唑仑 (Halcion); 某些化疗药物, 例如环磷酰胺 (Cytoxan)、多西紫杉醇 (Docefrez, Taxotere)、依托泊苷、异环磷酰胺 (Ifex)、伊马替尼 (格列卫)、伊立替康 (Camptosar)、紫杉醇 (Taxol)、长春碱、长春新碱和长春瑞滨 (Navelbine); 地塞米松; 红霉素 (EES, Ery-tab, 其他); 芬太尼 (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); 酮康唑 (Nizoral); 锂 (Lithobid); 治疗偏头痛的药物, 如阿莫曲坦 (Axert)、依立曲坦 (Relpax)、弗罗曲坦 (Frova)、那拉曲坦 (Amerge)、利扎曲坦 (Maxalt)、

(佐米格)；亚甲蓝；米氮平（雷默龙）；单胺氧化酶 (MAO) 抑制剂，包括异卡波肼 (Marplan)、利奈唑胺 (Zyvox)、苯乙肼 (Nardil)、司来吉兰 (Eldepryl、Emsam、Zelapar) 和反苯环丙胺 (Parnate)；苯巴比妥；利福平 (Rifadin, Rimactane, 在 Rifater, 在 Rifamate)；选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)，例如西酞普兰 (Celexa)、依他普仑 (Lexapro)、氟西汀 (Prozac、Sarafem、Symbyax)、氟伏沙明 (Luvox)、帕罗西汀 (Brisdelle、Paxil、Pexeva) 和舍曲林 (Zoloft)；和曲马多 (Conzip, Ultram, 在 Ultracet 中)。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。

- 如果您患有或曾经患有肝脏或肾脏疾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用 netupitant 和帕洛诺司琼时怀孕，请致电您的医生。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

Netupitant 和帕洛诺司琼只能按照医生的指示在化疗前服用。它不应该定期进行。

这种药物会引起副作用吗？

Netupitant 和帕洛诺司琼可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头痛
- 肚子痛
- 胃灼热
- 便秘
- 弱点
- 皮肤发红

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或寻求紧急医疗：

- 麻疹
- 皮疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 气促
- 头晕、头昏和昏厥
- 心跳快、慢或不规则
- 搅动

- 幻觉（看到不存在的事物或听到不存在的声音）
- 发烧
- 冲洗
- 出汗过多
- 困惑
- 恶心、呕吐和腹泻
- 失去协调
- 肌肉僵硬或抽搐
- 癫痫发作
- 昏迷（意识丧失）

Netupitant 和帕洛诺司琼可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离光线、过热和潮湿（不要放在浴室里）。扔掉任何过期或不再需要的药物。与您的药剂师讨论如何正确处置您的药物。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

我应该知道其他信息吗？

与您的医生保持所有约会。

不要让其他人服用您的药物。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 阿肯佐®

最后修订 - 2016 年 6 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日