Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608002.html

Nilotinib

ออกเสียงว่า (nye loe 'ti nib)

คำเตือนที่สำคัญ:

Nilotinib อาจทำให้ QT ยืดออก (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติที่อาจนำไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (ภาวะที่สืบทอดมาซึ่งบุคคลมีแนวโน้มที่จะมี QT ยืดออก) หรือคุณมีหรือเคยมีโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ , หัวใจเต้นผิดปกติ หรือโรคตับ บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกำลังใช้อะมิโอดาโรน (Nexterone, Pacerone); ยาต้านเชื้อราเช่น ketoconazole, itraconazole (Sporanox, Tolsura) หรือ voriconazole (Vfend); คลอโรควิน (Plaquenil); คลาริโทรมัยซิน; disopyramide (นอร์เพซ); อีริโทรมัยซิน (EES, Eryc, PCE); ยาบางชนิดสำหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) เช่น indinavir (Crixivan) nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ม็อกซิฟลอกซาซิน; เนฟาโซโดน; pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินิดีน (ใน Nuedexta); sotalol (Betapace, Betapace AF, อื่น ๆ); และไทโอริดาซีน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดรับประทานนิโลทินิบและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ เป็นลม; หมดสติ; หรืออาการชัก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม; หมดสติ; หรืออาการชัก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม; หมดสติ; หรืออาการชัก

ห้ามรับประทานอาหารใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับประทาน nilotinib และ 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยานี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจบางอย่าง เช่น การตรวจเลือดและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKGs การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) ก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับคุณที่จะใช้นิโลทินิบ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยานิโลตินิบและทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้นิโลตินิบ

hy เป็นยานี้กำหนด?

Nilotinib ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เรื้อรังบางชนิด (CML; มะเร็งชนิดหนึ่งในเซลล์เม็ดเลือดขาว) ซึ่งเพิ่งพบว่ามีภาวะนี้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังใช้เพื่อรักษา CML บางชนิดในผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาโรคได้ด้วย imatinib (Gleevec) หรือผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรับประทาน imatinib ได้เนื่องจากผลข้างเคียง Nilotinib ยังใช้ในการรักษา CML บางประเภทในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปซึ่งโรคไม่สามารถรักษาได้สำเร็จด้วยการบำบัดด้วยสารยับยั้งไทโรซีนไคเนสอื่น ๆ หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้ยาเหล่านี้ได้เนื่องจากผลข้างเคียง Nilotinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทำงานโดยการปิดกั้นการทำงานของโปรตีนผิดปกติที่ส่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งจะช่วยหยุดหรือชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Nilotinib มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานโดยไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ควรรับประทาน Nilotinib ในขณะท้องว่าง อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารใดๆ ทานนิโลตินิบในเวลาเดียวกันทุกวัน พยายามเว้นระยะห่างระหว่างปริมาณของคุณประมาณ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ nilotinib ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยน้ำหนึ่งแก้ว อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนทั้งแคปซูลได้ ให้ผสมเนื้อหาของแคปซูลในซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนชา กลืนส่วนผสมทันที (ภายใน 15 นาที) ห้ามเก็บส่วนผสมไว้ใช้ในอนาคต

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยานิโลทินิบหรือหยุดการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ายานั้นใช้ได้ผลกับคุณดีเพียงใด และหากคุณพบผลข้างเคียงใดๆ ทานนิโลตินิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานนิโลตินิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนิโลตินิบ

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยานิโลตินิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลนิโลตินิบ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใช่ใบสั่งยา อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและสิ่งต่อไปนี้: ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) รวมถึง atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), fluvastatin (Lescol XL), lovastatin (Altoprev) และ simvastatin (Flolipid , Zocor ใน Vytorin); สารยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) และ rabeprazole (AcipHex); และไรแฟมพิน (Rifadin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ

ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจมีปฏิกิริยากับยานิโลตินิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

- หากคุณกำลังทานยาลดกรดที่มีแมกนีเซียม อะลูมิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) หรือซิเมทิโคน ให้ทานยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลังจากทานนิโลทินิบ
- หากคุณกำลังใช้ยาสำหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล เช่น ซิเมทิดีน (Tagamet), ฟาโมทิดีน (Pepcid, ใน Duexis), นิซาทิดีน (Axid) หรือรานิทิดีน (แซนแทค) ให้รับประทานอย่างน้อย 10 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ชั่วโมงหลังจากที่คุณทานนิโลตินิบ
- บอกแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือการผ่าตัดเพื่อเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมด (การผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมด) นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาของคุณลดลง ปัญหาหัวใจ ปัญหาเลือดออก ปัญหาตับ ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม ต่อมที่ผลิตสารเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร) หรือ สภาวะใดๆ ที่ทำให้คุณย่อยแลคโตส (น้ำตาลนม) หรือน้ำตาลอื่นๆ ได้ยาก
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่ทานนิโลตินิบ คุณควรใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยานิโลตินิบและเป็นเวลา 14 วันหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่คุณสามารถใช้ระหว่างการรักษา หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานนิโลตินิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Nilotinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ทานนิโลตินิบและเป็นเวลา 14 วันหลังจากรับประทานครั้งสุดท้าย
- หากคุณกำลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยานิโลตินิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

อย่ากินส้มโอ ดื่มน้ำเกรพฟรุต หรือทานอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากเกรปฟรุตในขณะที่ทานยานี้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดำเนินการตามกำหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Nilotinib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ผื่น
- อาการคัน
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- ท้องผูก

- อิจฉาริษยา
- แก๊ส
- เบืออาหาร
- ปวดหัว
- อาการวิงเวียนศีรษะ
- เหน็ดเหนือยเมือยล้า
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- เหงือออกตอนกลางคืน
- ปวดกล้ามเนือ
- ปวดหลัง กระดูก ข้อ แขนขา หรือกล้ามเนือ
- ผมร่วง
- ผิวแห้งหรือแดง
- ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีมือหรือเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามทีระบุไว้ในส่วนคำเตือนทีสำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- เลือดออกหรือช้ำผิดปกติ
- เลือดในปัสสาวะ
- อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดำ
- ปวดหัวกะทันหัน สับสน หรือการมองเห็นเปลียนแปลง
- อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ
- เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย
- ปัญหาในการเดินหรือพูด
- ชา
- สีผิวขาเปลียนไป
- ปวดหรือรู้สึกเย็นทีขา
- ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน
- มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชืออืนๆ
- ผิวสีซีด
- หายใจถี่
- น้ำหนักมากขึน, น้ำหนักเพิมขึน, อ้วนขึน
- อาการบวมทีมือ ข้อเท้า เท้า หรือใบหน้า
- ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา
- สีเหลืองของผิวหนังและดวงตา

- ปัสสาวะสีเข้ม
- ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ

Nilotinib อาจทำให้เด็กโตช้ากว่าปกติ แพทย์ของบุตรของท่านจะดูแลการเจริญเติบโตของบุตรของท่านอย่างระมัดระวังในขณะที่บุตรของท่านกำลังใช้นิโลตินิบ พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้ยานี้กับบุตรของท่าน

Nilotinib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
- อาเจียน
- อาการง่วงนอน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- ตาซิญญ่า®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2564

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022