

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

## נימודיפין מבוטא כ (nye moe' di peen)

### אזהרה חשובה:

כמוסות ונוזל Nimodipine יש ליטול דרך הפה. אם אתה מחוסר הכרה או לא מסוגל לבלוע, ייתכן שיינתן לך את התרופה דרך צינור האכלה הממוקם באף שלך או ישירות לתוך הבטן. אסור לתת נימודיפין לווריד (לווריד), מכיוון שהדבר עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות או מסכנות חיים או למוות.

### היי האם נרשמה תרופה זו?

נימודיפין משמש להפחתת נזק מוחי שעלול להיגרם על ידי דימום תת-עכבישי (דימום בחלל המקיף את המוח המתרחש כאשר כלי דם מוחלש במוח מתפוצץ). נימודיפין הוא בקבוצת תרופות הנקראות חוסמי תעלות סידן. זה פועל על ידי הרפיית כלי הדם במוח כדי לאפשר ליותר דם לזרום לאזורים פגועים.

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

נימודיפין מגיע ככמוסה ותמיסת פומית (נוזל) לנטילה דרך הפה או להינתן דרך צינור האכלה. זה נלקח בדרך כלל כל 4 שעות במשך 21 ימים ברציפות. יש להתחיל בטיפול בנימודיפין בהקדם האפשרי, לא יאוחר מ-96 שעות לאחר הופעת דימום תת-עכבישי. יש ליטול Nimodipine על קיבה ריקה, לפחות שעה אחת לפני הארוחה או שעתיים לאחר הארוחה. פעלו בקפידה על פי ההוראות על תווית המרשם שלכם, ובקשו מהרופא או הרוקח להסביר כל חלק שאינכם מבינים. קח nimodipine בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם מים.

חשוב לסיים את כל מהלך הטיפול עם נימודיפין. המשך ליטול נימודיפין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול נימודיפין מבלי לדבר עם הרופא שלך.

### השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים. שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

## יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

### לפני נטילת נימודיפין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי ל-nimodipine, לכל תרופה אחרת, או לכל אחד מהמרכיבים בכמוסות נימודיפין או בתמיסת הפה. שאל את הרופא או הרוקח שלך עבור רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות: תרופות מסוימות נגד פטריות כולל איטראקונאזול (אונמל, ספורנוקס), קטוקונזול (ניזורל) וווריקונזול (Vfend); קלריתרמיצין (Biaxin); תרופות מסוימות ל-HIV כולל אינדינאביר (Crixivan), ritonavir, Viracept, nelfinavir (Norvir, Kaletra), ו-saquinavir (Invirase); nefazodone- (Ketek). הרופא שלך עשוי לומר לך לא לקחת נימודיפין.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, תוספי תזונה וויטמינים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: Emend (aprepitant); ארמודפיניל (Nuvigil); אלפרזולם (Niravam, Xanax); Tracleer (bosentan); Reyataz (atazanavir); Cordarone, Pacerone, Nexterone (miodarone); סימטידין (Tagamet); Vaprisol (conivaptan); ציקלוספורין (Gengraf, Neoral, Sandimmune); Cardizem, Dilacor, Tiazac (diltiazem); Rescriptor (delavirdine); שילוב (Synercid) (efavirenz); dalfopristin/quinupristin (סוסטיבה, באטריפלה); אריתרומיצין (Mycin-etravirine); (EES, E אינטליגנציה); פלוקונאזול (Diflucan); פלווקסטין (Prozac, Sarafem, Symbyax); איזוניאזיד (בריפאטר, בריפאמט); תרופות ליתר לחץ דם או מחלות לב כולל משתנים ('כדורי מים'): תרופות מסוימות עבור הפטיטיס כולל (Victrelis) (boceprevir ו- Incivek); תרופות מסוימות להתקפים כולל קרבמזפין (קרברטול, אקוטרול, טגרטול), פנוברביטל (לומינל) ופניטואין (דילנטין); מודפיניל (Provigil); נפצילין (Nallpen); אמצעי מניעה דרך הפה (גלולות למניעת הריון); מעכבי פוספודיאסטרז (PDE-5) כולל סילדנפיל (Revatio, Viagra) (Cialis); (tadalafil ו- Staxyn, Levitra) (vardenafil); פיוגליטזון (Actos, Actoplus Met, ב-Duetact, Oseni); פוסאקונאזול (נוקספיל); פרדניזון (ראיוס); rifampin (Rifadin, Rifater, Rimactane); בריפאמט; rufinamide (בנזל); חומצה ולפרואית (Depakene); (Calan, Covera, Tarka, Verelan); (verpamil ו- ומוראפניב (זלבורף). תרופות רבות אחרות עשויות גם לקיים אינטראקציה עם nimodipine, אז הקפד לספר לרופא שלך על כל התרופות שאתה נוטל גם אם הן לא מופיעות ברשימה זו. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בזהירות רבה יותר עבור תופעות לוואי.

• ספר לרופא שלך אילו מוצרים צמחיים אתה נוטל, במיוחד אכילצאה וסנט ג'ון וורט.

• ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת כבד.

• ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת נימודיפין, התקשר לרופא שלך.

## האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אל תשתה מיץ אשכוליות או תאכל אשכוליות בזמן שאתה נוטל נימודיפין.

## כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

## נימודיפין עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- כאב ראש
- שלשול
- בחילה
- כאב שרירים
- פריחה

## תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- סתְרְחורת
- סתרחורת
- דופק איטי או מהיר
- נפיחות של הידיים, הידיים, הרגליים או הרגליים

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מאור ומעודף חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.

<http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>].

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>] אם הקורבן התמוטט,

סבל מהתקף, מתקשה לנשום או שלא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך. הרופא שלך יעקוב אחר לחץ הדם שלך בזהירות במהלך הטיפול בנימודיפין.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

- נימוטופין®
- נימליז®

ף-מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

מתוקן לאחרונה - 15/11/2017

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022