



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → ニモジピン

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

ニモジピン

(nye moe'di peen) と発音します

重要な警告：

ニモジピンカプセルと液体は経口摂取する必要があります。意識がない、または飲み込めない場合は、鼻または直接胃に挿入された栄養チューブから薬を投与されることがあります。ニモジピンは、深刻なまたは生命を脅かす副作用または死を引き起こす可能性があるため、静脈内（静脈内）に投与しないでください。

なぜこの薬が処方されているのですか？

ニモジピンは、くも膜下出血（脳内の弱くなった血管が破裂したときに発生する脳周囲の空間での出血）によって引き起こされる可能性のある脳の損傷を軽減するために使用されます。ニモジピンは、カルシウムチャネル遮断薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。脳内の血管を弛緩させ、損傷した領域により多くの血液を流すことで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

ニモジピンはカプセルと経口液剤（液体）として提供され、経口摂取または栄養チューブから投与されます。通常、4時間ごとに21日間続けて服用します。ニモジピンによる治療は、くも膜下出血が発生してから96時間以内に、できるだけ早く開始する必要があります。ニモジピンは、少なくとも食事の1時間前または食事の2時間後に、空腹時に服用する必要があります。処方ラベルの指示に注意深く従って、医師または薬剤師に理解できない部分について説明するように依頼してください。指示通りにニモジピンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

カプセル全体を水で飲み込みます。

ニモジピンで治療の全過程を終えることが重要です。気分が良くてもニモジピンを服用し続けてください。医師に相談せずにニモジピンの服用を中止しないでください。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ニモジピンを服用する前に、

- ニモジピン、その他の薬、またはニモジピンカプセルや経口液剤の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、医師または薬剤師にご相談ください。
- 次の薬のいずれかを服用している場合は、医師または薬剤師に伝えてください。イトラコナゾール（Onmel、Sporanox）、ケトコナゾール（Nizoral）、ポリコナゾール（Vfend）などの特定の抗真菌薬。クラリスロマイシン（ビアクシン）；インジナビル（Crixivan）、ネルフィナビル（Viracept）、リトナビル（Norvir、カレトラ）、およびサキナビル（Invirase）を含むHIVの特定の薬剤。ネファゾドン；テリスロマイシン（Ketek）。あなたの医者はあなたにニモジピンを服用しないように言うかもしれません。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、栄養補助食品、およびビタミンを医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。アプレピタント（エメンド）。アルモダフィニル（ヌビジル）；アルプラゾラム（Niravam、Xanax）；アミオダロン（コルダロン、パセロン、ネクステロン）；アタザナビル（Reyataz）、ボセンタン（Tracleer）；シメチジン（タガメット）；コニバプタン（バブリソル）；シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；デラビルジン（記述子）；ジルチアゼム（Cardizem、Dilacor、Tiazac）；ダルホプリスチン/キヌプリスチンの組み合わせ（Synercid）；エファビレンツ（サスティバ、アトリブラ）；エリスロマイシン（EES、E-マイシン）；エトラビリン（インテリジェンス）；フルコナゾール（ジフルカン）；フルオキセチン（Prozac、Sarafem、Symbyax）；イソニアジド（リファタール、リファタール）；利尿薬（「ウォーターピル」）を含む高血圧または心臓病の薬：ボセプレビル（Vitreleis）およびテラプレビル（Incivek）を含む肝炎のための特定の薬；カルバマゼピン（カルバマゼピン、エクエトロ、テグレート）、フェノバルビタール（ルミナル）、およびフェニトイン（ディランチン）を含む発作のための特定の薬；モダフィニル（Provigil）；ナフシリン（ナルペン）；経口避妊薬（避妊薬）；シルデナフィル（Revatio、Viagra）、タダラフィル（Cialis）、およびバルデナフィル（Levitra、Staxyn）を含むホスホジエステラーゼ（PDE-5）阻害剤。ピオグリタゾン（Actos、Actoplus Met、Duetact、Oseni）；ボサコナゾール（ノキサフィル）；プレドニゾン（レイオス）；リファンピン（リファタール、リファタール、リマクタン、リファメート）；ルフィナミド（バンゼル）；バルプロ酸（デパケン）；ベラパミル（Calan、Covera、Tarka、Verelan）；ベムラフェニブ（ゼルブラフ）。他の多くの薬もニモジピンと相互作用する可能性があります、したがって、このリストに表示されていない場合でも、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたをより注意深く監視する必要があるかもしれません。
- あなたが服用しているハーブ製品、特にエキナセアとセントジョンズワートを医師に伝えてください。
- あなたが肝疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ニモジピンを服用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

ニモジピンを服用している間は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりしないでください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ニモジピンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 頭痛
- 下痢
- 吐き気
- 筋肉痛
- 発疹

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- めまい
- 立ちくらみ
- 遅いまたは速いハートビート
- 腕、手、足、または脚の腫れ

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、光や過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた場合、

発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。ニモジピンによる治療中は、医師が血圧を注意深く監視します。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ニモジピン®[¶]
- ニモジピン®

[¶]-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2017年11月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日