

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Nimodipină

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

Nimodipină

pronunțat ca (nye moe' di peen)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Capsulele și lichidul de nimodipină trebuie administrate pe cale orală. Dacă sunteți inconștient sau nu puteți înghiți, este posibil să vi se administreze medicamentul printr-un tub de hrănire care este plasat în nas sau direct în stomac. Nimodipina nu trebuie administrată niciodată intravenos (în venă), deoarece aceasta poate provoca reacții adverse grave sau care pun viața în pericol sau deces.

de ce este prescris acest medicament?

Nimodipina este utilizată pentru a reduce leziunile cerebrale care pot fi cauzate de o hemoragie subarahnoidiană (sângerare în spațiul din jurul creierului care apare atunci când un vas de sânge slăbit din creier se sparge). Nimodipina face parte dintr-o clasă de medicamente numite blocante ale canalelor de calciu. Funcționează prin relaxarea vaselor de sânge din creier pentru a permite mai mult sânge să curgă în zonele deteriorate.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Nimodipina se prezintă sub formă de capsulă și soluție orală (lichid) pentru a se administra pe cale orală sau a fi administrată printr-un tub de hrănire. De obicei, se ia la fiecare 4 ore timp de 21 de zile la rând. Tratamentul cu nimodipină trebuie început cât mai curând posibil, nu mai târziu de 96 de ore după ce apare o hemoragie subarahnoidiană. Nimodipina trebuie luată pe stomacul gol, cu cel puțin 1 oră înainte de masă sau 2 ore după masă. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați nimodipină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi cu apă.

Este important să vă terminați întregul curs de tratament cu nimodipină. Continuați să luați nimodipină chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați nimodipină fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua nimodipină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la nimodipină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din capsulele de nimodipină sau soluția orală. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: anumite medicamente antifungice, inclusiv itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral) și voriconazol (Vfend); claritromicină (Biaxin); anumite medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); nefazodonă; și telitromicină (Ketek). Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați nimodipină.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, suplimente nutritive și vitamine pe care intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: aprepitant (Emend); armodafinil (Nuvigil); alprazolam (Niravam, Xanax); amiodarona (Cordarone, Pacerone, Nexterone); atazanavir (Reyataz), bosentan (Tracleer); cimetidină (Tagamet); conivaptan (Vaprisol); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); delavirdină (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); combinație dalfopristin/quinupristin (Synercid); efavirenz (Sustiva, în Atripla); eritromicină (EES, E-Mycin); etravirina (Intelgenta); fluconazol (Diflucan); fluoxetină (Prozac, Sarafem, în Symbyax); izoniazidă (în Rifater, în Rifamate); medicamente pentru hipertensiune arterială sau boli de inimă, inclusiv diuretice („pastile de apă”); anumite medicamente pentru hepatită, inclusiv boceprevir (Victrelis) și telaprevir (Incivek); anumite medicamente pentru convulsii, inclusiv carbamazepină (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenobarbital (Luminal) și fenitoină (Dilantin); modafinil (Provigil); nafcilină (Nallpen); contraceptive orale (pilule contraceptive); inhibitori ai fosfodiesterazei (PDE-5), inclusiv sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) și vardenafil (Levitra, Staxyn); pioglitazonă (Actos, în Actoplus Met, în Duetact, în Oseni); posaconazol (Noxafil); prednison (Rayos); rifampin (Rifadin, Rifater, Rimactane, în Rifamate); rufinamidă (Banzel); acid valproic (Depakene); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); și vemurafenib (Zelburaf). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu nimodipina, deci asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar dacă acestea nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu mai multă atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special echinacea și sunătoare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați nimodipină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Nu beți suc de grepfrut și nu mâncați grapefruit în timp ce luați nimodipină.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Nimodipina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispăre:

- durere de cap
- diaree
- greață
- dureri musculare
- eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

- amețeală
- amețeli
- bătăi lente sau rapide ale inimii
- umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor sau picioarelor

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de lumină și exces de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit,

a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție tensiunea arterială în timpul tratamentului cu nimodipină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Nimotop®¶
- Nymalize®

¶-Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.11.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022