



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Nimodipina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

nimodipina

pronunciado como (nye moe' di peen)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Las cápsulas de nimodipina y el líquido deben tomarse por vía oral. Si está inconsciente o no puede tragar, se le puede administrar el medicamento a través de una sonda de alimentación que se coloca en la nariz o directamente en el estómago. La nimodipina nunca debe administrarse por vía intravenosa (en una vena), ya que esto puede causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales o la muerte.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La nimodipina se usa para disminuir el daño cerebral que puede ser causado por una hemorragia subaracnoidea (sangrado en el espacio que rodea el cerebro que ocurre cuando revienta un vaso sanguíneo debilitado en el cerebro). La nimodipina pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores de los canales de calcio. Actúa relajando los vasos sanguíneos del cerebro para permitir que fluya más sangre a las áreas dañadas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación de la nimodipina es en cápsulas y en solución oral (líquido) para tomar por vía oral o administrar a través de una sonda de alimentación. Por lo general, se toma cada 4 horas durante 21 días seguidos. El tratamiento con nimodipino debe iniciarse lo antes posible, a más tardar 96 horas después de que ocurra una hemorragia subaracnoidea. La nimodipina se debe tomar con el estómago vacío, al menos 1 hora antes de una comida o 2 horas después de una comida. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la nimodipina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las cápsulas enteras con agua.

Es importante terminar todo el ciclo de tratamiento con nimodipina. Continúe tomando nimodipina incluso si se siente bien. No deje de tomar nimodipina sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar nimodipino,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la nimodipina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las cápsulas o la solución oral de nimodipina. Pídale a su médico o farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: ciertos medicamentos antimicóticos, incluidos itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral) y voriconazol (Vfend); claritromicina (Biaxin); ciertos medicamentos para el VIH, incluidos indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); nefazodona; y telitromicina (Ketek). Su médico puede indicarle que no tome nimodipino.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, suplementos nutricionales y vitaminas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: aprepitant (Emend); armodafinilo (Nuvigil); alprazolam (Niravam, Xanax); amiodarona (Cordarone, Pacerone, Nexterone); atazanavir (Reyataz), bosentán (Tracleer); cimetidina (Tagamet); conivaptán (Vaprisol); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); delavirdina (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); combinación de dalfopristina/quinupristina (Synercid); efavirenz (Sustiva, en Atripla); eritromicina (EES, E-Mycin); etravirina (Intelence); fluconazol (Diflucan); fluoxetina (Prozac, Sarafem, en Symbiyax); isoniazida (en Rifater, en Rifamate); medicamentos para la presión arterial alta o enfermedades del corazón, incluidos los diuréticos ("píldoras de agua"); ciertos medicamentos para la hepatitis, incluidos boceprevir (Victrelis) y telaprevir (Incivek); ciertos medicamentos para las convulsiones, como carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenobarbital (Luminal) y fenitoína (Dilantin); modafinilo (Provigil); nafcilina (Nallpen); anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas); inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE-5), incluidos sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) y vardenafil (Levitra, Staxyn); pioglitazona (Actos, en Actoplus Met, en Duetact, en Oseni); posaconazol (Noxafil); prednisona (Rayos); rifampicina (Rifadin, Rifater, Rimactane, en Rifamate); rufinamida (Banzel); ácido valproico (Depakene); verapamilo (Calan, Covera, Tarka, Verelan); y vemurafenib (Zelburaf). Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la nimodipina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso si no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo más de cerca para detectar efectos secundarios.
- dígame a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente equinácea y hierba de San Juan.
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del hígado.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma nimodipina, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

No beba jugo de toronja ni coma toronja mientras esté tomando nimodipina.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La nimodipina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de cabeza
- Diarrea
- náuseas
- dolor muscular
- erupción

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- mareo
- aturdimiento
- latido del corazón lento o rápido
- hinchazón de los brazos, manos, pies o piernas

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se ha derrumbado,

tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame de inmediato a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor. Su médico controlará cuidadosamente su presión arterial durante su tratamiento con nimodipino.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Nimotop®¶
- Nymalizer®

¶-Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 15/11/2017

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022