

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Nimodipin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

Nimodipin

uttalas som (nye moe' di peen)

VIKTIG VARNING:

Nimodipin kapslar och vätska ska tas genom munnen. Om du är medvetlös eller oförmögen att svälja kan du få medicinen genom en sond som placeras i näsan eller direkt i magen. Nimodipin ska aldrig ges intravenöst (i en ven), eftersom detta kan orsaka allvarliga eller livshotande biverkningar eller dödsfall.

hur är denna medicin utskriven?

Nimodipin används för att minska hjärnskador som kan orsakas av en subaraknoidal blödning (blödning i utrymmet som omger hjärnan som uppstår när ett försvagat blodkärl i hjärnan spricker). Nimodipin är i en klass av läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Det fungerar genom att slappna av blodkärlen i hjärnan så att mer blod kan flöda till skadade områden.

hur ska detta läkemedel användas?

Nimodipin kommer som en kapsel och en oral lösning (vätska) att ta genom munnen eller ges genom en sond. Det tas vanligtvis var fjärde timme i 21 dagar i rad. Behandling med nimodipin bör påbörjas så snart som möjligt, senast 96 timmar efter att en subaraknoidal blödning inträffat. Nimodipin ska tas på fastande mage, minst 1 timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta nimodipin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna hela med vatten.

Det är viktigt att avsluta hela behandlingen med nimodipin. Fortsätt att ta nimodipin även om du mår bra. Sluta inte ta nimodipin utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Detta läkemedel kan ordinerar för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar nimodipin,

- Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot nimodipin, andra läkemedel eller något av innehållsämnen i nimodipin kapslar eller oral lösning. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar någon av följande mediciner: vissa svampdödande läkemedel inklusive itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och vorikonazol (Vfend); klaritromycin (Biaxin); vissa mediciner för HIV inklusive indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra) och saquinavir (Invirase); nefazodon; och telitromycin (Ketek). Din läkare kan säga åt dig att inte ta nimodipin.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, kosttillskott och vitaminer du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: aprepitant (Emend); armodafinil (Nuvigil); alprazolam (Niravam, Xanax); amiodaron (Cordarone, Pacerone, Nexterone); atazanavir (Reyataz), bosentan (Tracleer); cimetidin (Tagamet); konivaptan (Vaprisol); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); delavirdin (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); kombination av dalfopristin/quinupristin (Synercid); efavirenz (Sustiva, i Atripla); erytromycin (EES, E-Mycin); etravirin (Intelens); flukonazol (Diflucan); fluoxetin (Prozac, Sarafem, i Symbyax); isoniazid (i Rifater, i Rifamate); mediciner för högt blodtryck eller hjärtsjukdomar inklusive diuretika ('vattenpiller'): vissa mediciner för hepatit inklusive boceprevir (Victrelis) och telaprevir (Incivek); vissa mediciner mot anfall inklusive karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenobarbital (Luminal) och fenytoin (Dilantin); modafinil (Provigil); nafcillin (Nallpen); orala preventivmedel (p-piller); fosfodiesterashämmare (PDE-5) inklusive sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra, Staxyn); pioglitazon (Actos, i Actoplus Met, i Duetact, i Oseni); posakonazol (Noxafil); prednison (Rayos); rifampin (Rifadin, Rifater, Rimactane, i Rifamate); rufinamid (Banzel); valproinsyra (Depakene); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); och vemurafenib (Zelburaf). Många andra mediciner kan också interagera med nimodipin, så var noga med att berätta för din läkare om alla mediciner du tar även om de inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig mer noggrant för biverkningar.
- berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt Echinacea och johannesört.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar nimodipin, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Drick inte grapefruktjuice eller ät inte grapefrukt medan du tar nimodipin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Nimodipin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- huvudvärk
- diarre
- illamående
- träningsvärk
- utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- yrsel
- yrsel
- långsamt eller snabbt hjärtslag
- svullnad av armar, händer, fötter eller ben

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från ljus och överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat,

haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare. Din läkare kommer att övervaka ditt blodtryck noggrant under din behandling med nimodipin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Nimotop®¶
- Nymalisera®

¶-Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 2017-11-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022