

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Nimodipine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

Nimodipine

uitgesproken als (nye moe' di peen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Nimodipine-capsules en vloeistof moeten via de mond worden ingenomen. Als u bewusteloos bent of niet kunt slikken, kunt u de medicatie krijgen via een voedingssonde die in uw neus of rechtstreeks in uw maag wordt geplaatst. Nimodipine mag nooit intraveneus (in een ader) worden toegediend, omdat dit ernstige of levensbedreigende bijwerkingen of overlijden kan veroorzaken.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Nimodipine wordt gebruikt om hersenbeschadiging te verminderen die kan worden veroorzaakt door een subarachnoïdale bloeding (bloeding in de ruimte rond de hersenen die optreedt wanneer een verzwakt bloedvat in de hersenen barst). Nimodipine zit in een klasse van medicijnen die calciumkanaalblokkers worden genoemd. Het werkt door de bloedvaten in de hersenen te ontspannen, zodat er meer bloed naar de beschadigde gebieden kan stromen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Nimodipine wordt geleverd als een capsule en een orale oplossing (vloeistof) om via de mond in te nemen of via een voedingssonde te worden toegediend. Het wordt meestal 21 dagen achter elkaar elke 4 uur ingenomen. De behandeling met nimodipine moet zo snel mogelijk worden gestart, niet later dan 96 uur na het optreden van een subarachnoïdale bloeding. Nimodipine moet op een lege maag worden ingenomen, ten minste 1 uur voor een maaltijd of 2 uur na een maaltijd. Volg de aanwijzingen op het etiket op uw recept zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem nimodipine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de capsules heel door met water.

Het is belangrijk om uw hele kuur met nimodipine af te maken. Blijf nimodipine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van nimodipine zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u nimodipine inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor nimodipine, andere medicijnen of een van de ingrediënten in nimodipine-capsules of drank. Vraag uw arts of apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt: bepaalde antischimmelmiddelen, waaronder itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral) en voriconazol (Vfend); claritromycine (Biaxin); bepaalde medicijnen voor HIV, waaronder indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en saquinavir (Invirase); nefazodon; en telithromycine (Ketek). Uw arts kan u vertellen om geen nimodipine te gebruiken.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, voedingssupplementen en vitamines u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker een van de volgende zaken: aprepitant (Emend); armodafinil (Nuvigil); alprazolam (Niravam, Xanax); amiodaron (Cordarone, Pacerone, Nexterone); atazanavir (Reyataz), bosentan (Tracleer); cimetidine (Tagamet); conivaptan (Vaprisol); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); delavirdine (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); combinatie van dalfopristine/quinupristine (Synercid); efavirenz (Sustiva, in Atripla); erytromycine (EES, E-Mycin); etravirine (Intelence); fluconazol (Diflucan); fluoxetine (Prozac, Sarafem, in Symbyax); isoniazide (in Rifater, in Rifamaat); medicijnen voor hoge bloeddruk of hartaandoeningen, waaronder diuretica ('plaspillen'); bepaalde medicijnen voor hepatitis, waaronder boceprevir (Victrelis) en telaprevir (Incivek); bepaalde medicijnen voor aanvallen, waaronder carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenobarbital (Luminal) en fenytoïne (Dilantin); modafinil (Provigil); nafcilline (Nallpen); orale anticonceptiva (anticonceptiepillen); fosfodiësterase (PDE-5) remmers waaronder sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) en vardenafil (Levitra, Staxyn); pioglitazon (Actos, in Actoplus Met, in Duetact, in Oseni); posaconazol (Noxafil); prednison (Rayos); rifampicine (Rifadin, Rifater, Rimactane, in Rifamaat); rufinamide (Banzel); valproïnezuur (Depakene); verapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); en vemurafenib (Zelburaf). Veel andere medicijnen kunnen ook interageren met nimodipine, dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs als ze niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldiger controleren op bijwerkingen.
- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral Echinacea en sint-janskruid.
- vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u nimodipine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Drink geen grapefruitsap en eet geen grapefruit terwijl u nimodipine gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Nimodipine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- hoofdpijn
- diarree
- misselijkheid
- spierpijn
- uitslag

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp:

- duizeligheid
- duizeligheid
- langzame of snelle hartslag
- zwelling van de armen, handen, voeten of benen

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van licht en overvloedige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort,

een epileptische aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet kan worden gewekt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts. Uw arts zal uw bloeddruk zorgvuldig controleren tijdens uw behandeling met nimodipine.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Nimotop®ik
- Nymaliseren®

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-11-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022