



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Nimodipine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689010.html>

Nimodipine

prononcé comme (nye moe' di peen)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Les gélules et le liquide de nimodipine doivent être pris par voie orale. Si vous êtes inconscient ou incapable d'avaler, le médicament peut vous être administré par une sonde d'alimentation placée dans votre nez ou directement dans votre estomac. La nimodipine ne doit jamais être administrée par voie intraveineuse (dans une veine), car cela peut entraîner des effets secondaires graves ou potentiellement mortels ou la mort.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La nimodipine est utilisée pour diminuer les lésions cérébrales qui peuvent être causées par une hémorragie sous-arachnoïdienne (saignement dans l'espace entourant le cerveau qui se produit lorsqu'un vaisseau sanguin affaibli dans le cerveau éclate). La nimodipine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs calciques. Il agit en relaxant les vaisseaux sanguins du cerveau pour permettre à plus de sang de circuler dans les zones endommagées.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La nimodipine se présente sous la forme d'une gélule et d'une solution buvable (liquide) à prendre par voie orale ou à administrer par sonde d'alimentation. Il est généralement pris toutes les 4 heures pendant 21 jours consécutifs. Le traitement par la nimodipine doit être instauré le plus tôt possible, au plus tard 96 heures après la survenue d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. La nimodipine doit être prise à jeun, au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après un repas. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la nimodipine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les gélules entières avec de l'eau.

Il est important de terminer la totalité de votre traitement par la nimodipine. Continuez à prendre de la nimodipine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la nimodipine sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages. Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la nimodipine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la nimodipine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les gélules ou la solution buvable de nimodipine. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : certains médicaments antifongiques, notamment l'itraconazole (Onmel, Sporanox), le kétoconazole (Nizoral) et le voriconazole (Vfend) ; clarithromycine (Biaxin); certains médicaments contre le VIH, notamment l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le ritonavir (Norvir, à Kaletra) et le saquinavir (Invirase); néfazodone; et la télithromycine (Ketek). Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre de nimodipine.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des suppléments nutritionnels et des vitamines que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : aprepitant (Emend) ; armodafinil (Nuvigil); alprazolam (Niravam, Xanax); amiodarone (Cordarone, Pacerone, Nexterone); atazanavir (Reyataz), bosentan (Tracleer); cimétidine (Tagamet); le conivaptan (Vaprisol); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); delavirdine (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); association dalfopristine/quinupristine (Synercid) ; éfavirenz (Sustiva, dans Atripla); l'érythromycine (EES, E-Mycin); étravirine (Intelligence); fluconazole (Diflucan); fluoxétine (Prozac, Sarafem, dans Symbyax); isoniazide (dans Rifater, dans Rifamate); médicaments pour l'hypertension artérielle ou les maladies cardiaques, y compris les diurétiques ("pilules d'eau") : certains médicaments contre l'hépatite, dont le bocéprévir (Victrelis) et le télaprévir (Incivek); certains médicaments contre les convulsions, notamment la carbamazépine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), le phénobarbital (Luminal) et la phénytoïne (Dilantin); modafinil (Provigil); nafcilline (Nallpen); contraceptifs oraux (pilules contraceptives); les inhibiteurs de la phosphodiesterase (PDE-5), notamment le sildénafil (Revatio, Viagra), le tadalafil (Cialis) et le vardénafil (Levitra, Staxyn); la pioglitazone (Actos, dans Actoplus Met, dans Duetact, dans Oseni) ; posaconazole (Noxafil);prednisone (Rayos); rifampicine (Rifadin, Rifater, Rimactane, dans Rifamate); le rufinamide (Banzel); acide valproïque (Depakene); vérapamil (Calan, Covera, Tarka, Verelan); et le vémurafénib (Zelburaf). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la nimodipine, Assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même s'ils ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller plus attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier l'échinacée et le millepertuis.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la nimodipine, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Ne buvez pas de jus de pamplemousse et ne mangez pas de pamplemousse pendant que vous prenez de la nimodipine.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La nimodipine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- mal de crâne
- diarrhée
- nausée
- douleur musculaire
- éruption

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- vertiges
- étourdissement
- rythme cardiaque lent ou rapide
- enflure des bras, des mains, des pieds ou des jambes

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière et de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée,

a eu une crise d'épilepsie, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillé, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin. Votre médecin surveillera attentivement votre tension artérielle pendant votre traitement par la nimodipine.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Nimotop®¶
- Nymaliser®

¶-Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 15/11/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022