

פרגבאלין מבוטא בתור (pre gab' a lin)

היי האם נרשמה תרופה זו?

כמוסות פרגבלין, תמיסה פומית (נוזל) וטבליות בשחרור מורחב (ארוכי טווח) משמשות להקלה על כאב נזירופטי (כאב מעצבים פגומים) שעלולים להתרחש בזרועותיך, בידיים, באצבעותיך, ברגליים, ברגליים או בהונות. יש סוכרת ונזירולגיה פוסט-תרפטית (PHN); הכאב הצורב, הדוקר או הכאבים שעלולים להימשך חודשים או שנים לאחר התקף של שלבכת חוגרת). כמוסות פרגבלין ותמיסת פה משמשים גם להקלה על כאב נזירופטי שעלול להתרחש לאחר פציעה בחוט השדרה ולטיפול בפיברומיאליגיה (מצב ממושך שעלול לגרום לכאב, נוקשות ורגישות בשרירים, עייפות וקשיי הירדמות או הירדמות). כמוסות פרגבלין ותמיסת פה משמשים יחד עם תרופות אחרות לטיפול בסוגים מסוימים של התקפים אצל מבוגרים וילדים מגיל חודש ומעלה. Pregabalin הוא בקבוצה של תרופות הנקראות נוגדי פרכוסים. זה פועל על ידי הפחתת מספר אותות הכאב הנשלחים על ידי עצבים פגומים בגוף.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

מגיע כקפסולה, תמיסת פה וכטבליה בשחרור מורחב לנטילה דרך הפה. כמוסות פרגבלין ותמיסת הפה נלקחות בדרך כלל עם או בלי אוכל פעמיים או שלוש ביום. טבליות פרגבלין בשחרור מורחב נלקחות בדרך כלל פעם ביום לאחר ארוחת ערב. קח פרגבלין בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין Pregabalin

לבלוע את הטבליות בשחרור מורחב בשלמותן; אין לחתוך, ללעוס או לכתוש אותם.

הרופא שלך ככל הנראה יתחיל במינון נמוך של פרגבלין ועשוי להגדיל את המינון שלך בהדרגה במהלך השבוע הראשון לטיפול.

קח פרגבלין בדיוק לפי ההוראות. פרגבאלין עשוי ליצור הרגל. אין לקחת מנה גדולה יותר, לקחת אותה לעתים קרובות יותר, או לקחת אותה לפרק זמן ארוך יותר ממה שרשם הרופא.

פרגבלין עשוי לסייע בשליטה על הסימפטומים שלך אך לא ירפא את מצבך. ייתכן שיחלפו מספר שבועות או יותר עד שתרגיש את התועלת המלאה של פרגבלין. המשך ליטול פרגבלין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול פרגבלין מבלי לדבר עם הרופא שלך, גם אם אתה חווה תופעות לוואי כגון שינויים חריגים בהתנהגות או במצב הרוח. אם תפסיק פתאום ליטול פרגבלין, אתה עלול לחוות

תסמיני גמילה, כולל קשיי הירדמות או הישארות שינה, בחילות, שלשולים, כאבי ראש או התקפים. הרופא שלך כנראה יקטין את המינון שלך בהדרגה במשך שבוע לפחות.

הרופא או הרוקח שלך יספקו לך את דף המידע של היצרן למטופל (מדריך התרופות) כאשר תתחיל טיפול בפרגבלין ובכל פעם שתמלא מחדש את המרשם שלך. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם לבקר באתר מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) או באתר היצרן לקבלת מדריך התרופות. (<http://www.fda.gov>)

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת פרגבלין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לפרגבלין, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בתכשירי פרגבלין. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד לציין את כל אחד מהדברים הבאים: מעכבי אנזים הממיר אנגיוטנסין (ACE) כגון בנזפריל (לוטנסין, בלוטרל), קפטופריל (קפטון, ב-Capozide), אנלפריל (Vasotec, ב-Lexxel, Vaseretic), פוסינופרייל (מונופרייל), ליסינופרייל. (Prinivil, Zestril, in Prinzide, Zestoretic), Tarka, Mavik, in Altace (andtrandolapril), Accuretic, Quinaretic, ramipril, Aceon, in quinapril, Accupril, in Aceon, in perindopril, Uniretic, in Univasc, moexipril; תרופות נוגדות דיכאון; אנטיהיסטמינים; תרופות לחרדה כולל (Ativan lorazepam); תרופות למחלות נפש או התקפים; תרופות מסוימות לסוכרת כגון פיוגליטזון (Actos, ב-Duetact), ורוזיגליטזון (Avandia, ב-Avandamet, Avandaryl); תרופות כאב אופיואידיות (נרקוטיות) כולל הידרוקודון (ב-Hydrocet, Vicodin, אחרים), מורפיום (Avinza, Kadian, MSIR, אחרים), או אוקסיקודון (OxyContin, ב-Percocet, אחרים); תרופות הרגעה; כדורי שינה; וכדורי הרגעה. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם אתה שותה או שתית אי פעם כמויות גדולות של אלכוהול, משתמש או השתמש אי פעם בסמי רחוב, או השתמש יתר על המידה בתרופות מרשם. ספר גם לרופא שלך אם יש לך או הייתה לך נפיחות של העיניים, הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון; בעיות ראייה; אי ספיקת הלב; בעיות דימום או מספר נמוך של טסיות דם (סוג של תאי דם הדרושים לקרישת דם) בדם שלך, או במחלת ריאות, לב או כליות.
- ספר לרופא שלך אם אתה בהריון או אם אתה או בן הזוג שלך מתכננים להיכנס להריון. ספר גם לרופא שלך אם את מניקה. אם אתה או בן זוגך נכנסים להריון בזמן שאתה נוטל פרגבלין, התקשר לרופא שלך. פרגבלין גרם לירידה בפוריות בבעלי חיים זכרים ולפגמים מולדים בצאצאים של בעלי חיים זכרים ונקבות שטופלו בתרופה. אין מספיק מידע כדי לדעת אם פרגבלין גורם לבעיות אלו בבני אדם.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל פרגבלין.
- עליך לדעת כי פרגבלין עלול לגרום לך לסחרחורת או ישנונית. אל תנהג במכונית תפעיל מכונית, או תעשה פעילויות מסוכנות אחרות עד שאתה יודע איך התרופה הזו משפיעה עליך. שאל את הרופא שלך מתי אתה יכול לעשות את הפעילויות האלה.

- אין לשתות אלכוהול בזמן נטילת פרגבלין. אלכוהול יכול להוסיף לנמנום הנגרמת על ידי תרופה זו.
- עליך לדעת שהבריאות הנפשית שלך עשויה להשתנות בדרכים בלתי צפויות ואתה עלול להפוך לאובדני (מחשבה על פגיעה או התאבדות או תכנון או ניסיון לעשות זאת) בזמן שאתה נוטל פרגבלין לטיפול באפילפסיה, מחלות נפש או מצבים אחרים. מספר קטן של מבוגרים וילדים מגיל 5 ומעלה (כ-1 מתוך 500 אנשים) שנטלו נוגדי פרכוסים כגון פרגבלין לטיפול במצבים שונים במהלך מחקרים קליניים הפכו לאובדניים במהלך הטיפול. חלק מהאנשים הללו פיתחו מחשבות והתנהגות אובדניות כבר שבוע לאחר שהחלו ליטול את התרופה. קיים סיכון שאתה עלול לחוות שינויים בבריאות הנפשית שלך אם אתה נוטל תרופה נוגדת פרכוסים כגון פרגבלין, אבל יתכן גם סיכון שתחווה שינויים בבריאות הנפשית שלך אם מצבך לא יטופל. אתה והרופא שלך תחליטו אם הסיכונים בנטילת תרופה נוגדת פרכוסים גדולים יותר מהסיכונים של אי נטילת התרופה. אתה, משפחתך או המטפל שלך צריכים להתקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: התקפי פאניקה; תסיסה או אי שקט; עצבנות חדשה או מחמירה, חרדה או דיכאון; פועל לפי דחפים מסוכנים; קושי ליפול או להישאר לישון; התנהגות תוקפנית, כועסת או אלימה; מאניה (מצב רוח מטורף, נרגש באופן חריג); דיבור או מחשבה על רצון לפגוע בעצמך או לסיים את חייך; נסיגה מחברים ומשפחה; עיסוק במוות ובמוות; מתן רכוש יקר; או כל שינוי חריג אחר בהתנהגות או במצב הרוח.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשיך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם אתה לוקח את הכמוסות או את תמיסת הפה ושכחת לקחת מנה ולזכור כמה שעות לאחר מכן, קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר זאת. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשיך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

אם אתה נוטל את הטבליות בשחרור מורחב ושוכח לקחת מנה לאחר ארוחת הערב שלך, קח את המנה שהוחמצה לפני השינה לאחר חטיף. אם אתה מתגעגע ליטול את המנה לפני השינה, קח את המנה שלך למחרת לאחר ארוחת הבוקר. אם אתה מתגעגע ליטול את המנה לאחר ארוחת הבוקר, קח את המנה שלך בשעה הרגילה לאחר ארוחת ערב והמשיך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

פרגבלין עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- עייפות
- סחרחורת
- כאב ראש
- פה יבש
- בחילה

- הקָאָה
- עצירות
- גֵז
- נפיחות
- "גבוה" או מצב רוח מוגבר
- בעיות דיבור
- קושי להתרכז או לשים לב
- קושי לזכור או שכחה
- חֲרָדָה
- חוסר תיאום
- אובדן שיווי משקל או חוסר יציבות
- טלטול או טלטול בלתי נשלט של חלק בגוף
- התכווצויות שרירים
- חולשה
- תיאבון מוגבר
- עלייה במשקל
- כאב גב

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה, התקשר לרופא שלך מיד:

- ראייה מטושטשת, ראייה כפולה או שינויים אחרים בראייה
- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- שלפוחיות
- נפיחות של העיניים, הפנים, הגרון, הפה, השפתיים, החניכיים, הלשון, הראש או הצוואר
- נפיחות של הידיים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות
- קוצר נשימה
- צפצופים
- כאבי שרירים, רגישות, כאבים או חולשה, במיוחד אם זה בא יחד עם חום
- כאב בחזה
- קשיי נשימה; עור, שפתיים או ציפורניים בגוון כחלחל; בלבול; או ישנוניות קיצונית

אם יש לך סוכרת, עליך לדעת שהפרגבלין גרם לפצעי עור בבעלי חיים. שים לב במיוחד לעור שלך בזמן נטילת פרגבלין, וספר לרופא שלך אם יש לך פצעים, אדמומיות או בעיות עור.

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Pregabalin

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון משמר גלולות שבועי ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>] אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לפרגבלין.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- ליריקה®
- ליריקה®CR

עדכון אחרון - 15/05/2020

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022