



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → プレガバリン

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

## プレガバリン

(pre gab'a lin) と発音されます

### なぜこの薬が処方されているのですか？

Pregabalin capsules, oral solution (liquid), and extended-release (long-acting) tablets are used to relieve neuropathic pain (pain from damaged nerves) that can occur in your arms, hands, fingers, legs, feet, or toes if you have diabetes and postherpetic neuralgia (PHN; the burning, stabbing pain or aches that may last for months or years after an attack of shingles). Pregabalin capsules and oral solution are also used to relieve neuropathic pain that can occur after a spinal cord injury and to treat fibromyalgia (a long-lasting condition that may cause pain, muscle stiffness and tenderness, tiredness, and difficulty falling asleep or staying asleep). Pregabalin capsules and oral solution are used along with other medications to treat certain types of seizures in adults and children 1 month of age and older. Pregabalin is in a class of medications called anticonvulsants. It works by decreasing the number of pain signals that are sent out by damaged nerves in the body.

### わあ、この薬を使うべきですか？

プレガバリンは、カプセル、経口液剤、および経口摂取用の徐放性錠剤として提供されます。プレガバリンカプセルと経口液剤は、通常、食事の有無にかかわらず、1日2〜3回服用します。プレガバリン徐放性錠剤は通常、夕食後に1日1回服用します。毎日ほぼ同じ時間にプレガバリンを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを切ったり、噛んだり、つぶしたりしないでください。

あなたの医者はおそらくプレガバリンの低用量であなたを始め、治療の最初の週の間あなたの用量を徐々に増やすかもしれません。

指示通りにプレガバリンを服用してください。プレガバリンは習慣を形成している可能性があります。医師の処方よりも多く服用したり、頻繁に服用したり、長期間服用したりしないでください。

プレガバリンはあなたの症状をコントロールするのに役立つかもしれませんが、あなたの状態を治すことはありません。プレガバリンの効果を十分に実感できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもプレガバリンを服用し続けてください。行動や気分の異常な変化などの副作用が発生した場合でも、医師に相談せずにプレガバリンの服用を中止しないでください。突然プレガバリンの服用をやめると、

禁断症状（眠りにつく、または眠り続けるのに苦労する、吐き気、下痢、頭痛、発作など）。あなたの医者はおそらく少なくとも1週間にわたってあなたの用量を徐々に減らします。

プレガバリンによる治療を開始するとき、および処方箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。また、食品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます（<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを入手してください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

プレガバリンを服用する前に、

- プレガバリン、他の薬、またはプレガバリン製剤の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：ベナゼプリル（ロテンシン、ロトレル）、カプトプリル（カプトプリル、カポジド）、エナラプリル（バソテック、バセレティック、レクセル）、フォシノプリル（モノプリル）、リシノプリルなどのアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤（Prinivil、Zestril、Prinzide、Zestoretic）、moexipril（Univasc、Uniretic）、perindopril（Aceon）、quinapril（Accupril、Accuretic、Quinaretic）、ramipril（Altace）、およびtrandolapril（Mavik、Tarka）；抗うつ薬；抗ヒスタミン薬；ロラゼパム（Ativan）を含む不安神経症の薬；精神疾患または発作のための薬；ピオグリタゾン（Actos、Duetact）やロシグリタゾン（Avandia、アバンドリル、アバンドメット）；ヒドロコドン（Hydrocet、Vicodin、その他）、モルヒネ（Avinza、Kadian、MSIR、その他）、またはオキシコドン（OxyContin、Percocet、その他）を含むオピオイド（麻薬）鎮痛薬。鎮静剤；睡眠薬；と精神安定剤。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 大量のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがあるか、ストリートドラッグを使用したことがあるか、使用したことがあるか、処方薬を使いすぎたことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、目、顔、唇、舌、または喉が腫れている、または腫れたことがあるかどうかを医師に伝えてください。視力の問題；心不全；血液中の出血の問題または血球の数の少なさ（血液凝固に必要な血球の種類）、または肺、心臓、または腎臓の病気。
- あなたが妊娠しているかどうか、またはあなたまたはあなたのパートナーが妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。また、授乳中かどうかを医師に伝えてください。プレガバリンを服用しているときにあなたまたはあなたのパートナーが妊娠した場合は、医師に連絡してください。プレガバリンは、雄の動物の出生力の低下と、薬で治療された雄と雌の動物の子孫の先天性欠損症を引き起こしました。プレガバリンが人間にこれらの問題を引き起こすかどうかを知るのに十分な情報はありません。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、プレガバリンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- プレガバリンはあなたをめまいや眠気にさせる可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのように影響するかがわかるまで、車を運転して機械を操作したり、他の危険な活動をしたりしないでください。これらの活動をいつ行うことができるか医師に相談してください。

- プレガバリンを服用している間はアルコールを飲まないでください。アルコールは、この薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があります。
- てんかん、精神疾患、またはその他の状態の治療のためにプレガバリンを服用している間、メンタルヘルスが予期しない方法で変化し、自殺する可能性があることを知っておく必要があります（自分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうしようと計画したりしようとしています）。臨床試験中にさまざまな状態を治療するためにプレガバリンなどの抗けいれん薬を服用した少数の成人および5歳以上の子供（約500人に1人）は、治療中に自殺しました。これらの人々の何人かは、薬を服用し始めてから早くも1週間で自殺念慮と行動を起こしました。プレガバリンなどの抗けいれん薬を服用すると、メンタルヘルスに変化が生じるリスクがあります。しかし、あなたの状態が治療されない場合、あなたがあなたの精神的健康の変化を経験するリスクもあるかもしれません。あなたとあなたの医師は、抗けいれん薬を服用するリスクが薬を服用しないリスクよりも大きいかどうかを判断します。次の症状のいずれかが発生した場合は、あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者がすぐに医師に連絡する必要があります。パニック発作。興奮または落ち着きのなさ；新規または悪化する過敏性、不安、またはうつ病；危険な衝動に作用する；転倒または眠り続けるのが難しい；攻撃的、怒り、または暴力的な行動。マニア（熱狂的、異常に興奮した気分）；自分を傷つけたり、人生を終わらせたいと話したり考えたりする。友人や家族からの撤退。死と死への没頭；貴重な財産を配る。または行動や気分のその他の異常な変化。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

カプセルや経口服液剤を服用していて、飲み忘れて数時間後のことを忘れた場合は、忘れた分はすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

徐放性錠剤を服用していて、夕食後に服用するのを忘れた場合は、間食後の就寝前に服用し忘れた服用を服用してください。就寝前に服用し忘れた場合は、朝食の翌日に服用してください。朝食後の服用を忘れた場合は、夕食後の通常の時間に服用し、通常の服用スケジュールを続けてください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

プレガバリンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 疲れ
- めまい
- 頭痛
- 口渇
- 吐き気

- 嘔吐
- 便秘
- ガス
- 膨満感
- 「高い」または高揚した気分
- スピーチの問題
- 集中力低下または注意力低下
- 覚えにくい、または忘れる
- 不安
- 調整の欠如
- バランスの喪失または不安定
- 体の一部の制御不能な揺れまたはけいれん
- 筋肉のけいれん
- 弱点
- 食欲増進
- 体重の増加
- 背中痛み

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- かすみ目、複視、またはその他の視力の変化
- じんましん
- 発疹
- かゆみ
- 水ぶくれ
- 目、顔、喉、口、唇、歯茎、舌、頭または首の腫れ
- 腕、手、足、足首、または下肢の腫れ
- 呼吸困難
- 喘鳴
- 筋肉痛、圧痛、痛み、または脱力感、特に発熱を伴う場合
- 胸痛
- 呼吸困難; 青みがかかった皮膚、唇、または指の爪; 錯乱; または極度の眠気

糖尿病の場合は、プレガバリンが動物の皮膚の痛みを引き起こしていることを知っておく必要があります。プレガバリンを服用している間は皮膚に特に注意を払い、痛み、発赤、または皮膚の問題があるかどうかを医師に伝えてください。

プレガバリンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。医師は、プレガバリンに対する体の反応を確認するために、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- リリカ®
- リリカCR®

最終改訂日-2020年5月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日