



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

집 → [약물](#), [허브 및 보조제](#) → 프레가발린

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

프레가발린 (pre gab' lin)으로 발음

이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

프레가발린 캡슐, 경구 용액(액상) 및 서방형(지속형) 정제는 다음과 같은 경우 팔, 손, 손가락, 다리, 발 또는 발가락에서 발생할 수 있는 신경병증성 통증(손상된 신경으로 인한 통증)을 완화하는 데 사용됩니다. 당뇨병 및 대상포진 후 신경통(PHN, 대상포진 발병 후 수개월 또는 수년 동안 지속되는 작열감, 찌르는 듯한 통증 또는 통증)이 있는 경우. 프레가발린 캡슐 및 경구 용액은 또한 척수 손상 후 발생할 수 있는 신경병증성 통증을 완화하고 섬유근육통(통증, 근육 경직 및 압통, 피로, 잠들기 또는 수면 유지 어려움을 유발할 수 있는 오래 지속되는 상태)을 치료하는 데 사용됩니다. . 프레가발린 캡슐 및 경구 용액은 성인 및 1개월 이상의 어린이의 특정 유형의 발작을 치료하기 위해 다른 약물과 함께 사용됩니다. 프레가발린은 항경련제라고 불리는 약물 종류에 속합니다. 그것은 신체의 손상된 신경이 보내는 통증 신호의 수를 줄임으로써 작동합니다.

이 약을 사용해야합니까?

Pregabalin은 캡슐, 경구 용액 및 경구 복용 연장 방출 정제로 제공됩니다. 프레가발린 캡슐과 경구 용액은 일반적으로 하루에 두세 번 음식과 함께 또는 음식 없이 복용합니다. 프레가발린 서방정은 일반적으로 저녁 식사 후 1일 1회 복용합니다. 매일 거의 같은 시간에 프레가발린을 복용하십시오. 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오.

서방형 정제를 통째로 삼키십시오. 자르거나 씹거나 부수지 마십시오.

의사는 아마도 저용량의 프레가발린으로 시작하여 치료 첫 주 동안 점차적으로 용량을 늘릴 것입니다.

지시대로 정확하게 프레가발린을 복용하십시오. 프레가발린은 습관성일 수 있습니다. 더 많은 양을 복용하거나 의사가 처방한 것보다 더 자주 복용하거나 장기간 복용하지 마십시오.

프레가발린은 증상을 조절하는 데 도움이 될 수 있지만 상태를 치료하지는 않습니다. 프레가발린의 완전한 이점을 느끼기까지 몇 주 또는 그 이상이 걸릴 수 있습니다. 기분이 좋아도 프레가발린을 계속 복용하십시오. 행동이나 기분의 비정상적인 변화와 같은 부작용이 발생하더라도 의사와 상의하지 않고 프레가발린 복용을 중단하지 마십시오. 갑자기 프레가발린 복용을 중단하면 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

잠이 오지 않거나 계속 잠드는 문제, 메스꺼움, 설사, 두통 또는 발작을 포함한 금단 증상. 의사는 최소 1주일에 걸쳐 점진적으로 복용량을 줄일 것입니다.

의사나 약사는 프레가발린으로 치료를 시작할 때와 처방을 다시 조절할 때마다 제조업체의 환자 정보 시트(약물 가이드)를 줄 것입니다. 정보를 주의 깊게 읽고 질문이 있는 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오. 미국 식품의약국(FDA) 웹사이트(<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) 또는 제조업체의 웹사이트에서 Medication Guide를 얻을 수 있습니다.

이 약의 용도

이 약은 다른 용도로 처방될 수 있습니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

모자 특별 예방 조치를 따라야 합니까?

프레가발린을 복용하기 전에,

- 프레가발린, 다른 약물 또는 프레가발린 제제의 성분에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려주세요. 성분 목록은 약사에게 문의하십시오.
- 의사와 약사에게 귀하가 복용 중이거나 복용할 계획인 기타 처방 및 비처방 약물, 비타민, 영양 보조제, 약초 제품이 무엇인지 알려주세요. 베나제프릴(Lotensin, Lotrel), 캡토프릴(Captopren, Capozide), 에날라프릴(Vasotec, Vaseretic, Lexxel), 포시노프릴(Monopril), 리시노프릴과 같은 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제제를 반드시 언급하십시오. (Prinivil, Zestril, Prinzide, Zestoretic), moexipril(Univasc, Uniretic), perindopril(Aceon), quinapril(Accupril, Accuretic, Quinaretic), ramipril(Altace) 및 trandolapril(Mavik, Tarka); 항우울제; 항히스타민제; lorazepam (Ativan)을 포함한 불안 약물; 정신 질환 또는 발작을 위한 약물; pioglitazone(Duetact의 Actos) 및 rosiglitazone(Avandia, 아반다릴, 아반다메트); 하이드로코돈(Hydrocet, Vicodin, 기타), 모르핀(Avinza, Kadian, MSIR, 기타) 또는 옥시코돈(OxyContin, Percocet, 기타)을 포함한 아편유사제(마약성) 진통제; 진정제; 수면제; 및 진정제. 의사는 약물의 복용량을 변경하거나 부작용에 대해 주의 깊게 모니터링해야 할 수도 있습니다.
- 당신이 술을 마시거나 많은 양의 술을 마신 적이 있는지, 길거리 마약을 사용하거나 사용한 적이 있는지, 처방약을 남용했는지 의사에게 알려주세요. 또한 눈, 얼굴, 입술, 혀 또는 목이 부어올랐거나 부어오른 적이 있는지 의사에게 알려주세요. 시력 문제; 심부전; 혈액 또는 폐, 심장 또는 신장 질환의 출혈 문제 또는 혈소판(혈액 응고에 필요한 혈액 세포 유형)의 낮은 수.
- 당신이 임신 중이거나 당신이나 당신의 파트너가 임신을 계획한다면 의사에게 알려주세요. 또한 모유 수유 중인지 의사에게 알려주세요. 프레가발린을 복용하는 동안 귀하 또는 귀하의 파트너가 임신하면 의사에게 연락하십시오. 프레가발린은 수컷 동물의 생식 능력을 감소시키고 약물로 치료받은 수컷 및 암컷 동물의 자손에게 선천적 기형을 유발했습니다. 프레가발린이 인간에게 이러한 문제를 일으키는지 여부를 알 수 있는 정보가 충분하지 않습니다.
- 치과 수술을 포함하여 수술을 받는 경우 의사나 치과 의사에게 프레가발린을 복용하고 있다고 알려주세요.
- 프레가발린이 현기증이나 졸음을 유발할 수 있음을 알아야 합니다. 이 약이 귀하에게 어떤 영향을 미치는지 알기 전에는 자동차를 운전하여 기계를 조작하거나 다른 위험한 활동을 하지 마십시오. 이러한 활동을 언제 할 수 있는지 의사에게 문의하십시오.

- 프레가발린을 복용하는 동안 술을 마시지 마십시오. 알코올은 이 약으로 인한 졸음을 더할 수 있습니다.
- 간질, 정신 질환 또는 기타 상태의 치료를 위해 프레가발린을 복용하는 동안 정신 건강이 예기치 않은 방식으로 변할 수 있고 자살 충동(자해 또는 사망에 대한 생각 또는 계획 또는 시도)이 될 수 있음을 알아야 합니다. 임상 연구 중에 다양한 상태를 치료하기 위해 프레가발린과 같은 항경련제를 복용한 소수의 성인 및 5세 이상 어린이(약 500명 중 1명)가 치료 중 자살을 시도했습니다. 이 사람들 중 일부는 약물 복용을 시작한 지 1주일 만에 자살 생각과 행동을 보였습니다. 프레가발린과 같은 항경련제를 복용하면 정신 건강에 변화를 경험할 위험이 있습니다. 그러나 귀하의 상태가 치료되지 않으면 정신 건강에 변화를 경험할 위험이 있습니다. 귀하와 귀하의 의사는 항경련제를 복용할 위험이 약을 복용하지 않을 위험보다 더 큰지 여부를 결정할 것입니다. 귀하, 귀하의 가족 또는 간병인은 다음 증상 중 하나가 발생하면 즉시 의사에게 연락해야 합니다. 공황 발작; 동요 또는 안절부절; 새롭거나 악화되는 과민성, 불안 또는 우울증; 위험한 충동에 대한 행동; 잠들기 어렵거나 잠들기 어려움; 공격적이거나 화를 내거나 폭력적인 행동; 조증(광란, 비정상적으로 흥분된 기분); 자신을 다치게 하거나 삶을 끝내고 싶은 것에 대해 이야기하거나 생각하는 것; 친구와 가족으로부터 철수; 죽음과 죽음에 대한 집착; 소중한 재산을 나눠주는 것; 또는 행동이나 기분의 기타 비정상적인 변화.

모자 특별 식단을 지침을 따라야 하나요?

의사가 달리 지시하지 않는 한 정상적인 식단을 계속하십시오.

복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

캡슐 또는 경구 용액을 복용하고 복용을 잊어버리고 몇 시간 후에 기억한다면, 기억하는 즉시 놓친 복용량을 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 정기적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

서방정을 복용 중이고 저녁 식사 후 복용을 잊은 경우 간식을 먹고 취침 전에 놓친 복용량을 복용하십시오. 취침 전에 복용량을 놓친 경우 다음 날 아침 식사 후에 복용하십시오. 아침 식사 후 복용을 놓친 경우 저녁 식사 후 평소 시간에 복용하고 규칙적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

모자 부작용 이 약이 일으킬 수 있습니까?

프레가발린은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려십시오.

- 피로
- 현기증
- 두통
- 마른 입
- 메스꺼움

- 구토
- 변비
- 가스
- 팽만감
- '높은' 또는 고양된 기분
- 언어 문제
- 집중하거나 주의를 기울이는 데 어려움
- 기억 장애 또는 건망증
- 불안
- 조정 부족
- 균형 상실 또는 불안정
- 신체 일부의 제어할 수 없는 떨림 또는 경련
- 근육 경련
- 약점
- 식욕 증가
- 살찌 다
- 허리 통증

일부 부작용은 심각할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 의사에게 연락하십시오.

- 흐린 시력, 복시 또는 기타 시력 변화
- 두드러기
- 발진
- 가려움
- 물집
- 눈, 얼굴, 목, 입, 입술, 잇몸, 혀, 머리 또는 목의 붓기
- 팔, 손, 발, 발목 또는 다리의 붓기
- 호흡 곤란
- 천명
- 근육통, 압통, 통증 또는 약점, 특히 열이 동반되는 경우
- 가슴 통증
- 호흡 곤란; 푸르스름한 피부, 입술 또는 손톱; 착란; 또는 극심한 졸음

당뇨병이 있는 경우 프레가발린이 동물의 피부 염증을 유발했다는 사실을 알아야 합니다. 프레가발린을 복용하는 동안 피부에 특별한 주의를 기울이고 염증, 발적 또는 피부 문제가 있으면 의사에게 알려주세요.

프레가발린은 다른 부작용을 일으킬 수 있습니다. 이 약을 복용하는 동안 비정상적인 문제가 발생하면 의사에게 연락하십시오.

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 하나요?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 과도한 열과 습기가 없는 곳(화장실이 아님)에 보관하십시오.

많은 용기(주간 알약 보관함 및 안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약을 어린이의 눈에 띄고 손이 닿지 않는 곳에 두는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하려면 항상 안전 캡을 잠그고 즉시 약을 안전한 장소에 두십시오.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

불필요한 약은 애완동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 변기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의 의약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

n 응급/과다 복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다. <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

모자 다른 정보를 알아야 하나요?

의사 및 검사실과의 모든 약속을 지키십시오. 의사는 프레가발린에 대한 신체의 반응을 확인하기 위해 특정 실험실 검사를 지시할 수 있습니다.

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

랜드 이름

- 리리카®
- 리리카 CR®

최종 수정 - 2020년 5월 15일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일