



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Pregabalina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

Pregabalina

pronunciado como (pre gab' a lin)

por que este medicamento é prescrito?

Cápsulas de pregabalina, solução oral (líquida) e comprimidos de liberação prolongada (ação prolongada) são usados para aliviar a dor neuropática (dor de nervos danificados) que pode ocorrer em seus braços, mãos, dedos, pernas, pés ou dedos dos pés se você tem diabetes e neuralgia pós-herpética (NPH; a dor em queimação, punhalada ou dores que podem durar meses ou anos após um ataque de herpes zoster). As cápsulas de pregabalina e a solução oral também são usadas para aliviar a dor neuropática que pode ocorrer após uma lesão na medula espinhal e para tratar a fibromialgia (uma condição de longa duração que pode causar dor, rigidez e sensibilidade muscular, cansaço e dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo). As cápsulas de pregabalina e a solução oral são usadas juntamente com outros medicamentos para tratar certos tipos de convulsões em adultos e crianças com 1 mês de idade ou mais. A pregabalina está em uma classe de medicamentos chamados anticonvulsivantes. Funciona diminuindo o número de sinais de dor que são enviados por nervos danificados no corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A pregabalina vem como uma cápsula, uma solução oral e como um comprimido de liberação prolongada para tomar por via oral. As cápsulas de pregabalina e a solução oral são geralmente tomadas com ou sem alimentos duas ou três vezes ao dia. Os comprimidos de liberação prolongada de pregabalina são normalmente tomados uma vez por dia após o jantar. Tome pregabalina mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda.

Engula os comprimidos de liberação prolongada inteiros; não os corte, mastigue ou esmague.

O seu médico irá provavelmente iniciar-lhe uma dose baixa de pregabalina e poderá aumentar gradualmente a sua dose durante a primeira semana de tratamento.

Tome pregabalina exatamente como indicado. A pregabalina pode ser viciante. Não tome uma dose maior, tome com mais frequência ou tome por um período mais longo do que o prescrito pelo seu médico.

A pregabalina pode ajudar a controlar seus sintomas, mas não cura sua condição. Pode levar várias semanas ou mais até que você sinta todos os benefícios da pregabalina. Continue a tomar pregabalina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar pregabalina sem falar com o seu médico, mesmo se tiver efeitos secundários como alterações involuntárias no comportamento ou humor. Se você parar de tomar pregabalina de repente, você pode sentir

sintomas de abstinência, incluindo dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, náusea, diarreia, dores de cabeça ou convulsões. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente ao longo de pelo menos 1 semana.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com pregabalina e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar pregabalina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à pregabalina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes das preparações de pregabalina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), como benazepril (Lotensin, em Lotrel), captopril (Capoten, em Capozide), enalapril (Vasotec, em Vasoretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, em Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, em Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, em Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace) e trandolapril (Mavik, em Tarka); antidepressivos; anti-histamínicos; medicamentos para ansiedade, incluindo lorazepam (Ativan); medicamentos para doenças mentais ou convulsões; certos medicamentos para diabetes, como pioglitazona (Actos, em Duetact) e rosiglitazona (Avandia, em Avandaryl, Avandamet); analgésicos opióides (narcóticos), incluindo hidrocodona (em Hydrocet, em Vicodin, outros), morfina (Avinza, Kadian, MSIR, outros) ou oxicodona (OxyContin, em Percocet, outros); sedativos; pílulas para dormir; e tranquilizantes. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool, usa ou já usou drogas de rua ou se usou medicamentos prescritos em excesso. Informe também o seu médico se tem ou já teve inchaço dos olhos, face, lábios, língua ou garganta; problemas de visão; insuficiência cardíaca; problemas hemorrágicos ou um baixo número de plaquetas (tipo de célula sanguínea necessária para a coagulação do sangue) no seu sangue ou doença pulmonar, cardíaca ou renal.
- informe o seu médico se estiver grávida ou se você ou seu parceiro planeja engravidar. Informe também o seu médico se estiver a amamentar. Se você ou o seu parceiro engravidar enquanto estiver a tomar pregabalina, contacte o seu médico. A pregabalina causou diminuição da fertilidade em animais machos e defeitos congênitos na prole de animais machos e fêmeas que foram tratados com a medicação. Não há informações suficientes para dizer se a pregabalina causa esses problemas em humanos.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar pregabalina.
- deve saber que a pregabalina pode deixá-lo tonto ou sonolento. Não conduza um carro, opere máquinas ou faça outras atividades perigosas até saber como este medicamento o afeta. Pergunte ao seu médico quando você pode fazer essas atividades.

- não beba álcool enquanto estiver a tomar pregabalina. O álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento.
- você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas e você pode se tornar suicida (pensar em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo) enquanto estiver tomando pregabalina para o tratamento de epilepsia, doença mental ou outras condições. Um pequeno número de adultos e crianças com 5 anos de idade ou mais (cerca de 1 em 500 pessoas) que tomaram anticonvulsivantes como pregabalina para tratar várias condições durante os estudos clínicos tornaram-se suicidas durante o tratamento. Algumas dessas pessoas desenvolveram pensamentos e comportamentos suicidas uma semana depois de começarem a tomar a medicação. Existe o risco de sofrer alterações na sua saúde mental se tomar um medicamento anticonvulsivante como pregabalina, mas também pode haver o risco de você experimentar mudanças em sua saúde mental se sua condição não for tratada. Você e seu médico decidirão se os riscos de tomar um medicamento anticonvulsivante são maiores do que os riscos de não tomar o medicamento. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: ataques de pânico; agitação ou inquietação; irritabilidade, ansiedade ou depressão nova ou agravada; agindo em impulsos perigosos; dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo; comportamento agressivo, raivoso ou violento; mania (humor frenético e anormalmente excitado); falar ou pensar em querer se machucar ou acabar com sua vida; afastamento de amigos e familiares; preocupação com a morte e o morrer; dando bens valiosos; ou quaisquer outras mudanças incomuns de comportamento ou humor.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se estiver a tomar as cápsulas ou a solução oral e se esquecer de tomar uma dose e se lembrar algumas horas depois, tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Se estiver a tomar os comprimidos de libertação prolongada e se esquecer de tomar uma dose após o jantar, tome a dose esquecida antes de deitar depois de um lanche. Se você esquecer de tomar a dose antes de dormir, tome a dose no dia seguinte após o café da manhã. Se você esquecer de tomar a dose após o café da manhã, tome a dose no horário habitual após o jantar e continue com o esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A pregabalina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- cansaço
- tontura
- dor de cabeça
- boca seca
- náusea

- vômito
- constipação
- gás
- inchaço
- humor "alto" ou elevado
- problemas de fala
- dificuldade de concentração ou atenção
- dificuldade em lembrar ou esquecimento
- ansiedade
- falta de coordenação
- perda de equilíbrio ou instabilidade
- agitação incontrolável ou espasmos de uma parte do corpo
- Espasmos musculares
- fraqueza
- aumento do apetite
- ganho de peso
- dor nas costas

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- visão turva, visão dupla ou outras alterações na visão
- urticária
- irritação na pele
- coceira
- bolhas
- inchaço dos olhos, face, garganta, boca, lábios, gengivas, língua, cabeça ou pescoço
- inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas
- falta de ar
- chiado
- dor muscular, sensibilidade, dor ou fraqueza, especialmente se vier junto com febre
- dor no peito
- dificuldade para respirar; pele, lábios ou unhas com coloração azulada; confusão; ou sonolência extrema

Se você tem diabetes, deve saber que a pregabalina causou feridas na pele em animais. Preste atenção extra à sua pele enquanto estiver a tomar pregabalina e informe o seu médico se tiver feridas, vermelhidão ou problemas de pele.

A pregabalina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo à pregabalina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Lyrica®
- Lyrica CR®

Última revisão - 15/05/2020

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022