



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Pregabalina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

pregabalina

pronunciado como (pre gab' a lin)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Las cápsulas de pregabalina, la solución oral (líquido) y las tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) se usan para aliviar el dolor neuropático (dolor de los nervios dañados) que puede ocurrir en los brazos, las manos, los dedos de las manos, las piernas, los pies o los dedos de los pies si tiene diabetes y neuralgia posherpética (PHN; el dolor ardiente, punzante o dolores que pueden durar meses o años después de un ataque de culebrilla). Las cápsulas de pregabalina y la solución oral también se usan para aliviar el dolor neuropático que puede ocurrir después de una lesión de la médula espinal y para tratar la fibromialgia (una afección de larga duración que puede causar dolor, rigidez y sensibilidad muscular, cansancio y dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido). Las cápsulas de pregabalina y la solución oral se usan junto con otros medicamentos para tratar ciertos tipos de convulsiones en adultos y niños de 1 mes de edad y mayores. La pregabalina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Funciona al disminuir la cantidad de señales de dolor que envían los nervios dañados del cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación de la pregabalina es en forma de cápsula, solución oral y tableta de liberación prolongada para tomar por vía oral. Las cápsulas de pregabalina y la solución oral generalmente se toman con o sin alimentos dos o tres veces al día. Las tabletas de pregabalina de liberación prolongada generalmente se toman una vez al día después de la cena. Tome la pregabalina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda.

Trague las tabletas de liberación prolongada enteras; no los corte, mastique ni triture.

Es probable que su médico le recete al principio una dosis baja de pregabalina y que la aumente gradualmente durante la primera semana de tratamiento.

Tome la pregabalina exactamente como se indica. La pregabalina puede crear hábito. No tome una dosis mayor, no la tome con más frecuencia ni la tome por un período de tiempo más largo que el recetado por su médico.

La pregabalina puede ayudar a controlar sus síntomas, pero no curará su afección. Pueden pasar varias semanas o más antes de que sienta todos los beneficios de la pregabalina. Continúe tomando pregabalina incluso si se siente bien. No deje de tomar pregabalina sin hablar con su médico, incluso si experimenta efectos secundarios como cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo. Si deja de tomar pregabalina repentinamente, puede experimentar

síntomas de abstinencia, que incluyen dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, náuseas, diarrea, dolores de cabeza o convulsiones. Su médico probablemente disminuirá su dosis gradualmente durante al menos 1 semana.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience el tratamiento con pregabalina y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar pregabalina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la pregabalina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes en las preparaciones de pregabalina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) como benazepril (Lotensin, en Lotrel), captopril (Capoten, en Capozide), enalapril (Vasotec, en Vaseretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, en Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, en Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, en Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace) y trandolapril (Mavik, en Tarka); antidepresivos; antihistamínicos; medicamentos para la ansiedad, incluido lorazepam (Ativan); medicamentos para enfermedades mentales o convulsiones; ciertos medicamentos para la diabetes como pioglitazona (Actos, en Duetact) y rosiglitazona (Avandia, en Avandaryl, Avandamet); analgésicos opioides (narcóticos) que incluyen hidrocodona (en Hydrocet, en Vicodin, otros), morfina (Avinza, Kadian, MSIR, otros) u oxicodona (OxyContin, en Percocet, otros); sedantes; pastillas para dormir; y tranquilizantes. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- Informe a su médico si bebe o alguna vez ha bebido grandes cantidades de alcohol, usa o alguna vez ha usado drogas ilegales, o si ha abusado de medicamentos recetados. También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua o la garganta; problemas de la vista; insuficiencia cardíaca; problemas de sangrado o un número bajo de plaquetas (tipo de glóbulo necesario para la coagulación de la sangre) en la sangre, o enfermedad pulmonar, cardíaca o renal.
- informe a su médico si está embarazada o si usted o su pareja planean quedar embarazadas. También informe a su médico si está amamantando. Si usted o su pareja quedan embarazadas mientras están tomando pregabalina, llame a su médico. La pregabalina ha causado una disminución de la fertilidad en animales machos y defectos de nacimiento en las crías de animales machos y hembras que fueron tratados con el medicamento. No hay suficiente información para saber si la pregabalina causa estos problemas en humanos.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando pregabalina.
- Debe saber que la pregabalina puede causarle mareos o somnolencia. No conduzca un automóvil, opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta este medicamento. Pregúntele a su médico cuándo puede realizar estas actividades.

- no beba alcohol mientras toma pregabalina. El alcohol puede aumentar la somnolencia causada por este medicamento.
- debe saber que su salud mental puede cambiar de manera inesperada y puede tener tendencias suicidas (pensar en hacerse daño o suicidarse o planear o intentar hacerlo) mientras toma pregabalina para el tratamiento de la epilepsia, enfermedad mental u otras afecciones. Una pequeña cantidad de adultos y niños a partir de los 5 años de edad (alrededor de 1 de cada 500 personas) que tomaron anticonvulsivos como la pregabalina para tratar diversas afecciones durante los estudios clínicos desarrollaron tendencias suicidas durante el tratamiento. Algunas de estas personas desarrollaron pensamientos y conductas suicidas tan pronto como 1 semana después de comenzar a tomar el medicamento. Existe el riesgo de que experimente cambios en su salud mental si toma un medicamento anticonvulsivo como pregabalina, pero también puede existir el riesgo de que experimente cambios en su salud mental si no se trata su condición. Usted y su médico decidirán si los riesgos de tomar un medicamento anticonvulsivo son mayores que los riesgos de no tomarlo. Usted, su familia o su cuidador deben llamar a su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: ataques de pánico; agitación o inquietud; irritabilidad, ansiedad o depresión nuevas o que empeoran; actuar sobre impulsos peligrosos; dificultad para conciliar o permanecer dormido; comportamiento agresivo, enojado o violento; manía (estado de ánimo frenético, anormalmente excitado); hablar o pensar en querer lastimarse o terminar con su vida; alejarse de amigos y familiares; preocupación por la muerte y el morir; regalar posesiones preciadas; o cualquier otro cambio inusual en el comportamiento o el estado de ánimo.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si está tomando las cápsulas o la solución oral y olvida tomar una dosis y se acuerda unas horas más tarde, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si está tomando las tabletas de liberación prolongada y olvida tomar una dosis después de la cena, tome la dosis olvidada antes de acostarse después de un refrigerio. Si olvida tomar la dosis antes de acostarse, tome su dosis al día siguiente después del desayuno. Si olvida tomar la dosis después del desayuno, tome su dosis a la hora habitual después de la cena y continúe con su horario regular de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La pregabalina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- cansancio
- mareo
- dolor de cabeza
- boca seca
- náuseas

- vómitos
- constipación
- gas
- hinchazón
- estado de ánimo "alto" o elevado
- problemas del habla
- dificultad para concentrarse o prestar atención
- dificultad para recordar u olvido
- ansiedad
- falta de coordinación
- pérdida de equilibrio o inestabilidad
- sacudidas o sacudidas incontrolables de una parte del cuerpo
- espasmos musculares
- debilidad
- Apetito incrementado
- aumento de peso
- dolor de espalda

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- visión borrosa, visión doble u otros cambios en la vista
- urticaria
- erupción
- Comezón
- ampollas
- hinchazón de los ojos, cara, garganta, boca, labios, encías, lengua, cabeza o cuello
- hinchazón de los brazos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- dificultad para respirar
- sibilancias
- dolor muscular, sensibilidad, dolor o debilidad, especialmente si se presenta junto con fiebre
- Dolor de pecho
- respiración dificultosa; piel, labios o uñas teñidas de azul; confusión; o somnolencia extrema

Si tiene diabetes, debe saber que la pregabalina ha causado llagas en la piel de los animales. Preste especial atención a su piel mientras toma pregabalina e informe a su médico si tiene llagas, enrojecimiento o problemas en la piel.

La pregabalina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la pregabalina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- lírica®
- Lyrica CR®

Última revisión - 15/05/2020

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022