

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

## بريجابالين تنطقُ (pre gab 'a lin)

### لماذا يوصف هذا الدواء؟

تستخدم كبسولات بريجابالين ، ومحلول فموي (سائل) ، وأقراص ممتدة المفعول (طويلة المفعول) لتخفيف آلام الأعصاب ( ألم الأعصاب التالفة) التي يمكن أن تحدث في ذراعيك ، أو يديك ، أو أصابعك ، أو ساقيك ، أو قدميك ، أو أصابع قدميك. لديك مرض السكري والألم العصبي التالي للهربس (PHN) ؛ ألم حارق أو طعن أو أوجاع قد تستمر لأشهر أو سنوات بعد نوبة القوباء المنطقية). تستخدم كبسولات بريجابالين ومحلول فموي أيضاً لتخفيف آلام الأعصاب التي يمكن أن تحدث بعد إصابة الحبل الشوكي ولعلاج الألم العضلي الليفي (حالة طويلة الأمد قد تسبب الألم وتيبس العضلات والحنان والإرهاق وصعوبة النوم أو الاستمرار في النوم) . تستخدم كبسولات Pregabalin والمحلول الفموي جنباً إلى جنب مع الأدوية الأخرى لعلاج أنواع معينة من النوبات عند البالغين والأطفال بعمر شهر واحد أو أكثر. ينتمي بريجابالين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الاختلاج. وهو يعمل عن طريق تقليل عدد إشارات الألم التي ترسلها الأعصاب التالفة في الجسم.

### كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Pregabalin في صورة كبسولة ، ومحلول فموي ، وكقرص ممتد المفعول ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما تؤخذ كبسولات بريجابالين ومحلول فموي مع أو بدون طعام مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. عادة ما يتم تناول أقراص Pregabalin ممتدة المفعول مرة واحدة يومياً بعد وجبة المساء. خذ pregabalin في نفس الوقت (الأوقات) تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه.

ابتلاع أقراص ممتدة المفعول بالكامل ؛ لا تقطعها أو تمضغها أو تسحقها.

من المحتمل أن يبدأ طبيبك بجرعة منخفضة من بريجابالين وقد يزيد جرعتك تدريجياً خلال الأسبوع الأول من العلاج.

خذب بريجابالين بالضبط حسب التوجيهات. قد يكون Pregabalin يتشكل عادة. لا تأخذ جرعة أكبر ، أو تأخذها في كثير من الأحيان ، أو تأخذها لفترة أطول من الوقت الذي وصفه طبيبك.

قد يساعد Pregabalin في السيطرة على الأعراض الخاصة بك ولكنه لن يعالج حالتك. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أكثر قبل أن تشعر بالفائدة الكاملة للبريغابالين. استمر في تناول بريجابالين حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول بريجابالين دون التحدث مع طبيبك ، حتى لو كنت تعاني من آثار جانبية مثل التغيرات غير العادية في السلوك أو المزاج. إذا توقفت فجأة عن تناول بريجابالين ، فقد تواجهك

أعراض الانسحاب ، بما في ذلك صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم ، والغثيان ، والإسهال ، والصداع ، أو النوبات. من المحتمل أن يخفض طبيبك جرعتك تدريجياً على مدار أسبوع واحد على الأقل.

سيعطيك طبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج باستخدام بريجابالين وفي كل مرة تقوم بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء. (<http://www.fda.gov>)

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

### قبل تناول بريجابالين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بريجابالين أو أي أدوية أخرى أو أي مكونات مستحضرات بريجابالين. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) مثل (Lotensin ، in Lotrel) (benazepril ، كابتوبريل (Capoten ، في Capozide) ، (Mavik ، in Tarka) (trandolapril ، and (Altace) (ramipril) ، (Quinaretic ، in Accuretic ، Accupril) (quinapril) (Aceon) ، (perindopril ، in Uniretic) (Univasc) (moexipril) (Zestoretic ، in Prinivil) (Prinivil) (lisinopril) (Monopril) (fosinopril) (Lexxel) ، (Vasotec) (enalapril) ؛ مضادات الاكتئاب. مضادات الهيستامين. أدوية للقلق بما في ذلك لورازيبام (أتيفان) ؛ أدوية للأمراض العقلية أو النوبات ؛ أدوية معينة لمرض السكري مثل بيوجليتازون (أكتوس ، في دويتاكت) وروزيجليتازون (أفانديا ، في أفانداريل ، أفانداميت) ؛ مسكنات الألم الأفيونية (المخدرة) بما في ذلك الهيدروكودون (في Hydrocet ، في Vicodin ، وغيرهما) ، والمورفين (Avinza ، Kadian ، MSIR) ، وغيرها) ، أو الأوكسيكودون (OxyContin ، في Percocet ، وغيرها) ؛ المهديئات. حبوب منومة؛ والمهديئات. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تشرب أو شربت كميات كبيرة من الكحول في أي وقت ، أو تناولت أو تعاطيت المخدرات في الشوارع ، أو تناولت الأدوية الموصوفة بشكل مفرط. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تعاني من تورم في العين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق ؛ مشاكل في الرؤية؛ فشل القلب؛ مشاكل النزيف أو انخفاض عدد الصفائح الدموية (نوع خلايا الدم اللازمة لتخثر الدم) في الدم أو أمراض الرئة أو القلب أو الكلى.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تخطط أنت أو شريكك للحمل. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت ترضعين. إذا أصبحت أنت أو شريكك حاملاً أثناء تناول بريجابالين ، فاتصل بطبيبك. تسبب بريجابالين في انخفاض الخصوبة لدى ذكور الحيوانات وتشوهات خلقية في نسل ذكور وإناث الحيوانات التي عولجت بالدواء. لا توجد معلومات كافية لمعرفة ما إذا كان دواء بريجابالين يسبب هذه المشاكل لدى البشر.
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول بريجابالين.
- يجب أن تعلم أن بريجابالين قد يصيبك بالدوار أو النعاس. لا تقود السيارة وتشغل الآلات أو تقوم بأنشطة خطيرة أخرى حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك. اسأل طبيبك متى يمكنك القيام بهذه الأنشطة.

• لا تشرب الكحول أثناء تناول بريجابالين. يمكن أن يزيد الكحول النعاس الذي يسببه هذا الدواء.

• يجب أن تعلم أن صحتك العقلية قد تتغير بطرق غير متوقعة وقد تصبح انتحارياً (التفكير في إيذاء أو قتل نفسك أو التخطيط أو محاولة القيام بذلك) أثناء تناول بريجابالين لعلاج الصرع أو المرض العقلي أو حالات أخرى. عدد قليل من البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق (حوالي 1 من كل 500 شخص) الذين تناولوا مضادات الاختلاج مثل بريجابالين لعلاج حالات مختلفة أثناء الدراسات السريرية أصبحوا انتحاريين أثناء علاجهم. طور بعض هؤلاء الأشخاص أفكاراً وسلوكيات انتحارية في وقت مبكر بعد أسبوع واحد من بدء تناول الدواء. هناك خطر من أنك قد تواجه تغييرات في صحتك العقلية إذا كنت تتناول دواءً مضاداً للاختلاج مثل بريجابالين ، ولكن قد يكون هناك أيضاً خطر من حدوث تغييرات في صحتك العقلية إذا لم يتم علاج حالتك. ستقرر أنت وطبيبك ما إذا كانت مخاطر تناول الأدوية المضادة للاختلاج أكبر من مخاطر عدم تناول الدواء. يجب عليك أنت أو عائلتك أو مقدم الرعاية الخاص بك الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية: نوبات الهلع ؛ الإثارة أو الأرق. تهيج أو قلق أو اكتئاب جديد أو متفاقم ؛ العمل على نبضات خطيرة. صعوبة في النوم أو البقاء نائماً. السلوك العدواني أو الغاضب أو العنيف ؛ هوس (مزاج مسعور ، متحمس بشكل غير طبيعي) ؛ التحدث أو التفكير في الرغبة في إيذاء نفسك أو إنهاء حياتك ؛ الانسحاب من الأصدقاء والعائلة ؛ الانشغال بالموت والموت. التخلي عن الممتلكات الثمينة ؛ أو أي تغييرات أخرى غير عادية في السلوك أو الحالة المزاجية.

## قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

## قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

إذا كنت تتناول الكبسولات أو المحلول الفموي ونسيت تناول جرعة وتذكرها بعد بضع ساعات ، فتناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا كنت تتناول أقراصاً ممتدة المفعول ونسيت تناول جرعة بعد وجبة المساء ، فتناول الجرعة الفائتة قبل النوم بعد تناول وجبة خفيفة. إذا فاتتك تناول الجرعة قبل وقت النوم ، فتناول جرعتك في اليوم التالي بعد الإفطار. إذا فاتتك تناول الجرعة بعد الإفطار ، فتناول جرعتك في الوقت المعتاد بعد تناول وجبة مسائية واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Pregabalin آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- تعب
- دوخة
- صداع الراس
- فم جاف
- غثيان

- التقيؤ
- إمساك
- غاز
- النفخ
- مزاج "مرتفع" أو مرتفع
- مشاكل الكلام
- صعوبة في التركيز أو الانتباه
- صعوبة في التذكر أو النسيان
- القلق
- نقص التنسيق
- فقدان التوازن أو عدم الثبات
- اهتزاز أو اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه لجزء من الجسم
- ارتعاش العضلات
- ضعف
- زيادة الشهية
- زيادة الوزن
- ألم في الظهر

### بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو تغيرات أخرى في البصر
- قشعريرة
- متسرع
- ملهف، متشوق
- بثور
- تورم في العينين والوجه والحلق والفم والشفتين واللثة واللسان والرأس أو الرقبة
- تورم في الذراعين أو اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو أسفل الساقين
- ضيق في التنفس
- أزيز
- ألم عضلي ، أو إيلام ، أو وجع ، أو ضعف ، خاصة إذا كان مصحوباً بالحمى
- ألم صدر
- صعوبة في التنفس جلد مشوب بالزرقة أو شفاه أو أظافر ؛ ارتباك ؛ أو النعاس الشديد

إذا كنت مصاباً بداء السكري ، يجب أن تعلم أن دواء بريجابالين قد تسبب في حدوث تقرحات جلدية في الحيوانات. انتبه جيداً لبشرتك أثناء تناول بريجابالين ، وأخبر طبيبك إذا كان لديك أي تقرحات أو احمرار أو مشاكل جلدية.

قد يسبب Pregabalin آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).  
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.[http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

## ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقافه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للبريجابالين.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب أن تحضر هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

- ليريكا®
- Lyrica CR®

آخر مراجعة - 15/05/2020

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



### إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

© AHFS® معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022