



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [พรีกาบาลิน](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

## พรีกาบาลิน

ออกเสียงว่า (pre gab 'a lin)

### hy เป็นยานี้กำหนด?

แคปซูลพรีกาบาลิน สารละลายในช่องปาก (ของเหลว) และยาเม็ดออกฤทธิ์นาน (ออกฤทธิ์นาน) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดตามเส้นประสาท (ความเจ็บปวดจากเส้นประสาทที่เสียหาย) ที่อาจเกิดขึ้นในแขน มือ นิ้ว ขา เท้า หรือนิ้วเท้า หากคุณ มีโรคเบาหวาน และโรคประสาท postherpetic (PHN; ปวดแสบปวดร้อนหรือปวดเมื่อยที่อาจคงอยู่นานหลายเดือนหรือหลายปีหลังจากการโจมตีของโรคงูสวัด) แคปซูลพรีกาบาลินและยาเม็ดรับประทานยังใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดตามเส้นประสาทที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและเพื่อรักษาไฟโบรไมอัลเจีย (ภาวะที่คงอยู่ยาวนานซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวด กล้ามเนื้อตึงและตึงอ่อนเพลีย และนอนหลับยากหรือหลับยาก) . แคปซูลพรีกาบาลินและยาเม็ดรับประทานใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักบางประเภทในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป พรีกาบาลินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากันชัก มันทำงานโดยการลดจำนวนของสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งออกโดยเส้นประสาทที่เสียหายในร่างกาย

### ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

พรีกาบาลินมาในรูปแบบแคปซูล เป็นยาเม็ดรับประทาน และเป็นยาเม็ดแบบขยายเวลารับประทานทางปาก แคปซูลพรีกาบาลินและสารละลายปากเปล่ามักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารสองหรือสามครั้งต่อวัน ยาเม็ดพรีกาบาลินแบบออกฤทธิ์นานมักรับประทานวันละครั้งหลังอาหารเย็น รับประทานพรีกาบาลินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าตัดเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินพรีกาบาลินในขนาดต่ำและอาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยาในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา

ใช้พรีกาบาลินตามที่กำหนด พรีกาบาลินอาจสร้างนิสัย อย่ากินยาในปริมาณมาก กินบ่อยขึ้น หรือกินเป็นเวลานานกว่าที่แพทย์กำหนด

พรีกาบาลินอาจช่วยควบคุมอาการของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาอาการของคุณได้ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้น ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของพรีกาบาลินอย่างเต็มที่ ทานพรีกาบาลินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานพรีกาบาลินโดยไม่ปรึกษาแพทย์ แม้ว่า คุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติ หากหยุดรับประทานพรีกาบาลินกะทันหัน คุณอาจประสบ

อาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท คลื่นไส้ ท้องร่วง ปวดหัว หรือชัก แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยา ลงอย่างน้อย 1 สัปดาห์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยพรีกาบาลินและทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

## ใช้สำหรับยา

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทนควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนรับประทานพรีกาบาลิน

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้พรีกาบาลิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการเตรียมพรีกาบาลิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารยับยั้ง angiotensin converting enzyme (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, ใน Lotrel), captopril (Capoten, ใน Capozide), enalapril (Vasotec, ใน Vaseretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, ใน Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, ใน Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, ใน Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril (Mavik, ใน Tarka); ยากล่อมประสาท; ยาแก้แพ้; ยาสำหรับความวิตกกังวลรวมทั้ง lorazepam (Ativan); ยารักษาอาการปวดทางจิตหรืออาการชัก ยาบางชนิดสำหรับโรคเบาหวาน เช่น pioglitazone (Actos, in Duetact) และ rosiglitazone (Avandia, ใน Avandaryl, Avandamet); ยาแก้ปวดฝิ่น (ยาเสพติด) รวมถึง hydrocodone (ใน Hydrocet ใน Vicodin อื่น ๆ ) มอร์ฟีน (Avinza, Kadian, MSIR อื่น ๆ ) หรือ oxycodone (OxyContin ใน Percocet อื่น ๆ ); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก ใช้หรือเคยใช้ยาข้างถนน หรือเคยใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีอาการบวมที่ตา ใบหน้าริมฝีปาก ลิ้นหรือลำคอ ปัญหาการมองเห็น หัวใจล้มเหลว; ปัญหาเลือดออกหรือเกล็ดเลือดจำนวนน้อย (ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดที่จำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือด) ในเลือดหรือโรคปอด หัวใจ หรือไต
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือหากคุณหรือคู่ของคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ แจ้งแพทย์ด้วยหากคุณให้นมลูก หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ในขณะที่คุณกำลังรับประทานพรีกาบาลินอยู่ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ พรีกาบาลินทำให้การเจริญพันธุ์ในสัตว์เพศผู้ลดลง และความพิการแต่กำเนิดในลูกของสัตว์ตัวผู้และตัวเมียที่ได้รับการรักษาด้วยยา มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าพรีกาบาลินเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ในมนุษย์หรือไม่
- หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาพรีกาบาลิน
- คุณควรรู้ว่าพรีกาบาลินอาจทำให้คุณเวียนหัวหรือง่วงนอน ห้ามขับรถโดยใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้อาจส่งผลต่อคุณอย่างไร ถามแพทย์ของคุณเมื่อคุณทำกิจกรรมเหล่านี้

- อย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทานพรีกาบาลิน แอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้
- คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กำลังคิดที่จะทำร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น) ในขณะที่คุณใช้ยาพรีกาบาลินเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมู ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออาการอื่นๆ ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจำนวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 ใน 500 คน) ที่ใช้ยากันชัก เช่น พรีกาบาลิน เพื่อรักษาสภาพต่างๆ ในระหว่างการศึกษากทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัวตายระหว่างการรักษา คนเหล่านี้บางคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเร็วถึง 1 สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้ยา มีความเสี่ยงที่คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากคุณทานยากันชักเช่นพรีกาบาลิน แต่อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหากอาการของคุณไม่ได้รับการรักษา คุณและแพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใช้ยากันชักมากกว่าความเสี่ยงของการไม่ใช้ยาหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่นตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; กระทำต่อแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้ำคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน, ตื่นเต้นผิดปกติ); พุดหรือคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตายและการตาย แจกสมบัติล้ำค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ

## ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

## ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกำลังรับประทานแคปซูลหรือยารับประทานและลืมรับประทานยาและนึกขึ้นได้ภายในสองสามชั่วโมงต่อมา ให้รับประทานยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณกำลังทานยาเม็ดเสริมและลืมทานยาหลังอาหารเย็น ให้ทานยาที่ลืมไปก่อนนอนหลังทานอาหารว่าง หากคุณลืมรับประทานยาก่อนนอน ให้รับประทานวันถัดไปหลังอาหารเช้า หากคุณลืมรับประทานยาหลังอาหารเช้า ให้รับประทานยาตามเวลาปกติหลังอาหารเช้าและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

## ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

**พรีกาบาลินอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:**

- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- อาการเวียนศีรษะ
- ปวดหัว
- ปากแห้ง
- คลื่นไส้

- อาเจียน
- ท้องผูก
- แก๊ส
- ท้องอืด
- "สูง" หรือ อารมณ์สูง
- ปัญหาการพูด
- มีปัญหาในการจดจ่อหรือให้ความสนใจ
- จำยากหรือหลงลืม
- ความวิตกกังวล
- ขาดการประสานงาน
- เสียสมดุลหรือไม่มั่นคง
- การสั่นหรือกระตุกของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างควบคุมไม่ได้
- กล้ามเนื้อกระตุก
- ความอ่อนแอ
- เพิ่มความอยากอาหาร
- น้ำหนักมากขึ้น, น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น
- ปวดหลัง

### **ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:**

- ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสายตาอื่น ๆ
- ลมพิษ
- ผื่น
- อาการคัน
- แผลพุพอง
- บวมที่ตา ใบหน้า ลำคอ ปาก ริมฝีปาก เหงือก ลิ้น ห้ว หรือคอ
- อาการบวมที่แขน มือ เท้า ข้อมือ หรือขาที่อ่อนล้า
- หายใจถี่
- หายใจดังเสียงฮืด ๆ
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อเป็นไข้
- อาการเจ็บหน้าอก
- หายใจลำบาก; ฝวคล้ำ, ริมฝีปากหรือเล็บมือ; ความสับสน หรือง่วงนอนมาก

หากคุณเป็นเบาหวาน คุณควรรู้ว่าพรีกาบาลินทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังในสัตว์ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผิวของคุณในขณะที่รับประทานพรีกาบาลิน และแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีแผล รอยแดง หรือปัญหาผิวหนัง

พรีกาบาลินอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

## หมวก ฉนวนควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อกฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

## ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันทนรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อพรีกาบาลิน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- Lyrica®
- Lyrica CR®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ  
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

---

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022