



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Pregabalin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

pregabalin

olarak telaffuz edilir (pre gab' a lin)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pregabalin kapsülleri, oral solüsyon (sıvı) ve uzatılmış salımlı (uzun etkili) tabletler, kollarınızda, ellerinizde, parmaklarınızda, bacaklarınızda, ayaklarınızda veya ayak parmaklarınızda oluşabilecek nöropatik ağrıyı (hasarlı sinirlerden kaynaklanan ağrı) gidermek için kullanılır. diyabet ve postherpetik nevralji (PHN; bir zona krizinden sonra aylar veya yıllar sürebilen yanma, bıçaklama ağrısı veya ağrıları) varsa. Pregabalin kapsülleri ve oral solüsyon ayrıca bir omurilik yaralanmasından sonra oluşabilecek nöropatik ağrıyı gidermek ve fibromiyaljiyi (ağrıya, kas sertliğine ve hassasiyetine, yorgunluğa ve uykuya dalma veya uykuyu sürdürmede zorlanmaya neden olabilen uzun süreli bir durum) tedavi etmek için kullanılır. . Pregabalin kapsülleri ve oral solüsyon, yetişkinlerde ve 1 aylık ve daha büyük çocuklarda belirli nöbet tiplerini tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Pregabalin, antikonvülsanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki hasarlı sinirler tarafından gönderilen ağrı sinyallerinin sayısını azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pregabalin, bir kapsül, oral bir çözelti ve ağızdan almak için uzun süreli salımlı bir tablet olarak gelir. Pregabalin kapsülleri ve oral solüsyon genellikle günde iki veya üç kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. Pregabalin uzatılmış salımlı tabletler genellikle bir akşam yemeğinden sonra günde bir kez alınır. Pregabalin'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; kesmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda pregabalin ile başlayacak ve tedavinin ilk haftasında dozunuzu kademeli olarak artırabilir.

Pregabalini aynen anlatıldığı gibi alın. Pregabalin alışkanlık yapıyor olabilir. Doktorunuzun önerdiğinden daha büyük bir doz almayın, daha sık almayın veya daha uzun süre almayın.

Pregabalin semptomlarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir ancak durumunuzu iyileştirmez. Pregabalinin tam faydasını hissetmeniz birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile pregabalin almaya devam edin. Alışılmadık davranış veya ruh hali değişiklikleri gibi yan etkiler yaşarsanız bile, doktorunuzla konuşmadan pregabalin almayı bırakmayın. Birdenbire pregabalin almayı bırakırsanız,

uykuya dalma veya uykuda kalma, mide bulantısı, ishal, baş ağrıları veya nöbetler dahil olmak üzere yoksunluk belirtileri. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu en az 1 hafta içinde kademeli olarak azaltacaktır.

Doktorunuz veya eczacınız, pregabalin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Pregabalin almadan önce,

- pregabaline, diğer ilaçlara veya pregabalin preparatlarındaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: benazepril (Lotensin, Lotrel'de), kaptopril (Capoten, Capozide'de), enalapril (Vasotec, Vaseretic'te, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (Prinivil, Zestril, Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, Uniretic'te), perindopril (Aceon), kinapril (Accupril, Accuretic, Quinaretic'te), ramipril (Altace) ve trandolapril (Tarka'da Mavik); antidepresanlar; antihistaminikler; lorazepam (Ativan) dahil anksiyete ilaçları; akıl hastalığı veya nöbetler için ilaçlar; pioglitazon (Duetact'te Actos) ve rosiglitazon (Avandia, Avandaryl'de, Avandamet'te); hidrokodon (Hydrocet'te, Vicodin'de, diğerlerinde), morfin (Avinza, Kadian, MSIR, diğerleri) veya oksikodon (OxyContin, Percocet'te, diğerleri) dahil opioid (narkotik) ağrı kesici ilaçlar; sakinleştirici; uyku hapları; ve sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz, sokak uyuşturucuları kullandıysanız veya hiç kullandıysanız veya aşırı miktarda reçeteli ilaç kullandıysanız doktorunuza söyleyin. Ayrıca gözlerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda, dilinizde veya boğazınızda şişlik olup olmadığını da doktorunuza söyleyin; görüş problemleri; kalp yetmezliği; Kanınızda kanama sorunları veya düşük sayıda trombosit (kanın pıhtılaşması için gerekli kan hücresi türü) veya akciğer, kalp veya böbrek hastalığı.
- doktorunuza hamileyseniz veya siz veya eşiniz hamile kalmayı planlıyorsanız söyleyin. Ayrıca emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Pregabalin alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız doktorunuza arayın. Pregabalin, erkek hayvanlarda doğurganlığın azalmasına ve ilaçla tedavi edilen erkek ve dişi hayvanların yavrularında doğum kusurlarına neden olmuştur. Pregabalinin insanlarda bu sorunlara neden olup olmadığını söylemek için yeterli bilgi yok.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye pregabalin aldığınızı söyleyin.
- pregabalinin başınızı döndürebileceğini veya uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmayın veya başka tehlikeli faaliyetlerde bulunmayın. Bu aktiviteleri ne zaman yapabileceğinizi doktorunuza sorun.

- pregabalin alırken alkol almayın. Alkol, bu ilacın neden olduğu uyusukluğu artırabilir.
- Epilepsi, akıl hastalığı veya diğer durumların tedavisi için pregabalin alırken, ruh sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini ve intihara meyilli olabileceğinizi (kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi veya bunu planlamayı veya yapmayı denemeyi) bilmelisiniz. Klinik çalışmalar sırasında çeşitli durumları tedavi etmek için pregabalin gibi antikonvülzanlar alan az sayıda yetişkin ve 5 yaş ve üstü çocuk (yaklaşık 500 kişiden 1'i) tedavileri sırasında intihara meyilli olmuştur. Bu insanlardan bazıları, ilacı almaya başladıktan 1 hafta sonra intihar düşünceleri ve davranışları geliştirdi. Pregabalin gibi antikonvülzan bir ilaç kullanıyorsanız, ruh sağlığınızda değişiklik yaşama riskiniz vardır. ancak durumunuz tedavi edilmezse ruh sağlığınızda değişiklikler yaşama riskiniz de olabilir. Bir antikonvülzan ilaç almanın risklerinin, ilacı almamanın risklerinden daha büyük olup olmadığına siz ve doktorunuz karar vereceksiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen doktorunuzu aramalısınız: panik atak; ajitasyon veya huzursuzluk; yeni veya kötüleşen sinirlilik, kaygı veya depresyon; tehlikeli dürtülere göre hareket etmek; düşme veya uykuda kalma zorluğu; saldırgan, öfkeli veya şiddet içeren davranışlar; mani (çılgın, anormal derecede heyecanlı ruh hali); kendine zarar vermek ya da hayatına son vermek hakkında konuşmak ya da düşünmek; arkadaşlardan ve aileden çekilme; ölüm ve ölmekle meşgul olma; değerli eşyalarını vermek; veya davranış veya ruh halindeki diğer olağandışı değişiklikler.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kapsülleri veya oral solüsyonu alıyorsanız ve bir dozu almayı unutur ve birkaç saat sonra hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Uzatılmış salımlı tabletleri alıyorsanız ve akşam yemeğinden sonra bir doz almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu bir atıştırmadan sonra yatmadan önce alın. Dozu yatmadan önce almayı unutursanız, ertesi gün kahvaltıdan sonra dozunuzu alın. Dozu kahvaltıdan sonra almayı unutursanız, dozunuzu akşam yemeğinden sonra normal zamanda alın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Pregabalin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- yorgunluk
- baş dönmesi
- baş ağrısı
- kuru ağız
- mide bulantısı

- kusma
- kabızlık
- gaz
- şişkinlik
- "yüksek" veya yüksek ruh hali
- konuşma sorunları
- konsantre olma veya dikkat etme zorluğu
- hatırlama veya unutkanlık zorluğu
- endişe
- Koordinasyon eksikliği
- denge kaybı veya dengesizlik
- vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması veya sarsılması
- kas seğirmesi
- zayıflık
- İştah artışı
- kilo almak
- sırt ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

- bulanık görme, çift görme veya görmedeki diğer değişiklikler
- kurdeşen
- döküntü
- kaşıntı
- kabarcıklar
- gözlerin, yüzün, boğazın, ağzın, dudakların, diş etlerinin, dilin, başın veya boynun şişmesi
- kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi
- nefes darlığı
- hırıltı
- özellikle ateşle birlikte geliyorsa kas ağrısı, hassasiyet, ağrı veya güçsüzlük
- göğüs ağrısı
- nefes almada zorluk; mavimsi renkli cilt, dudaklar veya tırnaklar; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; veya aşırı uyku hali

Şeker hastalığınız varsa, pregabalinin hayvanlarda cilt yaralarına neden olduğunu bilmelisiniz. Pregabalin alırken cildinize daha fazla dikkat edin ve herhangi bir yara, kızarıklık veya cilt probleminiz varsa doktorunuza bildirin.

Pregabalin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuza arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptaki, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun pregabalin tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- lirika®
- Lyrica CR®

Son Revize - 05/15/2020

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022