

[Nhà](#) → [Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung](#) → Pregabalin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

Pregabalin

phát âm là (pre gab 'a lin)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Viên nang Pregabalin, dung dịch uống (chất lỏng) và viên nén giải phóng kéo dài (tác dụng kéo dài) được sử dụng để giảm đau thần kinh (đau do dây thần kinh bị tổn thương) có thể xảy ra ở cánh tay, bàn tay, ngón tay, chân, bàn chân hoặc ngón chân của bạn nếu bạn mắc bệnh tiểu đường và đau dây thần kinh sau phát ban (PHN; cảm giác đau rát, như dao đâm hoặc đau nhức có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm sau khi bị zona tấn công). Viên nang Pregabalin và dung dịch uống cũng được sử dụng để giảm đau thần kinh có thể xảy ra sau chấn thương tủy sống và điều trị chứng đau cơ xơ hóa (một tình trạng kéo dài có thể gây đau, cứng cơ và mềm, mệt mỏi và khó ngủ hoặc khó ngủ). Viên nang Pregabalin và dung dịch uống được sử dụng cùng với các loại thuốc khác để điều trị một số loại động kinh ở người lớn và trẻ em từ 1 tháng tuổi trở lên. Pregabalin nằm trong nhóm thuốc được gọi là thuốc chống co giật. Nó hoạt động bằng cách giảm số lượng tín hiệu đau do các dây thần kinh bị tổn thương trong cơ thể gửi ra.

có nên sử dụng thuốc này không?

Pregabalin có dạng viên nang, dung dịch uống và viên nén giải phóng kéo dài để uống. Viên nang Pregabalin và dung dịch uống thường được dùng cùng hoặc không với thức ăn hai hoặc ba lần một ngày. Thuốc viên giải phóng kéo dài Pregabalin thường được dùng một lần mỗi ngày sau bữa ăn tối. Dùng Pregabalin vào cùng (các) thời điểm mỗi ngày. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu.

Nuốt toàn bộ viên nén giải phóng kéo dài; không cắt, nhai, hoặc nghiền nát chúng.

Bác sĩ có thể sẽ bắt đầu cho bạn sử dụng liều lượng thấp của pregabalin và có thể tăng dần liều lượng của bạn trong tuần đầu điều trị.

Hãy dùng pregabalin đúng theo chỉ dẫn. Pregabalin có thể hình thành thói quen. Không dùng liều lượng lớn hơn, dùng thường xuyên hơn hoặc dùng trong thời gian dài hơn so với chỉ định của bác sĩ.

Pregabalin có thể giúp kiểm soát các triệu chứng của bạn nhưng sẽ không chữa khỏi tình trạng của bạn. Có thể mất vài tuần hoặc lâu hơn trước khi bạn cảm nhận được đầy đủ lợi ích của Pregabalin. Tiếp tục dùng Pregabalin ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe. Đừng ngừng dùng Pregabalin mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn, ngay cả khi bạn gặp các tác dụng phụ như thay đổi bất thường trong hành vi hoặc tâm trạng. Nếu bạn đột ngột ngừng dùng Pregabalin, bạn có thể gặp

các triệu chứng cai nghiện, bao gồm khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu hoặc co giật. Bác sĩ có thể sẽ giảm liều dần dần trong ít nhất 1 tuần.

Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn sẽ cung cấp cho bạn tờ thông tin về bệnh nhân của nhà sản xuất (Hướng dẫn sử dụng thuốc) khi bạn bắt đầu điều trị bằng pregabalin và mỗi khi bạn nạp thêm thuốc theo toa. Đọc kỹ thông tin và hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bạn cũng có thể truy cập trang web của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) hoặc trang web của nhà sản xuất để lấy Hướng dẫn Thuốc.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi dùng pregabalin,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với pregabalin, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong các chế phẩm của pregabalin. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.
- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy nhớ đề cập đến bất kỳ chất nào sau đây: thuốc ức chế men chuyển (ACE) như benazepril (Lotensin, trong Lotrel), captopril (Capoten, trong Capozide), enalapril (Vasotec, trong Vaseretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, trong Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, trong Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace), và trandolapril (Mavik, ở Tarka); thuốc chống trầm cảm; thuốc kháng histamine; thuốc điều trị lo âu bao gồm lorazepam (Ativan); thuốc điều trị bệnh tâm thần hoặc co giật; một số loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường như pioglitazone (Actos, trong Duetact) và rosiglitazone (Avandia, ở Avandaryl, Avandamet); thuốc giảm đau opioid (gây mê) bao gồm hydrocodone (trong Hydrocet, trong Vicodin, những loại khác), morphin (Avinza, Kadian, MSIR, những loại khác), hoặc oxycodone (OxyContin, trong Percocet, những loại khác); thuốc an thần; thuốc ngủ; và thuốc an thần. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.
- Hãy cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn uống hoặc đã từng uống một lượng lớn rượu, sử dụng hoặc đã từng sử dụng ma túy đường phố, hoặc lạm dụng thuốc theo toa. Cũng nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã hoặc đã từng bị sưng mắt, mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng; vấn đề về thị lực; suy tim; các vấn đề về chảy máu hoặc số lượng tiểu cầu thấp (loại tế bào máu cần thiết cho quá trình đông máu) trong máu của bạn, hoặc bệnh phổi, tim hoặc thận.
- cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn hoặc đối tác của bạn có kế hoạch mang thai. Cũng nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang cho con bú. Nếu bạn hoặc đối tác của bạn có thai trong khi bạn đang dùng Pregabalin, hãy gọi cho bác sĩ của bạn. Pregabalin đã gây ra giảm khả năng sinh sản ở động vật đực và dị tật bẩm sinh ở con cái của động vật đực và cái được điều trị bằng thuốc. Không có đủ thông tin để biết liệu Pregabalin có gây ra những vấn đề này ở người hay không.
- Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang dùng Pregabalin.
- bạn nên biết rằng Pregabalin có thể làm bạn chóng mặt hoặc buồn ngủ. Không lái xe vận hành máy móc, hoặc làm các hoạt động nguy hiểm khác cho đến khi bạn biết thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Hỏi bác sĩ khi nào bạn có thể thực hiện những hoạt động này.

- không uống rượu trong khi dùng pregabalin. Rượu có thể gây buồn ngủ do thuốc này gây ra.
- bạn nên biết rằng sức khỏe tâm thần của bạn có thể thay đổi theo những cách không mong muốn và bạn có thể tự tử (nghĩ đến việc làm hại hoặc giết bản thân hoặc lên kế hoạch hoặc cố gắng làm như vậy) trong khi bạn đang dùng pregabalin để điều trị chứng động kinh, bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác. Một số ít người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên (khoảng 1/500 người) dùng thuốc chống co giật như pregabalin để điều trị các tình trạng khác nhau trong quá trình nghiên cứu lâm sàng đã tự tử trong quá trình điều trị. Một số người trong số này có ý nghĩ và hành vi tự sát sớm nhất là 1 tuần sau khi họ bắt đầu dùng thuốc. Có nguy cơ bạn có thể gặp phải những thay đổi về sức khỏe tâm thần của mình nếu bạn dùng thuốc chống co giật như pregabalin, nhưng cũng có thể có nguy cơ bạn gặp phải những thay đổi về sức khỏe tâm thần nếu tình trạng của bạn không được điều trị. Bạn và bác sĩ của bạn sẽ quyết định xem liệu rủi ro của việc dùng thuốc chống co giật có lớn hơn rủi ro của việc không dùng thuốc hay không. Bạn, gia đình hoặc người chăm sóc của bạn nên gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây: các cơn hoảng sợ; kích động hoặc bồn chồn; mới hoặc trở nên khó chịu, lo lắng hoặc trầm cảm mới hoặc tồi tệ hơn; hành động theo xung động nguy hiểm; khó đi vào giấc ngủ hoặc khó ngủ; hành vi hung hăng, tức giận hoặc bạo lực; hưng cảm (tâm trạng điên cuồng, hưng phấn bất thường); nói chuyện hoặc suy nghĩ về việc muốn tự làm tổn thương bản thân hoặc kết thúc cuộc sống của mình; rút lui khỏi bạn bè và gia đình; mối bận tâm về cái chết và cái chết; cho đi của cải quý giá; hoặc bất kỳ thay đổi bất thường nào khác về hành vi hoặc tâm trạng.

hạt hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn đang dùng viên nang hoặc dung dịch uống mà quên uống một liều thuốc và nhớ một vài giờ sau đó, hãy uống liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Nếu bạn đang dùng viên nén giải phóng kéo dài và quên uống một liều sau bữa ăn tối, hãy dùng liều đã quên trước khi đi ngủ sau khi ăn nhẹ. Nếu bạn bỏ lỡ dùng liều trước khi đi ngủ, hãy dùng liều của bạn vào ngày hôm sau sau khi ăn sáng. Nếu bạn bỏ lỡ dùng liều sau bữa ăn sáng, hãy dùng liều của bạn vào thời điểm thông thường sau bữa ăn tối và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

hạt tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Pregabalin có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

- mệt mỏi
- chóng mặt
- đau đầu
- khô miệng
- buồn nôn

- nôn mửa
- táo bón
- khí ga
- đầy hơi
- " cao " hoặc tâm trạng cao
- vấn đề về giọng nói
- khó tập trung hoặc chú ý
- khó nhớ hoặc hay quên
- sự lo lắng
- thiếu sự phối hợp
- mất thăng bằng hoặc không vững
- lắc hoặc giật không kiểm soát được của một phần cơ thể
- co giật cơ bắp
- yếu đuối
- tăng khẩu vị
- tăng cân
- đau lưng

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:

- nhìn mờ, nhìn đôi hoặc những thay đổi khác về thị lực
- tổ ong
- phát ban
- ngứa
- rộp
- sưng mắt, mặt, cổ họng, miệng, môi, lợi, lưỡi, đầu hoặc cổ
- sưng cánh tay, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân
- hụt hơi
- thở khò khè
- đau cơ, đau, nhức, hoặc yếu, đặc biệt nếu nó đi kèm với sốt
- đau ngực
- khó thở; da, môi hoặc móng tay hơi xanh; lú lẫn; hoặc buồn ngủ tột độ

Nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên biết rằng pregabalin đã gây ra vết loét trên da ở động vật. Hãy chú ý thêm đến làn da của bạn khi dùng Pregabalin và cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vết loét, mẩn đỏ hoặc các vấn đề về da.

Pregabalin có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?

Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm).

Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ Thuốc An toàn của FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy cập vào chương trình mua lại.

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tại <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ có thể yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với pregabalin.

Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn thuốc của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (bán qua quầy) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

- Lyrica®
- Lyrica CR®

Sửa đổi lần cuối - 15/05/2020

[Tìm hiểu cách trích dẫn trang này](#)



[Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm](#)

AHFS® Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022