



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 普瑞巴林

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

普瑞巴林

发音为 (pre gab' a lin)

为什么要开这种药?

普瑞巴林胶囊、口服溶液（液体）和缓释（长效）片剂用于缓解可能发生在手臂、手、手指、腿、脚或脚趾的神经性疼痛（神经受损引起的疼痛）患有糖尿病和带状疱疹后神经痛（PHN；带状疱疹发作后可能持续数月或数年的灼痛、刺痛或疼痛）。普瑞巴林胶囊和口服溶液也用于缓解脊髓损伤后可能发生的神经性疼痛和治疗纤维肌痛（一种可能导致疼痛、肌肉僵硬和压痛、疲倦以及难以入睡或保持睡眠的长期疾病）。普瑞巴林胶囊和口服溶液与其他药物一起用于治疗成人和 1 个月及以上儿童的某些类型的癫痫发作。普瑞巴林属于一类称为抗惊厥药的药物。它的作用是减少身体受损神经发出的疼痛信号的数量。

这个药应该怎么用?

普瑞巴林以胶囊、口服溶液和口服缓释片剂的形式出现。普瑞巴林胶囊和口服溶液通常每天服用或不服用两到三次。普瑞巴林缓释片通常每天饭后服用一次。每天大约在同一时间服用普瑞巴林。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。

吞下整个缓释片；不要切割、咀嚼或压碎它们。

您的医生可能会让您开始服用低剂量的普瑞巴林，并可能在治疗的第一周逐渐增加您的剂量。

完全按照指示服用普瑞巴林。普瑞巴林可能会形成习惯。不要服用比医生规定的更大剂量、更频繁或更长的时间服用。

普瑞巴林可能有助于控制您的症状，但不会治愈您的病情。您可能需要数周或更长时间才能感受到普瑞巴林的全部益处。即使您感觉良好，也要继续服用普瑞巴林。不要在未与医生交谈的情况下停止服用普瑞巴林，即使您遇到诸如行为或情绪异常变化等副作用。如果您突然停止服用普瑞巴林，您可能会经历

戒断症状，包括入睡或保持睡眠困难、恶心、腹泻、头痛或癫痫发作。您的医生可能会在至少 1 周内逐渐减少您的剂量。

当您开始使用普瑞巴林治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品药品监督管理局 (FDA) 网站 (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) 或制造商的网站获取用药指南。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用普瑞巴林之前，

- 如果您对普瑞巴林、任何其他药物或普瑞巴林制剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂，例如苯那普利 (Lotensin, 在 Lotrel)、卡托普利 (Capoten, 在 Capozide)、依那普利 (Vasotec, 在 Vaseretic、Lexxel)、福辛普利 (Monopril)、赖诺普利 (Prinivil, Zestril, 在 Prinzide, Zestoretic)、莫昔普利 (Univasc, 在 Uniretic)、培哚普利 (Aceon)、喹那普利 (Accupril, 在 Accuretic, Quinaretic)、雷米普利 (Altace) 和群多普利 (Mavik, 在 Tarka)；抗抑郁药；抗组胺药；治疗焦虑的药物，包括劳拉西泮 (Ativan)；治疗精神疾病或癫痫发作的药物；某些糖尿病药物，例如吡格列酮 (Actos, 在 Duetact) 和罗格列酮 (文迪雅, 在 Avandaryl, Avandamet)；阿片类 (麻醉性) 止痛药，包括氢可酮 (Hydrocet、Vicodin 等)、吗啡 (Avinza、Kadian、MSIR 等) 或羟考酮 (OxyContin, Percocet 等)；镇静剂；安眠药；和镇静剂。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您饮酒或曾经大量饮酒，使用或曾经使用过街头毒品，或过度使用处方药，请告诉您的医生。如果您有或曾经有过眼睛、面部、嘴唇、舌头或喉咙肿胀，请告诉您的医生；视力问题；心脏衰竭；出血问题或血液中血小板（凝血所需的血细胞类型）数量少，或肺、心脏或肾脏疾病。
- 如果您怀孕或您或您的伴侣计划怀孕，请告诉您的医生。如果您正在母乳喂养，请告诉您的医生。如果您或您的伴侣在服用普瑞巴林期间怀孕，请致电您的医生。普瑞巴林导致雄性动物生育能力下降，并导致接受药物治疗的雄性和雌性动物后代出现出生缺陷。没有足够的信息来判断普瑞巴林是否会导致人类出现这些问题。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用普瑞巴林。
- 你应该知道普瑞巴林可能会让你头晕或昏昏欲睡。在您知道这种药物如何影响您之前，请勿驾驶汽车操作机械或进行其他危险活动。询问您的医生何时可以进行这些活动。

- 服用普瑞巴林时不要饮酒。酒精会增加这种药物引起的嗜睡。
- 您应该知道,当您服用普瑞巴林治疗癫痫、精神疾病或其他疾病时,您的心理健康可能会以意想不到的方式发生变化,并且您可能会自杀(考虑伤害或自杀或计划或试图这样做)。在临床研究期间服用普瑞巴林等抗惊厥药治疗各种疾病的少数成人和5岁及以上儿童(约500人中有1人)在治疗期间自杀。其中一些人在开始服药后1周就出现了自杀念头和行为。如果您服用普瑞巴林等抗惊厥药物,您的心理健康可能会发生变化,但是,如果您的病情没有得到治疗,您的心理健康也可能会发生变化。您和您的医生将决定服用抗惊厥药物的风险是否大于不服用药物的风险。如果您出现以下任何症状,您、您的家人或您的护理人员应立即致电您的医生:惊恐发作;激动或不安;新的或恶化的易怒、焦虑或抑郁;根据危险的冲动行事;难以入睡或保持睡眠;攻击性、愤怒或暴力行为;躁狂症(疯狂、异常兴奋的情绪);谈论或考虑想要伤害自己或结束自己的生命;远离朋友和家人;专注于死亡和死亡;赠送珍贵的财产;或任何其他不寻常的行为或情绪变化。

我应该遵循特殊的饮食说明吗?

除非您的医生另有说明,否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办?

如果您正在服用胶囊或口服溶液并且忘记服用剂量并在几个小时后记住,请在记住后立即服用错过的剂量。但是,如果快到下一次服药的时间了,请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

如果您正在服用缓释片并忘记在晚餐后服用,请在睡前吃完零食后服用错过的剂量。如果您错过睡前服药,请在第二天早餐后服药。如果您在早餐后错过服药,请在晚餐后的通常时间服药,并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗?

普瑞巴林可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失,请告诉您的医生:

- 疲倦
- 头晕
- 头痛
- 口干
- 恶心

- 呕吐
- 便秘
- 气体
- 腹胀
- “高”或情绪高涨
- 言语问题
- 难以集中注意力或注意力
- 难以记忆或健忘
- 焦虑
- 缺乏协调
- 失去平衡或不稳定
- 身体某个部位无法控制的摇晃或抽搐
- 肌肉抽搐
- 弱点
- 食欲增加
- 体重增加
- 背痛

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请立即致电您的医生：

- 视力模糊、复视或其他视力变化
- 麻疹
- 皮疹
- 瘙痒
- 水泡
- 眼睛、面部、喉咙、嘴巴、嘴唇、牙龈、舌头、头部或颈部肿胀
- 手臂、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 气促
- 喘息
- 肌肉疼痛、压痛、酸痛或虚弱，尤其是伴有发烧时
- 胸痛
- 呼吸困难; 淡蓝色的皮肤、嘴唇或指甲; 困惑; 或极度嗜睡

如果您患有糖尿病,您应该知道普瑞巴林会导致动物皮肤溃疡。服用普瑞巴林时要特别注意您的皮肤,如果您有任何溃疡、发红或皮肤问题,请告诉您的医生。

普瑞巴林可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题,请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用,您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局(FDA)的MedWatch不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话(1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中,紧紧关闭,并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下,远离过多的热量和水分(不要放在浴室里)。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要,因为许多容器(例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器)不适合儿童使用,而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒,请始终锁上安全帽,并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理,以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是,您不应该将这种药物冲入马桶。相反,处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门,了解您所在社区的回收计划。请参阅FDA的药品安全处置网站(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划,请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量,请拨打毒物控制热线1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来,请立即拨打911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗?

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试,以检查您的身体对普瑞巴林的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 抒情诗®
- 抒情诗 CR®

最后修订 - 2020 年 5 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022 年 3 月 25 日