



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Pregabaline

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

pregabaline

uitgesproken als (pre gab' a lin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pregabaline-capsules, drank (vloeistof) en tabletten met verlengde afgifte (langwerkende) worden gebruikt om neuropathische pijn (pijn van beschadigde zenuwen) te verlichten die kan optreden in uw armen, handen, vingers, benen, voeten of tenen als u diabetes en postherpetische neuralgie heeft (PHN; de brandende, stekende pijn of pijn die maanden of jaren kan aanhouden na een aanval van gordelroos). Pregabaline capsules en drank worden ook gebruikt voor het verlichten van neuropathische pijn die kan optreden na een dwarslaesie en voor de behandeling van fibromyalgie (een langdurige aandoening die pijn, spierstijfheid en gevoeligheid, vermoeidheid en moeite met inslapen of doorslapen kan veroorzaken) . Pregabaline-capsules en drank worden samen met andere medicijnen gebruikt om bepaalde soorten aanvallen bij volwassenen en kinderen van 1 maand en ouder te behandelen. Pregabaline zit in een klasse van medicijnen die anticonvulsiva worden genoemd. Het werkt door het aantal pijnsignalen te verminderen dat wordt uitgezonden door beschadigde zenuwen in het lichaam.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pregabaline wordt geleverd als een capsule, een orale oplossing en als een tablet met verlengde afgifte om via de mond in te nemen. Pregabaline-capsules en drank worden gewoonlijk twee of drie keer per dag met of zonder voedsel ingenomen. Pregabaline tabletten met verlengde afgifte worden gewoonlijk eenmaal daags na een avondmaaltijd ingenomen. Neem pregabaline elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt.

Slik de tabletten met verlengde afgifte heel door; niet snijden, kauwen of pletten.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis pregabaline en kan uw dosis tijdens de eerste week van de behandeling geleidelijk verhogen.

Neem pregabaline precies zoals voorgeschreven. Pregabaline kan verslavend zijn. Neem geen grotere dosis, neem deze vaker of voor een langere periode dan uw arts heeft voorgeschreven.

Pregabaline kan helpen uw symptomen onder controle te houden, maar zal uw aandoening niet genezen. Het kan enkele weken of langer duren voordat u het volledige effect van pregabaline voelt. Ga door met het innemen van pregabaline, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van pregabaline zonder met uw arts te overleggen, ook niet als u bijwerkingen ervaart zoals ongewone gedrags- of stemmingsveranderingen. Als u plotseling stopt met het innemen van pregabaline, kunt u last krijgen van:

ontweningsverschijnselen, waaronder moeite met inslapen of doorslapen, misselijkheid, diarree, hoofdpijn of toevallen. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk afbouwen gedurende ten minste 1 week.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met pregabaline en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u pregabaline inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pregabaline, andere medicijnen of een van de ingrediënten in pregabaline-preparaten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: angiotensineconverterend enzym (ACE)-remmers zoals benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril (Capoten, in Capozide), enalapril (Vasotec, in Vaseretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, in Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, in Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, in Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace) en trandolapril (Mavik, in Tarka); antidepressiva; antihistaminica; medicijnen voor angst, waaronder lorazepam (Ativan); medicijnen voor psychische aandoeningen of toevallen; bepaalde medicijnen voor diabetes zoals pioglitazon (Actos, in Duetact) en rosiglitazon (Avandia, in Avandaryl, Avandamet); opioïde (verdovende) pijnstillers, waaronder hydrocodon (in Hydrocet, in Vicodin, anderen), morfine (Avinza, Kadian, MSIR, anderen) of oxycodon (OxyContin, in Percocet, anderen); kalmerende middelen; slaappillen; en kalmeringsmiddelen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- vertel het uw arts als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, straatdrugs gebruikt of ooit heeft gebruikt, of te veel voorgeschreven medicijnen heeft gebruikt. Vertel het uw arts ook als u zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel heeft of ooit heeft gehad; zichtproblemen; hartfalen; bloedingsproblemen of een laag aantal bloedplaatjes (type bloedcel die nodig is voor de bloedstolling) in uw bloed, of long-, hart- of nierziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent of als u of uw partner van plan is zwanger te worden. Vertel het ook aan uw arts als u borstvoeding geeft. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u pregabaline gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Pregabaline veroorzaakte verminderde vruchtbaarheid bij mannelijke dieren en geboortefwijkingen bij de nakomelingen van mannelijke en vrouwelijke dieren die met de medicatie werden behandeld. Er is onvoldoende informatie om te zeggen of pregabaline deze problemen bij mensen veroorzaakt.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u pregabaline gebruikt.
- u moet weten dat u van pregabaline duizelig of slaperig kunt worden. Bestuur geen auto, bedien geen machines of voer geen andere gevaarlijke activiteiten uit totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft. Vraag uw arts wanneer u deze activiteiten mag doen.

- drink geen alcohol terwijl u pregabaline gebruikt. Alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid veroorzaakt door dit medicijn.
- u moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen en dat u suïcidaal kunt worden (denk aan zelfmoord of zelfmoord, of plannen of proberen te doen) terwijl u pregabaline gebruikt voor de behandeling van epilepsie, geestesziekte of andere aandoeningen. Een klein aantal volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder (ongeveer 1 op de 500 mensen) die tijdens klinische onderzoeken anticonvulsiva zoals pregabaline gebruikten om verschillende aandoeningen te behandelen, werden suïcidaal tijdens hun behandeling. Sommige van deze mensen ontwikkelden zelfmoordgedachten en -gedrag binnen 1 week nadat ze begonnen met het innemen van de medicatie. Het risico bestaat dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als u een anticonvulsivum gebruikt, zoals pregabaline, maar er kan ook een risico zijn dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als uw aandoening niet wordt behandeld. U en uw arts zullen beslissen of de risico's van het nemen van anticonvulsiva groter zijn dan de risico's van het niet innemen van de medicatie. U, uw familie of uw verzorger moeten onmiddellijk uw arts bellen als u een van de volgende symptomen ervaart: paniekaanvallen; agitatie of rusteloosheid; nieuwe of verergerende prikkelbaarheid, angst of depressie; handelen op gevaarlijke impulsen; moeite met inslapen of doorslapen; agressief, boos of gewelddadig gedrag; manie (uitzinnige, abnormaal opgewonden stemming); praten of denken over jezelf pijn willen doen of je leven willen beëindigen; terugtrekken van vrienden en familie; preoccupatie met dood en sterven; het weggeven van waardevolle bezittingen; of andere ongewone veranderingen in gedrag of stemming.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u de capsules of de drank inneemt en vergeet een dosis in te nemen en het zich een paar uur later herinnert, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u de tabletten met verlengde afgifte inneemt en vergeet een dosis in te nemen na uw avondmaaltijd, neem dan de gemiste dosis voor het slapengaan na een snack. Als u de dosis voor het slapengaan bent vergeten, neem uw dosis dan de volgende dag na het ontbijt in. Als u de dosis na het ontbijt vergeet in te nemen, neem dan uw dosis op het gebruikelijke tijdstip na een avondmaaltijd en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Pregabaline kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- vermoeidheid
- duizeligheid
- hoofdpijn
- droge mond
- misselijkheid

- braken
- constipatie
- gas-
- opgeblazen gevoel
- "high" of verhoogde stemming
- spraakproblemen
- moeite met concentreren of opletten
- moeite met onthouden of vergeetachtigheid
- ongerustheid
- gebrek aan coordinatie
- verlies van evenwicht of onvastheid
- oncontroleerbaar schudden of schokken van een deel van het lichaam
- spiertrekkingen
- zwakheid
- verhoogde eetlust
- gewichtstoename
- rugpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- wazig zien, dubbel zien of andere veranderingen in het gezichtsvermogen
- netelroos
- uitslag
- jeuk
- blaren
- zwelling van de ogen, het gezicht, de keel, de mond, de lippen, het tandvlees, de tong, het hoofd of de nek
- zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- kortademigheid
- piepende ademhaling
- spierpijn, gevoeligheid, pijn of zwakte, vooral als dit gepaard gaat met koorts
- pijn op de borst
- moeite met ademen; blauwachtige huid, lippen of vingernagels; verwardheid; of extreme slaperigheid

Als u diabetes heeft, moet u weten dat pregabaline huidzweren bij dieren heeft veroorzaakt. Besteed extra aandacht aan uw huid tijdens het gebruik van pregabaline en vertel het uw arts als u zweren, roodheid of huidproblemen heeft.

Pregabaline kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op pregabaline te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Lyrica®
- Lyrica CR®

Laatst herzien - 15-05-2020

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022