



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Pregabalin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

Pregabalin

binibigkas bilang (pre gab' a lin)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga pregabalin capsule, oral solution (likido), at extended-release (long-acting) na mga tablet ay ginagamit upang mapawi ang sakit sa neuropathic (pananakit mula sa mga nasirang nerbiyos) na maaaring mangyari sa iyong mga braso, kamay, daliri, binti, paa, o paa kung ikaw may diabetes at postherpetic neuralgia (PHN; ang nasusunog, pananakit o pananakit na maaaring tumagal ng ilang buwan o taon pagkatapos ng pag-atake ng shingles). Ginagamit din ang mga pregabalin capsule at oral solution upang mapawi ang sakit na neuropathic na maaaring mangyari pagkatapos ng pinsala sa spinal cord at upang gamutin ang fibromyalgia (isang pangmatagalang kondisyon na maaaring magdulot ng pananakit, paninigas ng kalamnan at lambot, pagkapagod, at hirap makatulog o manatiling tulog). Ang mga pregabalin capsule at oral solution ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang uri ng mga seizure sa mga matatanda at bata 1 buwang gulang at mas matanda. Ang Pregabalin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticonvulsants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng bilang ng mga senyales ng sakit na ipinapadala ng mga nasirang nerbiyos sa katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Pregabalin ay dumarating bilang isang kapsula, isang oral na solusyon, at bilang isang pinahabang-release na tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Ang mga pregabalin capsule at oral solution ay kadalasang kinukuha nang may pagkain o walang dalawa o tatlong beses sa isang araw. Ang mga pregabalin extended-release na tablet ay karaniwang iniinom isang beses araw-araw pagkatapos ng hapunan. Uminom ng pregabalin sa halos parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan.

Lunukin nang buo ang extended-release na mga tablet; huwag putulin, ngumunguya, o durugin ang mga ito.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng pregabalin at maaaring unti-unting taasan ang iyong dosis sa unang linggo ng paggamot.

Uminom ng pregabalin nang eksakto tulad ng itinuro. Ang pregabalin ay maaaring bumubuo ng ugali. Huwag uminom ng mas malaking dosis, dalhin ito nang mas madalas, o dalhin ito sa mas mahabang panahon kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaaring makatulong ang Pregabalin na kontrolin ang iyong mga sintomas ngunit hindi magagamot ang iyong kondisyon. Maaaring tumagal ng ilang linggo o mas matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng pregabalin. Ipagpatuloy ang pag-inom ng pregabalin kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pag-inom ng pregabalin nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nakakaranas ka ng mga side effect tulad ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng pregabalin, maaari kang makaranas

mga sintomas ng withdrawal, kabilang ang problema sa pagtulog o pananatiling tulog, pagduduwal, pagtatae, pananakit ng ulo, o mga seizure. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag sinimulan mo ang paggamot na may pregabalin at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng pregabalin,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa pregabalin, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa paghahanda ng pregabalin. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors gaya ng benazepril (Lotensin, sa Lotrel), captopril (Capoten, sa Capozide), enalapril (Vasotec, sa Vaseretic, Lexxel), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril, sa Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, sa Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, sa Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace), at trandolapril (Mavik, sa Tarka); antidepressant; antihistamines; mga gamot para sa pagkabalisa kabilang ang lorazepam (Ativan); mga gamot para sa sakit sa isip o mga seizure; ilang mga gamot para sa diabetes tulad ng pioglitazone (Actos, sa Duetact) at rosiglitazone (Avandia, sa Avandaryl, Avandamet); opioid (narcotic) na mga gamot sa pananakit kabilang ang hydrocodone (sa Hydrocet, sa Vicodin, iba pa), morphine (Avinza, Kadian, MSIR, iba pa), o oxycodone (OxyContin, sa Percocet, iba pa); pampakalma; mga tabletas sa pagtulog; at mga tranquilizer. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom na ng maraming alak, gumagamit o nakagamit na ng mga gamot sa kalye, o sobra-sobra ang paggamit ng mga iniresetang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng pamamaga ng mga mata, mukha, labi, dila, o lalamunan; mga problema sa paningin; heart failure; mga problema sa pagdurugo o mababang bilang ng mga platelet (uri ng selula ng dugo na kailangan para sa pamumuo ng dugo) sa iyong dugo, o sakit sa baga, puso, o bato.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o kung ikaw o ang iyong kapareha ay nagpaplanong magbuntis. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis habang umiinom ka ng pregabalin, tawagan ang iyong doktor. Ang pregabalin ay nagdulot ng pagbaba ng fertility sa mga lalaking hayop at mga depekto sa kapanganakan sa mga supling ng mga lalaki at babaeng hayop na ginagamot sa gamot. Walang sapat na impormasyon upang malaman kung ang pregabalin ay nagdulot ng mga problemang ito sa mga tao.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng pregabalin.
- dapat mong malaman na ang pregabalin ay maaaring mahilo o maantok. Huwag magmaneho ng sasakyan na nagpatakbo ng makinarya, o gumawa ng iba pang mapanganib na aktibidad hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Tanungin ang iyong doktor kung kailan mo maaaring gawin ang mga aktibidad na ito.

- huwag uminom ng alak habang umiinom ng pregabalin. Ang alkohol ay maaaring makadagdag sa pag-aantok na dulot ng gamot na ito.
- dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang magpakamatay (nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito) habang ikaw ay umiinom ng pregabalin para sa paggamot ng epilepsy, sakit sa isip, o iba pang mga kondisyon. Ang isang maliit na bilang ng mga nasa hustong gulang at bata na 5 taong gulang at mas matanda (mga 1 sa 500 katao) na umiinom ng mga anticonvulsant tulad ng pregabalin upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay naging suicidal sa panahon ng kanilang paggamot. Ang ilan sa mga taong ito ay nakabuo ng mga pag-iisip at pag-uugali ng pagpapakamatay kasing aga ng 1 linggo pagkatapos nilang simulan ang pag-inom ng gamot. May panganib na maaari kang makaranas ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung umiinom ka ng isang anticonvulsant na gamot tulad ng pregabalin, ngunit maaaring may panganib din na makakaranas ka ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung hindi ginagamot ang iyong kondisyon. Ikaw at ang iyong doktor ay magpapasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng isang anticonvulsant na gamot ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng hindi pag-inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang pagkamayamutin, pagkabalisa, o depresyon; kumikilos sa mga mapanganib na impulses; kahirapan sa pagkahulog o pananatiling tulog; agresibo, galit, o marahas na pag-uugali; kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay; pag-alis mula sa mga kaibigan at pamilya; abala sa kamatayan at pagkamatay; pamimigay ng mahalagang ari-arian; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung umiinom ka ng mga kapsula o solusyon sa bibig at nakalimutan mong uminom ng isang dosis at tandaan pagkalipas ng ilang oras, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung umiinom ka ng mga extended-release na tablet at nakalimutang uminom ng dosis pagkatapos ng iyong hapunan, inumin ang napalampas na dosis bago ang oras ng pagtulog pagkatapos ng meryenda. Kung napalampas mo ang pagkuha ng dosis bago ang oras ng pagtulog, dalhin ang iyong dosis sa susunod na araw pagkatapos ng almusal. Kung napalampas mo ang pagkuha ng dosis pagkatapos ng almusal, inumin ang iyong dosis sa karaniwang oras pagkatapos ng hapunan at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang pregabalin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagkapagod
- pagkahilo
- sakit ng ulo
- tuyong bibig
- pagduduwal

- pagsusuka
- pagtitibi
- gas
- bloating
- "mataas" o mataas na mood
- mga problema sa pagsasalita
- kahirapan sa pag-concentrate o pagbibigay pansin
- kahirapan sa pag-alala o pagkalimot
- pagkabalisa
- kakulangan ng koordinasyon
- pagkawala ng balanse o pagkabalisa
- hindi mapigil na pagyanig o paghatak ng isang bahagi ng katawan
- pagkibot ng kalamnan
- kahinaan
- nadagdagan ang gana
- Dagdag timbang
- sakit sa likod

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- malabong paningin, dobleng paningin, o iba pang pagbabago sa paningin
- mga pantal
- pantal
- nangangati
- paltos
- pamamaga ng mata, mukha, lalamunan, bibig, labi, gilagid, dila, ulo o leeg
- pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti
- kinakapos na paghinga
- humihingal
- pananakit ng kalamnan, panlalambot, pananakit, o panghihina, lalo na kung ito ay kasama ng lagnat
- pananakit ng dibdib
- kahirapan sa paghinga; may kulay-asul na balat, labi, o mga kuko; pagkalito; o sobrang antok

Kung mayroon kang diabetes, dapat mong malaman na ang pregabalin ay nagdulot ng mga sugat sa balat sa mga hayop. Bigyang-pansin ang iyong balat habang umiinom ng pregabalin, at sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga sugat, pamumula, o mga problema sa balat.

Ang pregabalin ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa pregabalin.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na iniinom mo, gayundin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Lyrica®
- Lyrica CR®

Huling Binago - 05/15/2020

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022