



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Prégabaline

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605045.html>

Prégabaline

prononcé comme (pre gab' a lin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les gélules de prégabaline, la solution buvable (liquide) et les comprimés à libération prolongée (à action prolongée) sont utilisés pour soulager la douleur neuropathique (douleur causée par des nerfs endommagés) qui peut survenir dans les bras, les mains, les doigts, les jambes, les pieds ou les orteils si vous souffrez de diabète et de névralgie post-zostérienne (PHN ; la sensation de brûlure, la douleur lancinante ou les courbatures qui peuvent durer des mois ou des années après une attaque de zona). Les gélules et la solution buvable de prégabaline sont également utilisées pour soulager la douleur neuropathique qui peut survenir après une lésion de la moelle épinière et pour traiter la fibromyalgie (une affection de longue durée pouvant causer de la douleur, de la raideur et de la sensibilité musculaires, de la fatigue et des difficultés à s'endormir ou à rester endormi) . Les gélules et la solution buvable de prégabaline sont utilisées avec d'autres médicaments pour traiter certains types de convulsions chez les adultes et les enfants de 1 mois et plus. La prégabaline appartient à une classe de médicaments appelés anticonvulsivants. Il agit en diminuant le nombre de signaux de douleur envoyés par les nerfs endommagés dans le corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La prégabaline se présente sous forme de gélule, de solution buvable et de comprimé à libération prolongée à prendre par la bouche. Les gélules et la solution buvable de prégabaline sont généralement prises avec ou sans nourriture deux ou trois fois par jour. Les comprimés à libération prolongée de prégabaline sont généralement pris une fois par jour après le repas du soir. Prenez de la prégabaline à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas.

Avalez les comprimés à libération prolongée entiers; ne pas les couper, les mâcher ou les écraser.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de prégabaline et pourra augmenter progressivement votre dose au cours de la première semaine de traitement.

Prenez la prégabaline exactement comme indiqué. La prégabaline peut créer une accoutumance. Ne prenez pas une dose plus importante, ne la prenez pas plus souvent ou ne la prenez pas pendant une période plus longue que celle prescrite par votre médecin.

La prégabaline peut aider à contrôler vos symptômes mais ne guérira pas votre état. Cela peut prendre plusieurs semaines ou plus avant que vous ne ressentiez tous les bienfaits de la prégabaline. Continuez à prendre de la prégabaline même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la prégabaline sans en parler à votre médecin, même si vous présentez des effets indésirables tels que des changements inhabituels de comportement ou d'humeur. Si vous arrêtez soudainement de prendre de la prégabaline, vous pourriez ressentir

symptômes de sevrage, y compris difficulté à s'endormir ou à rester endormi, nausées, diarrhée, maux de tête ou convulsions. Votre médecin diminuera probablement votre dose progressivement sur au moins 1 semaine.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque vous commencerez un traitement par la prégabaline et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la prégabaline,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la prégabaline, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients des préparations de prégabaline. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) tels que le bénazépril (Lotensin, dans Lotrel), le captopril (Capoten, dans Capozide), l'énalapril (Vasotec, dans Vaseretic, Lexxel), le fosinopril (Monopril), le lisinopril (Prinivil, Zestril, dans Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, dans Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, dans Accuretic, Quinaretic), ramipril (Altace) et trandolapril (Mavik, dans Tarka); antidépresseurs; antihistaminiques; les médicaments contre l'anxiété, y compris le lorazépam (Ativan); les médicaments pour les maladies mentales ou les convulsions ; certains médicaments pour le diabète tels que la pioglitazone (Actos, dans Duetact) et la rosiglitazone (Avandia, dans Avandaryl, Avandamet); les analgésiques opioïdes (narcotiques), y compris l'hydrocodone (dans Hydrocet, dans Vicodin, autres), la morphine (Avinza, Kadian, MSIR, autres) ou l'oxycodone (OxyContin, dans Percocet, autres); sédatifs; somnifères; et tranquillisants. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes quantités d'alcool, si vous consommez ou si vous avez déjà consommé des drogues illicites ou si vous avez abusé de médicaments sur ordonnance. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un gonflement des yeux, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge ; problèmes de vue; arrêt cardiaque; des problèmes de saignement ou un faible nombre de plaquettes (type de cellule sanguine nécessaire à la coagulation du sang) dans votre sang, ou une maladie pulmonaire, cardiaque ou rénale.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous ou votre partenaire envisagez de devenir enceinte. Informez également votre médecin si vous allaitez. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant que vous prenez de la prégabaline, appelez votre médecin. La prégabaline a provoqué une diminution de la fertilité chez les animaux mâles et des malformations congénitales chez la progéniture des animaux mâles et femelles qui ont été traités avec le médicament. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour dire si la prégabaline provoque ces problèmes chez l'homme.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la prégabaline.
- vous devez savoir que la prégabaline peut provoquer des étourdissements ou une somnolence. Ne conduisez pas de voiture, n'utilisez pas de machines ou ne faites pas d'autres activités dangereuses tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte. Demandez à votre médecin quand vous pouvez faire ces activités.

- ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez de la prégabaline. L'alcool peut augmenter la somnolence causée par ce médicament.
- vous devez savoir que votre santé mentale peut changer de manière inattendue et que vous pouvez devenir suicidaire (en pensant à vous faire du mal ou à vous tuer ou en planifiant ou en essayant de le faire) pendant que vous prenez de la prégabaline pour le traitement de l'épilepsie, d'une maladie mentale ou d'autres conditions. Un petit nombre d'adultes et d'enfants de 5 ans et plus (environ 1 personne sur 500) qui ont pris des anticonvulsivants tels que la prégabaline pour traiter diverses affections au cours des études cliniques sont devenus suicidaires pendant leur traitement. Certaines de ces personnes ont développé des pensées et des comportements suicidaires dès 1 semaine après avoir commencé à prendre le médicament. Il existe un risque que vous subissiez des changements dans votre santé mentale si vous prenez un médicament anticonvulsivant tel que la prégabaline, mais il peut également y avoir un risque que vous subissiez des changements dans votre santé mentale si votre état n'est pas traité. Vous et votre médecin déciderez si les risques de prendre un médicament anticonvulsivant sont supérieurs aux risques de ne pas prendre le médicament. Vous, votre famille ou votre soignant devez appeler votre médecin immédiatement si vous ressentez l'un des symptômes suivants : attaques de panique ; agitation ou agitation; irritabilité, anxiété ou dépression nouvelle ou qui s'aggrave ; agir sur des impulsions dangereuses; difficulté à s'endormir ou à rester endormi; comportement agressif, colérique ou violent; manie (humeur frénétique, anormalement excitée); parler ou penser à vouloir vous faire du mal ou mettre fin à vos jours ; se retirer de ses amis et de sa famille; préoccupation de la mort et de l'agonie ; donner des biens précieux ; ou tout autre changement inhabituel de comportement ou d'humeur.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous prenez les gélules ou la solution buvable et que vous oubliez de prendre une dose et que vous vous en souvenez quelques heures plus tard, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous prenez les comprimés à libération prolongée et que vous oubliez de prendre une dose après le repas du soir, prenez la dose oubliée avant le coucher après une collation. Si vous oubliez de prendre la dose avant le coucher, prenez votre dose le lendemain après le petit-déjeuner. Si vous oubliez de prendre la dose après le petit-déjeuner, prenez votre dose à l'heure habituelle après le repas du soir et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La prégabaline peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- fatigue
- vertiges
- mal de crâne
- bouche sèche
- nausée

- vomissement
- constipation
- gaz
- ballonnement
- " high " ou humeur élevée
- problèmes d'élocution
- difficulté à se concentrer ou à faire attention
- difficulté à se souvenir ou oubli
- anxiété
- manque de coordination
- perte d'équilibre ou instabilité
- secousses ou secousses incontrôlables d'une partie du corps
- contractions musculaires
- la faiblesse
- Augmentation de l'appétit
- gain de poids
- mal au dos

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin :

- vision floue, vision double ou autres changements de la vue
- urticaire
- éruption
- démangeaison
- cloques
- gonflement des yeux, du visage, de la gorge, de la bouche, des lèvres, des gencives, de la langue, de la tête ou du cou
- enflure des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
- essoufflement
- respiration sifflante
- douleur musculaire, sensibilité, douleur ou faiblesse, surtout si elle s'accompagne de fièvre
- douleur thoracique
- difficulté à respirer; peau, lèvres ou ongles bleutés; confusion; ou somnolence extrême

Si vous êtes diabétique, vous devez savoir que la prégabaline a provoqué des lésions cutanées chez les animaux. Portez une attention particulière à votre peau pendant que vous prenez de la prégabaline et informez votre médecin si vous avez des plaies, des rougeurs ou des problèmes de peau.

La prégabaline peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à la prégabaline.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Lyrique®
- Lyrica CR®

Dernière révision - 15/05/2020

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022