Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617026.html

حقنOcrelizumab

تنطقك (ok "re liz 'ue mab)

لماذاوصف هذا الدواء؟

يستخدمحقن Ocrelizumab لعلاج البالغين الذين يعانون من أشكال مختلفة من التصلب المتعدد (مرضالتصلب العصبي المتعدد ؛ مرض لا تعمل فيه الأعصاب بشكل صحيح وقد يعاني الناس من الضعفوالخدر وفقدان التنسيق العضلي ومشاكل في الرؤية والكلام والتحكم في المثانة) بما فيها:

- الأشكالالأولية التقدمية (تصبح الأعراض أسوأ تدريجياً بمرور الوقت) من مرض التصلب العصبي المتعدد ،
- متلازمةالمعزولة سريرياً (CIS ؛ نوبات أعراض الأعصاب التي تستمر 24 ساعة على الأقل) ،
- أشكالالانتكاس والرحيل (مسار المرض حيث تندلع الأعراض من وقت لآخر) ، أو
- الأشكالالثانوية التقدمية (مسار المرض حيث تحدث الانتكاسات في كثير من الأحيان).

.فيفئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. وهو يعمل عن طريق منع خلايا معينة من الجهاز المناعي من التسببفي أضرار Ocrelizumab

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيحقن Ocrelizumab كمحلول (سائل) يتم حقنه عن طريق الوريد (في الوريد) من قبل الطبيب أو الممرضة. عادة ما يتم إعطاؤهمرة كل أسبوعين لأول جرعتين (في الأسبوع 0 والأسبوع 2) ، ثم يتم إعطاء الحقن مرة كل 6 أشهر.

قديسبب حقن Ocrelizumab ردود فعل خطيرة أثناء التسريب وحتى يوم واحد بعد تلقي التسريب. قد يتم إعطاؤك أدوية أخرى لعلاجأو للمساعدة في منع ردود الفعل على ocrelizumab. سيراقبك الطبيب أو الممرضة عن كثب أثناء تلقي التسريب ولمدة ساعةعلى الأقل بعد ذلك لتقديم العلاج في حالة حدوث آثار جانبية معينة للدواء. قد يتوقف طبيبك بشكل مؤقت أو دائم عن علاجكأو يقلل الجرعة ، إذا كنت تعاني من بعض الآثار الجانبية. أخبر طبيبك أو ممرضتك إذا واجهت أياً مما يلي أثناء أو في غضون 24ساعة بعد التسريب: طفح جلدي ؛ متلهف، متشوق؛ قشعريرة؛ احمرار في موقع الحقن. صعوبة في التنفس أو البلع. سعال؛ أزيز. متسرع؛شعور بالاغماء؛ تهيج الحلق؛ ألم في الفم أو الحلق. ضيق في التنفس؛ تورم في الوجه والعينين والفم والحلق واللسان ، أو الشفاهتدفق مائى - صرف؛ حمُى؛ إعياء؛ التعب. صداع الراس؛ دوخة؛ غثيان؛ أو تسارع ضربات القلب. اتصل بطبيبك على الفور أو احصلعلى رعاية طبية طارئة فوراً إذا واجهت أياً من هذه الأعراض بعد مغادرة مكتب طبيبك أو مرفقك الطبي.

قديساعد Ocrelizumab في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد ولكنه لا يعالجها. سيراقبك طبيبك بعناية ليرى مدى جودة عملocrelizumab بالنسبة لك. من المهم أن تخبر طبيبك عن شعورك أثناء العلاج.

سيعطيكطبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج بحقن ocrelizumab وفي كل مرة تقوم فيها بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذاكان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلتلقي حقن أوكريليزوماب ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من ocrelizumab ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات حقن ocrelizumab .اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التيتتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر الأدوية التي تثبط جهاز المناعة لديك مثل: الكورتيكوستيرويدات بما في ذلك ديكساميثازونوميثيل بريدنيزولون (ميدرول) وبريدنيزون (رايوس) ؛ السيكلوسبورين (جينجراف ، نيورال ، سانديموني) ؛ داكليزوماب(زينبريتا) ؛ فينجوليمود (جيلينيا) ؛ ميتوكسانترون. ناتاليزوماب (تيسابري) ؛ تاكروليموس (أستاغراف ، بروغراف) ؛ أوتريفلونوميد (أوباجيو). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبرطبيبك إذا كنت مصاباً أو سبق أن أصبت بالتهاب الكبد B (HBV) ؛ وهو فيروس يصيب الكبد وقد يتسبب في تلف الكبدالشديد أو سرطان الكبد). من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول عقار ocrelizumab.
- أخبرطبيبك إذا كان لديك أي نوع من العدوى قبل أن تبدأ علاجك بحقن أوكرليزوماب.
- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاًأو تخططين للحمل أو مرضعة. استخدم وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء علاجك باستخدام أوكريليزوماب ولمدة 6 أشهر بعد الجرعة النهائية. إذا أصبحت حاملاًأثناء تلقيك ocrelizumab ، فاتصل بطبيبك. إذا تلقيت حقنةocrelizumab أثناء الحمل ، فتأكد من التحدث إلى طبيب طفلك حول هذا الأمر بعد ولادة طفلك. قد يحتاج طفلك إلى تأخيرتلقي بعض اللقاحات.
- أخبرطبيبك إذا كنت قد تلقيت تطعيماً مؤخراً أو من المقرر أن تتلقى أي تطعيمات. قد تحتاج إلى تلقي أنواع معينة من اللقاحاتقبل 4 أسابيع على الأقل وتلقي أنواع أخرى قبل أسبوعين على الأقل من بدء العلاج بحقن ocrelizumab. لا تأخذ أي تطعيماتدون التحدث مع طبيبك أثناء علاجك.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعةيجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

إذافاتك موعد لتلقي ocrelizumab ، فاتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن لإعادة تحديد موعدك.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب Ocrelizumab آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- تورمأو ألم في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين
- إسهال

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسمكيف ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- حمى ،قشعريرة ، سعال مستمر ، أو علامات أخرى للعدوى
- تقرحاتالفم
- القوباءالمنطقية (طفح جلدي يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين أصيبوا بجدري الماء في الماضي)
- تقرحاتحول الأعضاء التناسلية أو المستقيم
- عدوىالجلد
- ضعففي جانب واحد من الجسم. خراقة الذراعين والساقين. تغييرات الرؤية التغييرات في التفكير والذاكرة والتوجه ؛ ارتباك؛ أوتغيرات في الشخصية

قديزيد Ocrelizumab من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تلقي هذاالدواء.

قديسبب Ocrelizumab آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تلقي هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعانيمن صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الفحوصات المخبرية قبل وأثناء العلاج للتحقق من استجابة جسمكلحقن ocrelizumab.

اسألالصيدلي عن أي أسئلة لديك حول حقن ocrelizumab.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- أوكريفوس®

آخرمراجعة - 24/07/2019

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.

الازدواجية .4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland ،

للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022