

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [オンダンセトロン注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

オンダンセトロン注射

(dan'se tronで) と発音されます

なぜこの薬が処方されているのですか？

オンダンセトロン注射は、がんの化学療法や手術によって引き起こされる吐き気や嘔吐を防ぐために使用されます。オンダンセトロンは、セロトニン5-HTと呼ばれる薬のクラスに含まれています。3受容体拮抗薬。吐き気や嘔吐を引き起こす可能性のある天然物質であるセロトニンの作用を遮断することで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

オンダンセトロンは、病院または診療所の医療提供者によって静脈内（静脈内）または筋肉内（筋肉内）に注射される溶液（液体）として提供されます。オンダンセトロンを使用して化学療法による悪心および嘔吐を予防する場合、通常、化学療法開始の30分前に投与されます。必要に応じて、オンダンセトロンの初回投与の4時間後、およびオンダンセトロンの初回投与の8時間後に追加の投与を行うことができます。オンダンセトロンは、手術による吐き気や嘔吐を防ぐために使用される場合、通常、手術の直前に投与されます。オンダンセトロンは、吐き気や嘔吐を経験していて、手術前にオンダンセトロンを投与されなかった患者に、手術後に投与されることもあります。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

オンダンセトロンを使用する前に、

- オンダンセトロン、アロセトロン (Lotronex)、ドラセトロン (Anzemet)、グラニセトロン (Kytril)、パロセトロン (Aloxi)、またはその他の薬、またはオンダンセトロン注射の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- アポモルヒネ (アポキン) を服用しているかどうかを医師に伝えてください。あなたがこの薬を服用している場合、あなたの医師はおそらくオンダンセトロンを使用しないようにあなたに言うでしょう。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。アミオダロン (Cordarone、Pacerone) ; アジスロマイシン (Zithromax) ; カルバマゼピン (カルバマゼピン、エピトール、エクエトロ、テグレート)、またはフェニトイン (ディランチン) などの発作のための特定の薬; クロロキン (アラレン) ; クロルプロマジン; シタロプラム (セレкса) ; クラリスロマイシン (Biaxin、Prevpac) ; 利尿薬 (「水の丸薬」) ; エリスロマイシン (EES、エリスロシン、その他) ; フェンタニル (Abstral、Actiq、Duragesic、Fentora、Lazanda、Onsolis、Subsys) ; フレカイニド; ハロペリドール (ハルドール) ; リチウム (Lithobid) ; アルモトリプタン (Axert)、エレクトリプタン (Relpax)、フロバトリプタン (Frova)、ナラトリプタン (Amerge)、リザトリプタン (Maxalt) などの片頭痛を治療するための薬 スマトリプタン (Imitrex)、およびゾルミトリプタン (Zomig) ; メチレンブルー;

ミルタザピン（レメロン）；イソカルボキサジド（Marplan）、リネゾリド（Zyvox）、フェネルジン（Nardil）、セレギリン（Eldepryl、Emsam、Zelapar）、およびトラニルシプロミン（Parnate）を含むモノアミンオキシダーゼ（MAO）阻害剤。モキシフロキサシン（Avelox）；ペンタミジン（ネブペント）；ピモジド（オラップ）；プロカインアミド；キニジン；リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファタール）；デスベンラファキシン（Khedezla、Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta）、ベンラファキシン（Effexor XR）などの選択的セロトニン/ノルエピネフリン再取り込み阻害薬（SNRI）。シタロプラム（Celexa）、エシタロプラム（Lexapro）、フルオキセチン（Prozac、Sarafem、Symbyax）、フルボキサミン（Luvox）、パロキセチン（Brisdelle、Paxil、Pexeva）、セルトラリン（Zoloft）などの選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）。ソタロール（Betapace、Sorine）；チオリダジン；トラマドール（Conzip、Ultram、Ultracet）；およびバンデタニブ（カプレルサ）。あなたの医師はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたをより注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの薬もオンダンセトロンと相互作用する可能性があるため、このリストに表示されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。

- あなたまたはあなたの家族の誰かが長いQT症候群（失神または突然死を引き起こす可能性のある不整脈を発症するリスクを高める状態）、または別のタイプの不整脈または不整脈の問題を抱えているか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。または、血液中のマグネシウムまたはカリウムのレベルが低い、またはこれまでにあった場合、心不全（HF、心臓が体の他の部分に十分な血液を送り出せない状態）、または肝疾患。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。オンダンセトロンに投与中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

あなたの医師があなたに他のことを言わない限り、あなたの通常の食事療法を続けてください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

オンダンセトロンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 頭痛
- 便秘
- 眠気
- 風邪や悪寒を感じる
- 手や足の痛み、灼熱感、しびれ、またはうずき
- 熱
- 注射部位の痛み、発赤、腫れ、暖かさ、または灼熱感

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 発疹
- じんましん
- かゆみ
- 目、顔、唇、舌、喉、手、足、足首、または下肢の腫れ
- 嘔声

- 呼吸困難または嚔下困難
- 胸痛
- 呼吸困難
- めまい、立ちくらみ、または失神
- 速い、遅い、または不整脈
- かすみ目または視力喪失
- 立ちくらみ
- 攪拌
- 幻覚（存在しないものを見たり、声を聞いたりする）
- 熱
- 過度の発汗
- 錯乱
- 吐き気、嘔吐、または下痢
- 協調性の喪失
- 硬いまたはけいれんする筋肉
- 発作
- 昏睡（意識喪失）

オンダンセトロンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の使用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は病院または診療所に保管されます。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

- 短時間の突然の視力低下
- めまいや立ちくらみ

- 失神
- 便秘
- 不整脈

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ソフラン®注入

最終改訂日-2015年1月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日